

تكنولوجيا وفسولوجيا
ما بعد حصاد الخضار الثمرية
التداول والتخزين والتصدير

سلسلة تكنولوجيا وفسيولوجيا الخضر

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

تأليف

أ. د. أحمد عبد المنعم حسن

أستاذ الخضر

كلية الزراعة — جامعة القاهرة

٢٠١١



الدار العربية للنشر والتوزيع
الطبعة الأولى

حقوق النشر

تكنولوجيا وفسولوجيا

ما بعد حصاد الخضر الثمرية

التداول والتخزين والتصدير

رقم الإبداع ، ٢٣٢٧٣ / ٢٠١٠

I. S. B. N. : 977-258-388-7

حقوق النشر محفوظة

لدار العربية للنشر والتوزيع

٣٢ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

ت: ٢٢٧٥٣٣٥ فاكس: ٢٢٧٥٣٣٨٨

E-mail: aldar_alarabia1@yahoo.com

لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى وجه، أو بأى طريقة، سواء أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية، أو بالتصوير، أو بالتسجيل، أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة، ومقدمًا.

مقدمة الناشر

يتزايد الاهتمام باللغة العربية في بلادنا يوماً بعد يوم. ولاشك أنه في الغد القريب ستستعيد اللغة العربية هيبتها التي طالما امتهنت وأذلت من أبنائها وغير أبنائها ولا ريب في أن امتحان لغة أية أمة من الأمم هو إذلال ثقافي فكري للأمة نفسها؛ الأمر الذي يتطلب تضافر جهود أبناء الأمة رجالاً ونساءً، طلاباً وطالبات، علماء ومثقفين، مفكرين وسياسيين في سبيل جعل لغة العروبة تحتل مكانتها اللائقة التي اعترف المجتمع الدولي بها لغة عمل في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في أنحاء العالم، لأنها لغة أمة ذات حضرة عريقة استوعبت - فيما مضى - علوم الأمم الأخرى، وصهرتها في بوتقتها اللغوية والفكرية، فكانت لغة العلوم والأدب، ولغة الفكر والكتابة والمخاطبة

إن الفضل في التقدم العلمي الذي تنعم به أوروبا اليوم يرجع في واقع الحال إلى الصحوّة العلمية في الترجمة التي عاشتها في القرون الوسطى فقد كان المرجع الوحيد للعلوم الطبية والعلمية والاجتماعية هو الكتب المترجمة عن اللغة العربية لابن سينا وابن الهيثم والفارابي وابن خلدون وغيرهم من عمالقة العرب، ولم ينكر الأوروبيون ذلك، بل يسجل تاريخهم ما ترجموه عن حضارة الفراعنة والعرب والإغريق، وهذا يشهد بأن اللغة العربية كانت مطواعة للعلم والتدريس والتأليف، وأنها قادرة على التعبير عن متطلبات الحياة وما يستجد من علوم، وأن غيرها ليس بأدق منها، ولا أقدر على التعبير

ولكن ما أصاب الأمة من مصائب وجمود بدأ مع عصر الاستعمار البريطاني والفرنسي، عاق اللغة عن النمو والتطور، وأبعدها عن العلم والحضارة، ولكن عندما أحس العرب بأن حياتهم لا بد من أن تتغير، وأن جمودهم لا بد أن تدب فيه الحياة، اندفع الرواد من اللغويين والأدباء، والعلماء في إنعاش اللغة وتطويرها، حتى أن مدرسة القصر العيني في القاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت درسا الطب بالعربية أول إنشائها ولو تصفحنا الكتب التي ألفت أو تُرجمت يوم كان الطب يدرس فيهما باللغة العربية لوجدناها كتباً ممتازة لا تقل جودة عن مثيلاتها من كتب الغرب في ذلك الحين، سواء في الطب، أو حسن التعبير، أو براعة الإيضاح، ولكن هذين المعهدين تنكرا للغة العربية فيما بعد، وسادت لغة المستعمر، وفُرضت على أبناء الأمة فرضاً، إذ رأى المستعمر في خلق اللغة العربية مجالاً لعرقلّة الأمة العربية.

وبالرغم من المقاومة العنيفة التي قابلها، إلا أنه كان بين المواطنين صنائع سبقوا الأجنبي فيما يتطلع إليه، فتقنوا في أساليب التملق له اكتساباً لرضاته، ورجال تأثروا بحملات المستعمر الظالمة، يشككون في قدرة اللغة على استيعاب الحضارة الجديدة، وغاب عنهم ما قاله الحاكم الفرنسي لجيشه الزاحف إلى الجزائر "علموا لغتنا وانشروها حتى نحكم الجزائر. فإذا حكمت لغتنا الجزائر. فقد حكمناها حقيقة"

فهل لى أن أوجه نداءً إلى جميع حكومات الدول العربية بأن تبادر - فى أسرع وقت ممكن - إلى اتخاذ التدابير، والوسائل الكفيلة باستعمال اللغة العربية لغة تدريس فى جميع مراحل التعليم العام، والمهنى، والجامعى، مع العناية الكافية باللغات الأجنبية فى مختلف مراحل التعليم لتكون وسيلة الإطلاع على تطور العلم والثقافة والانفتاح على العالم وكلنا ثقة من إيمان العلماء والأساتذة بالتعريب، نظراً لأن استعمال اللغة القومية فى التدريس ييسر على الطالب سرعة الفهم دون عائق لغوى، وبذلك تزداد حصيلته الدراسية، ويرتفع بمستواه العلمى، وذلك يعتبر تأصيلاً للفكر العلمى فى البلاد، وتمكيناً للغة القومية من الازدهار والقيام بدورها فى التعبير عن حاجات المجتمع، وألفاظ ومصطلحات الحضارة والعلوم

ولا يغيب عن حكومتنا العربية أن حركة التعريب تسير متباطئة، أو تكاد تتوقف، بل تحارب أحياناً ممن يشغلون بعض الوظائف القيادية فى سلك التعليم والجامعات، ممن ترك الإستعمار فى نفوسهم عقداً وأمراضاً، رغم أنهم يعلمون أن جامعات إسرائيل قد ترجمت العلوم إلى اللغة العبرية، وعدد من يتخاطب بها فى العالم لا يزيد عن خمسة عشر مليون يهودياً، كما أنه من خلال زياراتى لبعض الدول واطلاعى وجدت كل أمة من الأمم تدرس بلغتها القومية مختلف فروع العلوم والآدب والتقنية، كاليابان، وإسبانيا، وألمانيا، ودول أمريكا اللاتينية، ولم تشك أمة من هذه الأمم فى قدرة لغتها على تغطية العلوم الحديثة، فهل أمة العرب أقل شأنًا من غيرها ١٩

وأخيراً .. وتمشيًا مع أهداف الدار العربية للنشر والتوزيع، وتحقيقاً لأغراضها فى تدعيم الإنتاج العلمى، وتشجيع العلماء والباحثين فى إعادة مناهج التفكير العلمى وطرأته إلى رحاب لغتنا الشريفة، تقوم الدار بنشر هذا الكتاب المتميز الذى يعتبر واحداً من ضمن ما نشرته - وستقوم بنشره - الدار من الكتب العربية التى قام بتأليفها أو ترجمتها نخبة متازة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية المختلفة.

وبهذا ننفذ عهداً قطعناه على الماضى قدما فيما أردناه من خدمة لغة الوحي، وفيما أوداه الله تعالى لنا من جهاد فيها

وقد صدق الله العظيم حينما قال فى كتابه الكريم: (أَوْقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرْدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ). سورة التوبة الآية ١٠٥

محمد أحمد دريس

الدار العربية للنشر والتوزيع

المقدمة

أقدم للقارئ العربى فى هذا الكتاب عرضاً شاملاً لموضوع تفتقر إليه المكتبة العربية بشدة، فى الوقت الذى يحتاجه - بشدة كذلك - جميع العاملين فى مجالات إنتاج وتسويق وتصدير الخضر. فهذا الكتاب يتناول بالشرح المفصل كل ما يتعلق بعمليات حصاد، وتداول (إعداد، وتدرج، وتبريد أولى، وتعبئة .. إلخ)، وتخزين، وشحن، وتصدير محاصيل الخضر الثمرية، مع بيان للجوانب الفسيولوجية المتعلقة بكل محصول على حدة، والجوانب التكنولوجية الخاصة بتطبيقات التقنيات الحديثة فى شتى أنشطة ما بعد الحصاد

ونظراً لأن محاصيل الخضر كثيرة ومتنوعة، كما تتنوع فى متطلباتها من عمليات التداول، فقد قسمت إلى نصفين فى كتابين مستقلين يتضمنان: الخضر الثمرية، والخضر غير الثمرية. ونعرض فى هذا الكتاب للخضر الثمرية التى تتضمن كلا من الطماطم (الفصل الأول)، والفلفل (الفصل الثانى)، والكنطلوب (الفصل الثالث)، والبطيخ (الفصل الرابع)، والخيار (الفصل الخامس)، والكوسة (الفصل السادس)، والفراولة (الفصل السابع)، والفاصوليا (الفصل الثامن)، والبسلة (الفصل التاسع)، وباقى الخضر الثمرية (الفصل العاشر). وغنى عن البيان أن كتابى الأول فى هذه السلسلة - الذى يتناول الأسس العامة لتداول وتكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الحاصلات البستانية - يعد مدخلاً طبيعياً للتعلم فى دراسة هذا الموضوع على أسس علمية وتطبيقية

والله أسأل أن يكون قد حالبنى التوفيق فى تقديم إضافة جديدة للمكتبة العربية وللمعنيين بهذا المجال الهام

أ. د. أحمد عبد المنعم حسن

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
	الفصل الأول: الطماطم
٢٣	نضج الثمار
٢٣	مراحل تكوين ونضج الثمار
٢٥	سرعة التقدم في مراحل تكوين ونضج الثمار
٢٦	تأثير المعاملات السابقة للحصاد على نوعية الثمار بعد الحصاد
٢٦	الرطوبة الأرضية
٢٦	العوامل السمادية
٢٧	التغذية بغاز ثاني أكسيد الكربون
٢٨	العاملة بالإيثيفون قبل الحصاد
٢٨	أهمية العاملة بالإيثيفون
٢٩	الأمر التي تجب مراعاتها عن العاملة بالإيثيفون
٣٠	توقيت معاملة حقول الطماطم بالإيثيفون ومعدلاتها
٣١	معاملة الفئات الصنفية المختلفة بالإيثيفون
٣٣	العاملة بالـ LPE مقارنة بالإيثيفون
٣٤	الحصاد
٣٤	مراحل التكوين والنضج المناسبة للحصاد
٣٧	تأثير مرحلة تكوين ونضج الثمار عند الحصاد على المحصول وصفات الجودة
٣٨	طرق الحصاد
٤٢	مجمل عمليات تداول طماطم الاستهلاك الطازج بعد الحصاد
٤٣	تكنولوجيا تداول الطماطم بعد الحصاد وقبل التخزين والشحن
٤٣	تفريغ حمولة الشاحنات في محطات التعبئة والغسيل بالماء الكلور
٤٧	الفرز والتعبئة

المفحة	الموضوع
٤٩	التبريد الأولي
٥٠	فسولوجيا الطماطم بعد الحصاد
٥٠	التغيرات المصاحبة لنضج الثمار
٥٧	التنفس وإنتاج الإثيلين
٥٩	التغيرات التي تحدث في ثمار الطفرات المؤثرة في النضج
	التغيرات التي تحدث في ثمار الطماطم المحولة وراثيًا بهدف التأثير في
٦٥	النضج
٦٨	تأثير حالة الثمار وطريقة تداولها عند الحصاد وبعده على نوعيتها
٧٧	معاملات خاصة تعطاها الطماطم قبل التخزين والشحن
٧٨	معاملة ندبة المنق بالشيتوسان
٧٨	تغليف الثمار بفشاء بروتيني
٧٩	التشميع والمعاملة بالمتطهرات الفطرية
٧٩	التعرض للحرارة المرتفعة نسبيا قبل التخزين
٨٥	التعرض للدفع بصورة متقطعة أثناء التخزين
٨٦	المعاملة بالإثيلين
٨٦	المعاملة بالـ 1-MCP
٨٩	التعرض لتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون
٨٩	الغمر في محاليل أملاح الكالسيوم
٨٩	التعرض لأبخرة حامض الخليك
٨٩	التعرض لأبخرة الكحول الإيثيلي
٩٠	التعرض لأبخرة الهكسانال
٩١	التعرض لأبخرة الأسيتالدهيد
٩١	المعاملة بالمثل جاسمونيت
٩٢	المعاملة بمتعددات الأمين

الصفحة	الموضوع
٩٢	المعاملة بمضادات الأكسدة
٩٢	التعريض للأشعة الحمراء
٩٣	التعريض للأشعة فوق البنفسجية
٩٦	المعاملة بالأوزون
٩٦	التعريض لحقل كهرومغناطيسي
٩٧	إنضاج الثمار الخضراء مكتملة التكوين
٩٧	النضج الطبيعي
٩٧	الإنضاج الصناعي
٩٩	التخزين
٩٩	التخزين في الحرارة المنخفضة
١٠٢	أضرار البرودة
١٠٦	التغيرات في النكهة أثناء التخزين العادي
١٠٧	التخزين في الجو المعدل والجو المتحكم في مكوناته
١١١	التخزين تحت ضغط منخفض
١١٢	التصدير
١١٤	الطماطم المجهزة للمستهلك (الجاهزة للأكل)

الفصل الثاني: الفلفل

١١٩	مرحلة النضج المناسبة للحصاد
١٢٠	التغيرات المصاحبة لنمو الثمار ونضجها
١٢٢	المعاملات السابقة للحصاد ذات الأهمية فيما بعد الحصاد
١٢٢	الرش بأملح الكالسيوم
١٢٣	المعاملة ببعض منظمات النمو
١٢٣	معاملة البابريكا بالإيثيفون
١٢٣	الحصاد

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الصفحة	الموضوع
١٢٦	عمليات التداول والإعداد للتسويق
١٢٦	أصناف الاستهلاك الطازج
١٢٨	أصناف التجفيف
١٢٨	فسولوجيا ما بعد الحصاد
١٢٨	الفقد الرطوبي
١٢٨	التنفس، وإنتاج الإثيلين، وظاهرة الكلايمكتيريك
١٣٠	التغيرات فى النشاط الإنزيمى المؤثر فى صلابة الثمار
١٣٠	معاملات خاصة تعطاها ثمار الفلفل قبل التخزين والشحن
١٣١	المعاملة بالماء الساخن قبل التخزين
١٣٢	التدفئة المتقطعة أثناء التخزين
١٣٣	المعاملة ببيكربونات البوتاسيوم
١٣٣	المعاملة بمضادات الأكسدة
١٣٤	المعاملة باليثيل جاسمونيت
١٣٤	تغليف الثمار بغشاء رقيق من مواد صالحة للأكل
١٣٥	المعاملة بثانى أكسيد الكلورين
١٣٥	المعاملة بأشعة جاما
١٣٥	المعاملة بالبديدات الفطرية
١٣٦	التخزين
١٣٦	التخزين البارد
١٣٧	أضرار البرودة
١٣٩	التخزين فى الهواء التحكم فى مكوناته
١٤٢	التمبئة والتخزين فى الأغشية غير النفذة للرطوبة والمعدلة للجو (MAP)
١٤٥	التصدير
١٤٥	الفلفل المجهز للمستهلك

الموضوع	الصفحة
الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والشمار	
التفيرات العامة المصاحبة لنضج الثمار	١٤٩
علامات النضج، ومرحلة النضج المناسبة للحصاد	١٥٠
تأثير المعاملات السابقة للحصاد على نوعية الثمار بعد الحصاد	١٥٩
المعاملة بأملاح الكالسيوم	١٥٩
المعاملة بمثبط تمثيل الإثيلين: AVG	١٥٩
المعاملة بمستحضرات المقاومة الطبيعية للأمراض	١٦٠
الحصاد	١٦٠
نقل الثمار من الحقل إلى محطة التعبئة	١٦١
عمليات التداول	١٦٢
الفرز الأولي	١٦٤
الغسيل والتطهير	١٦٤
الفرز والتدريج	١٦٥
التعبئة والعبوات	١٦٧
التبريد الأولي	١٦٨
فسيولوجيا الكنتالوب بعد الحصاد	١٧٠
التنفس وإنتاج الإثيلين	١٧٠
الكلايمكتيريك والتفيرات المصاحبة للشيخوخة	١٧١
التفيرات الأيضية في الكنتالوب المحول وراثيًا بهدف زيادة قدرة الثمار	
التخزينية	١٧٤
معاملات خاصة يعطها الكنتالوب قبل التخزين والشحن	١٧٥
المعاملة بالماء الساخن	١٧٥
المعاملة بالمبيدات الفطرية والتشميع	١٧٨
المعاملة بأملاح الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكون	١٨٠

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر النمرية - التداول والتخزين والتصدير

الموضوع	الصفحة
المعاملة بمستحاثات المقاومة الطبيعية	١٨١
المعاملة بال 1-MCP	١٨١
معاملة ثمار الكنتالوب الأمريكى بمنظم النمو CPTA	١٨٢
معاملات الحجر الزراعى	١٨٣
معاملة ثمار شهد العسل بالإيثيلين	١٨٣
التخزين	١٨٤
التخزين البارد العادى	١٨٤
أضرار البرودة	١٨٨
التخزين والشحن فى الهواء المُحكم فى مكوناته	١٨٩
التخزين والشحن فى الهواء المعدل	١٩٠
التصدير	١٩٣
أسواق التصدير والطرز المطلوبة	١٩٣
مقاييس الجودة	١٩٣
الكنتالوب المجهز للمستهلك	١٩٧
التجهيز للمستهلك وما تجب مراعاته بهذا الشأن	١٩٧
أهمية استخدام الشفرات الحادة فى التقطيع	١٩٩
المعاملة بأصلاح الكالسيوم ومضادات الأكسدة	١٩٩
التخزين والتغيرات فى صفات الجودة	٢٠١
التلوث الميكروبى	٢٠٢

الفصل الرابع: البطيخ

علامات النضج	٢٠٣
التغيرات المصاحبة لنضج الثمار	٢٠٤
الحصاد	٢٠٥
عمليات التداول	٢٠٥

الصفحة	الموضوع
٢٠٦	التدريج
٢٠٦	الفرز لأجل التصدير
٢٠٧	التعبئة والعبوات
٢٠٨	التبريد الأولي
٢٠٩	فسيولوجى البطيخ بعد الحصاد
٢١١	الظروف المناسبة للتخزين والشحن والتغيرات الثمرية المصاحبة لهما
٢١٢	التصدير
٢١٢	نوعيات الثمار التى يجب فرزها وعدم تصديرها
٢١٣	الأضرار الشائعة الحدوث فى رسائل البطيخ المصدرة ووسائل تجنبها
٢١٤	البطيخ المجهز للمستهلك
الفصل الخامس: الخيار	
٢١٧	مرحلة النضج المناسبة للحصاد
٢١٨	العوامل السابقة للحصاد التى تؤثر فى القدرة التخزينية لثمار الخيار
٢٢٠	الحصاد
٢٢٢	عمليات التداول
٢٢٢	التدريج
٢٢٢	التخميع والمعاملة بالطهرات الفطرية
٢٢٣	التبريد الأولي
٢٢٤	فسيولوجيا الخيار بعد الحصاد
٢٢٥	معاملات خاصة يُعطاهما الخيار قبل التخزين والشحن
٢٢٥	المعاملة الحرارية قبل التخزين البارد
٢٢٦	التدفئة المتقطعة أثناء التخزين البارد
٢٢٨	المعاملة بال 1-MCP
٢٢٨	المعاملة بحامض السليلك

الصفحة	الموضوع
٢٢٩	التخزين
٢٢٩	التخزين البارد العادى وأضرار البرودة
٢٣١	التخزين فى الجو المتحكم فى مكوناته
٢٣١	التخزين مع التعبئة فى الأغشية المعدلة للهواء

الفصل السادس: الكوسة

٢٣٥	تأثير الظروف السابقة للحصاد على القدرة التخزينية للثمار
٢٣٥	الحصاد
٢٣٦	التداول
٢٣٦	فسولوجيا الكوسة بعد الحصاد
	معاملات خاصة تُعطىها الكوسة قبل التخزين والشحن للحد من
٢٣٧	أضرار البرودة
٢٣٧	المعاملات الحرارية
٢٣٩	المعاملة بأملاح الكالسيوم وبنزوات الصوديوم
٢٣٩	المعاملة بمتعددات الأمين
٢٣٩	المعاملة بالثيل جاسمونيت
٢٤١	التخزين
٢٤١	التخزين البارد العادى وأضرار البرودة
	التخزين فى الجو المتحكم فى مكوناته وعلاقة ذلك بالحد من الإصابة بأضرار
٢٤٣	البرودة
٢٤٤	تغليف الثمار وتعبئتها فى أغشية معدلة للجو
٢٤٥	الكوسة المجهزة للمستهلك

الفصل السابع: الفراولة

٢٤٧	العوامل المؤثرة فى سرعة نضج الثمار
-----	------------------------------------

الصفحة	الموضوع
٢٤٨	التغيرات المصاحبة للنضج
٢٤٨	صفات جودة الثمار
٢٥٠	تأثيرات المعاملات السابقة للحصاد على صفات جودة الثمار
	وقدرتها التخزينية
٢٥٠	معاملات التسميد
٢٥٢	مستوى الإضاءة
٢٥٢	المعاملة بمحفزات المقاومة الطبيعية للأمراض
٢٥٣	المكافحة الجيدة للبوثرى
٢٥٤	فسيولوجيا ما بعد الحصاد
٢٥٤	التغيرات التي تطرأ على الثمار بعد الحصاد
٢٥٨	معدل تنفس الثمار
٢٥٨	إنتاج الثمار من الإثيلين
٢٥٩	موسم الحصاد ودورات الإنتاج
٢٦١	الحصاد
٢٦١	الحصاد لأجل التسويق المحلى للثمار الطازجة
٢٦٢	الحصاد لأجل تصدير الثمار الطازجة
٢٦٩	الحصاد لأجل التصنيع
٢٧٠	عمليات التداول السابقة للتبريد الأولى
٢٧٣	عبوات الفراولة
٢٧٣	عبوات المستهلك: "البنتس" Punnets
٢٧٥	الكراطين
٢٧٧	تجهيز البالتات Palletization
	معاملات بعد الحصاد لتحسين الجودة والقدرة التخزينية والمقاومة
٢٧٧	للأمراض

الصفحة	الموضوع
٢٧٧	التمريض للضوء
٢٧٨	التمريض للأشعة فوق البنفسجية
٢٧٩	تغطية الثمار بأغشية صالحة للأكل
٢٨٢	المكافحة الحيوية لأعفان الثمار
٢٨٢	العاملة بأبخرة حامض الخليك
٢٨٣	التبخير بأكسيد النيتريك
٢٨٣	العاملة بمتعددات الأمين
٢٨٣	العاملة بالركبات العطرية الطبيعية التي تنتجها الثمار
٢٨٥	العاملة بالمثيل جاسمونيت
٢٨٦	العاملة بال I-MCP
٢٨٧	العاملة بالحرارة
٢٨٨	العاملة بأشعة جاما
٢٨٨	سلسلة التبريد وأهميتها
٢٩١	التبريد الأولى
٢٩٢	تبريد الغرفة
٢٩٢	التبريد الأولى بطريقة الدفع الجبرى للهواء
٢٩٨	التبريد الأولى تحت التفريغ
٢٩٨	التبريد الأولى بالماء البارد
٣٠٠	التخزين البارد المؤقت
٣٠١	التخزين والشحن فى جو هوائى معدل أو متحكم فى مكوناته
٣٠٩	امتصاص الإثيلين المحيط بالثمار أثناء الشحن والتخزين
٣١٠	طرق الشحن
٣١١	الشحن البرى
٣١٢	الشحن الجوى ووسائل المحافظة على سلسلة التبريد

الموضوع	الصفحة
الشحن البحري	٣١٦
التصدير	٣١٦
مواسم وأسواق التصدير	٣١٦
رتب الفراولة المصدرة	٣١٧
بيانات الكراتين	٣١٧
مواصفات فراولة التصدير	٣١٨

الفصل الثامن : الفاصوليا

النضج	٣٢١
أولاً: محصول القرون الخضراء	٣٢١
ثانياً: محصول البذور الخضراء	٣٢٤
الحصاد	٣٢٤
أولاً: محصول القرون الخضراء	٣٢٤
ثانياً: محصول البذور الخضراء	٣٢٧
ثالثاً: محصول البذور الجافة	٣٢٨
التففس وإنتاج الإثيلين	٣٢٩
التداول	٣٢٩
الفرز	٣٣٠
التعبئة	٣٣١
التبريد الأول	٣٣٢
المعاملة بالـ 1-MCP	٣٣٦
التخزين	٣٣٦
التخزين البارد العادى	٣٣٦
التخزين فى الهواء المتحكم فى مكوناته	٣٣٨
التخزين فى الجو المعدل	٣٣٩

الصفحة	الموضوع
٣٤٠	أهمية التخلص من الإثيلين
٣٤٠	تنفس القرون أثناء التخزين
٣٤١	التغيرات المصاحبة للتخزين
٣٤٣	التصدير
٣٤٤	نبت الفاصوليا

الفصل التاسع: البسلة

٣٤٧	النضج والحصاد
٣٤٧	أولاً: البسلة التي تزرع لأجل البذور الخضراء
٣٥١	ثانياً: البسلة التي تزرع لأجل البنور الجافة
٣٥١	ثالثاً: البسلة السكرية
٣٥١	التنفس وإنتاج الإثيلين
٣٥٢	التداول
٣٥٤	التخزين
٣٥٦	التصدير

الفصل العاشر: الخضر الثمرية الأخرى

٣٥٧	الباذنجان
٣٥٨	التغيرات الكيميائية الحيوية المصاحبة لنمو الثمار ونضجها
٣٥٨	التنفس وإنتاج الإثيلين
٣٥٩	التداول
٣٥٩	التخزين المبرد العادي
٣٦٠	أضرار البرودة
٣٦٢	التغيرات المصاحبة للثمار أثناء تخزينها وشحنها
٣٦٣	التخزين في الجو المعدل والجو المتحكم في مكوناته

الصفحة	الموضوع
٣٦٥	وسائل إطالة فترة صلاحية الثمار للتخزين ..
٣٦٦	الباذنجان المجهز للمستهلك
٣٦٦	البامية ..
٣٦٦	النضج والحصاد ..
٣٦٨	التنفس وإنتاج الإثيلين ..
٣٦٨	التداول ..
٣٧٠	التخزين ..
٣٧١	الحرثنكش ..
٣٧١	التغيرات المصاحبة لنضج الثمرة
٣٧٢	الحصاد ..
٣٧٢	التنفس وإنتاج الإثيلين ..
٣٧٢	التداول والتخزين ..
٣٧٣	القرع العسلى وقرع الشتاء ..
٣٧٣	عمليات التداول ..
٣٧٤	التخزين ..
٣٧٥	التغيرات المصاحبة لنضج الثمار، ومعالجتها، ومعاملتها حرارياً، وتخزينها ..
٣٨٠	اليقطين ..
٣٨٠	الشمام المر ..
٣٨١	الحصاد ..
٣٨١	التخزين ..
٣٨٢	الشحن ..
٣٨٢	اللوبيا ..
٣٨٢	الحصاد ..
٣٨٣	التداول والتخزين ..

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الصفحة	الموضوع
٣٨٣	فاصوليا الليما
٣٨٣	النضج والحصاد
٣٨٥	التداول
٣٨٥	التخزين
٣٨٦	الذرة السكرية
٣٨٦	علامات مرحلة التكوين المناسبة للحصاد
٣٩٠	صفات الجودة
٣٩١	طرق الحصاد
٣٩٣	التنفس وإنتاج الإثيلين
٣٩٣	التداول
٣٩٥	التخزين
٣٩٦	التخزين في الجو المتحكم في مكوناته
٣٩٦	التخزين في الجو المعدل
٣٩٩	المراجع

الفصل الأول

الطماطم

نضج الثمار

مراحل تكوين ونضج الثمار

تمر ثمار الطماطم حتى نضجها بالآطوار التالية :

١ - الثمار الخضراء غير المكتملة التكوين Immature Green :

من أهم مواصفات الثمار الخضراء غير المكتملة التكوين أن المادة شبة الجيلاتينية لا تكون قد ظهرت في أى من مساكن الثمرة. كما لا تكون البذور قد اكتملت تكوينها. وإذا قطعت الثمرة بسكين حاد فإن البذور تقطع ولا تنزلق. وتلزم مدة تزيد عن ١٠ أيام، في حرارة ٢٠°م، وهى على النبات لوصول هذه الثمار إلى طور بداية التلوين Breaker Stage. أما إذا قطفت وهى فى هذا الطور، فإنها لا تتلون.

٢ - طور الثمار الخضراء المكتملة التكوين جزئياً Partially Mature Green :

تتميز الثمار فى هذا الطور بتكوّن المادة شبه الجيلاتينية فى مسكن واحد على الأقل، دون أن تظهر فى كل مساكن الثمرة، وتكون البذور مكتملة التكوين. وتحتاج هذه الثمار إلى ٥ - ١٠ أيام - فى حرارة ٢٠°م - حتى تصل إلى طور بداية التلوين وهى على النبات، وإذا قطفت الثمار - وهى فى هذا الطور - ، فإنها لا تتلون بصورة جيدة، وتصبح صلبة وجلدية عند إنضاجها صناعياً.

٣ - طور الثمار الخضراء مكتملة التكوين Typical Mature Green :

تتميز الثمرة فى هذا الطور باكتمال نموها وتظهر عليها ندبة فلينية بنية فى موضع اتصالها بالعنق، كما يتغير لون الطرف الزهرى فيها من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الباهت، أو الأخضر الضارب إلى الأصفر قليلا، وتكون الثمرة لامعة فى هذه المنطقة. تكون البذور مكتملة التكوين، ومحاطة جيداً بالمادة شبة الجيلاتينية فى جميع المساكن، فتنزلق عند محاولة مسكها بين الأصابع، كما تنزلق البذور ولا تقطع عند قطع الثمرة

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

بسكين حاد. تحتاج هذه الثمار إلى ١ - ٥ أيام - في حرارة ٢٠م - حتى تصل إلى طور بداية التلوين، سواء أكان ذلك قبل الحصاد أم بعده

٤ - طور الثمار الخضراء مكتملة التكوين المتقدم Advanced Mature Green. تتشابه الثمار في هذا الطور مع الثمار الخضراء في طور اكتمال التكوين، فيما عدا ظهور بعض التلون الأحمر الداخلي. وتحتاج هذه الثمار إلى يوم واحد - في حرارة ٢٠م - لكي تصل إلى طور بداية التلوين (Gnerson & Kader ١٩٨٦).

٥ - طور بداية التلوين Breaker: تظهر بداية التلوين بوضوح في هذا الطور، فيتغير لون الطرف الزهري من الأخضر إلى الأصفر المخضر أو الوردى، أو الأحمر، ولا تزيد مساحة الجزء المتلون عن ١٠٪ من مساحة الثمرة

٦ - طور التحول Turning. تسمى الثمار في هذا الطور في مصر بـ "المخوصة". يظهر على الثمار في هذا الطور تحول واضح إلى اللون الأصفر المخضر أو الوردى، أو الأحمر، أو خليط من هذه الألوان في مساحة ١٠٪ - ٣٠٪ من سطح الثمرة، ويكون التلون أكثر اكتمالا وتركيزاً في الطرف الزهري، بينما يظل باقى الثمرة باللون الأخضر الفاتح.

٧ - الطور الوردى Pink يتحول فيه من ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من سطح الثمرة إلى اللون الوردى أو الأحمر

٨ - طور النضج الأحمر الفاتح Light Red تصل فيه المساحة الملونة باللون الأحمر الوردى، أو الوردى إلى ٦٠٪ - ٩٠٪ من سطح الثمرة

٩ - طور النضج الأحمر Red أو التام: تتراوح فيه المساحة الملونة باللون الأحمر من ٩٠٪ - ١٠٠٪ من سطح الثمرة

١٠ - طور النضج الزائد Over Ripe

يبدأ هذا الطور بعد انتهاء تلوين الثمرة، وأهم ما يميزه بداية فقد الثمار لصلابتها

سرعة التقدم فى مراحل تكوين ونضج الثمار

تصل الثمار عادة إلى طور اكتمال التكوين الأخضر بعد نحو ٣٥ - ٤٥ يوماً من التلقيح، بينما يستغرق وصولها إلى طور النضج الأحمر ٤٥ - ٦٠ يوماً من التلقيح (Lorenz & Maynard ١٩٨٠)، حيث تزداد المدة مع انخفاض درجة الحرارة، وتكون المدة الطويلة فى الجو المائل للبرودة. أما فى الجو البارد، فإن نضج الثمار يستغرق فترات أطول من ذلك، بينما يتوقف النضج تماماً فى الجو شديد البرودة. ويوضح جدول (١-١) عدد الأيام التى تلزم لتحول ثمار الصنف فى إف ١٤٥ - بي ٧٨٧٩ من أحد أطوار التكوين لأطوار أخرى أكثر تقدماً فى الجو الدافئ.

جدول (١-١): عدد الأيام اللازمة لتحول ثمار الصنف فى إف ١٤٥ - بي ٧٨٧٩ من أحد أطوار التكوين لأطوار أخرى أكثر تقدماً.

عدد الأيام لحين وصول الثمار إلى طور النضج الوردى	عدد الأيام لحين وصول الثمار إلى طور النضج الأحمر	طور التكوين والنضج
١١	١٨	ثمار خضراء ناضجة جزئياً
٧	١٤	طور النضج الأخضر التام
-	٧	طور النضج الوردى

ولدرجة الحرارة شديدة الارتفاع تأثير سلبي على تلون ثمار الطماطم، مثلما للحرارة شديدة الانخفاض.

فيمكن لثمار الطماطم الخضراء التى تعرضت لحرارة ٤٠°م لمدة لا تزيد عن يوم واحد، أو لحرارة ٣٥°م لمدة لا تزيد عن يومين أن تتلون بصورة طبيعية إذا تعرضت بعد ذلك - مباشرة - لحرارة ٢٥°م، ولكنها تبقى خضراء اللون إذا ظلت فى الحرارة العالية (٣٥°م أو ٤٠°م)، أو إذا نقلت بعد معاملة الحرارة العالية إلى ٣٠°م (Inaba & Chachin ١٩٩٨).

وفى دراسة معملية .. تمكن Cohen (١٩٩٦) من إنتاج ثمار طماطم بكرية صغيرة

مكتملة النضج بزرعة الأزهار غير مكتملة التكوين في بيئات صناعية تحتوى على ١٠-٤ مولاراً من إندول حامض الخليك، وقد وجد أن إضافة الهرمون إلى بيئة النمو بتركيز ١٠^{-٤} مولاراً قبل مرحلة بداية التلوين أدى إلى زيادة الفترة التي استغرقها تحول الثمار من مرحلة بداية التلوين إلى مرحلة التلون الأحمر الكامل من ٧ أيام إلى ١٢ يوماً؛ الأمر الذى يفيد إمكان إحداث تغيرات جوهريّة في الفترة التي يستغرقها نضج الثمار بتغيير مستوى الأوكسين فيها

تأثير المعاملات السابقة للحصاد على نوعية الثمار بعد الحصاد

الرطوبة الأرضية

لوحظ في الأوقات التي يسودها جو ممطر - عندما تعقبها أيام باردة تسودها الغيوم - قبل الحصاد - أن الثمار تكون أكثر عرضة للإصابة بأضرار البرودة عند التخزين، إلا أن الرى بالرش لا يحدث هذا الأثر؛ الأمر الذى يعنى وجود عامل أو عوامل أخرى تؤثر على الحساسية لأضرار البرودة غير الرطوبة الأرضية غير أن Dodds وآخرين (١٩٩٦) وجدوا أن ارتفاع منسوب الماء الأرضى أدى إلى زيادة حساسية الطماطم للإصابة بأضرار البرودة.

المعاملات السمادية

من المعلوم أن تسمم نباتات الطماطم الناشئ عن زيادة التسميد الأمونيومى يؤدي إلى إنتاج غاز الإثيلين من النموات الخضرية. وقد توصل Barker & Ready (١٩٩٤) إلى نتائج مماثلة بالنسبة للثمار، حيث وجدوا أن نباتات الطماطم التي اعتمدت في تغذيتها على النيتروجين الأمونيومى ازدادت فيها نسبة الإصابة بتعفن الطرف الزهرى، وكانت ثمارها أكثر إنتاجاً للإثيلين مقارنة بثمار النباتات التي اعتمدت في تغذيتها على النيتروجين النتراتى، والتي لم تظهر عليها زيادة غير عادية في إنتاج الإثيلين

وبصفة عامة فإن أضرار البرودة تزداد - عند التخزين - بزيادة معدلات التسميد بكبريتات الأمونيوم، وتقل بزيادة التسميد بأى من الفوسفور أو البوتاسيوم (عن Dodds وآخرين ١٩٩٦) هذا إلا أن Dodds وآخرون (١٩٩٦) لم يجدوا تأثيراً لمعدلات التسميد

الفصل الأول. الطماطم

بأى من البوتاسيوم أو الكالسيوم فى الحقل على الحساسية للإصابة بأضرار البرودة بعد الحصاد

وبالمقارنة .. يُستدل من دراسات Garcia وآخرين (١٩٩٥) أن رش نباتات الطماطم بكلوريد الكالسيوم تسع مرات - بتركيز ٠.١ مولار - بداية من الشهر الثانى بعد الشتل أدى إلى زيادة صلابة الثمار أثناء التخزين وزيادة محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية، ولكن مع زيادة - كذلك - فى سرعة تلون الثمار، وفى سرعة فقدائها لوزنها

كذلك وجد Hong وآخرون (١٩٩٥) أن زيادة تركيز الكالسيوم فى المحاليل المغذية لمزارع الطماطم المائية - مع قطف الثمار وهى خضراء مكتملة النمو - أدى إلى تأخير نضجها. وظهر ذلك فى صورة تأخير فى تلون الثمار، وبطء فقدائها لصلابتها، ونقص فى معدل إنتاجها لغاز الإثيلين، مقارنة بثمار النباتات التى أعطيت مستويات عادية من الكالسيوم. وبالمقارنة .. لم تكن لمعاملة الكالسيوم أية تأثيرات على الثمار التى قطف فى مرحلة بداية التلون. وقد ازداد المحتوى البكتينى لثمار الطماطم بزيادة تركيز الكالسيوم.

التغذية بغاز ثانى أكسيد الكربون

وجد Behboudian & Tod (١٩٩٥) أن زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون فى حجرات النمو إلى ١٠٠٠ جزء فى المليون أدى إلى زيادة محتوى الثمار من السكر، والجلوكوز، والفراكتوز، والمواد الصلبة الذائبة الكلية عما فى ثمار الكنترول التى نُميت نباتاتها فى الهواء العادى. كما أدت المعاملة بثانى أكسيد الكربون إلى إبطاء نضج الثمار، ونقص معدل تنفسها ومعدل إنتاجها من الإثيلين، مقارنة بثمار النباتات التى لم تتلق تلك المعاملة، وجميعها تغيرات مرغوب فيها.

كما وجد Islam وآخرون (١٩٩٥) أن زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون خلال فترة نمو وتكوين الثمار أحدثت نقصاً جوهرياً فى محتوى الثمار من أحماض الستريك والماليك والأوكساليك، مع زيادة جوهرياً فى تركيز السكريات المختزلة، وفى دكنة اللون الأحمر أثناء التخزين فى حرارة ٢٠°م.

المعاملة بالإيثيفون قبل الحصاد

أهمية المعاملة بالإيثيفون

أوضحت عديد من الدراسات أن معاملة نباتات الطماطم بالإيثيفون Ethephon قبل الحصاد تؤدي إلى سرعة نضج الثمار، وتركيز النضج خلال فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الذى يؤدي إلى زيادة المحصول فى حالة إجراء الحصاد آلياً، بدون تأثير على نوعية الثمار. ففى إحدى الدراسات أدت المعاملة بالإيثيفون بمعدل ٣٧٥ مل (سم^٢) للفدان إلى تكبير الحصاد الآلى بنحو ١٢ - ١٤ يوماً، زيادة المحصول بمقدار ٥ - ١٠ أطنان للفدان، مع زيادة نسبة الثمار الصالحة للتسويق من ٥٩٪ إلى أكثر من ٩٠٪ (Dostal & Wilcox ١٩٧١). وفى دراسة أخرى أدت المعاملة بالإيثيفون إلى تكبير النضج بنحو ١٠ أيام، مع نقص وزن الثمرة فى الأصناف ذات الثمار الكبيرة (Splintstoesser & Vandemark ١٩٧١).

وتضمنت المعاملة بالإيثيفون فى الحالات التالية:

- ١ - عند الرغبة فى إسراع النضج مبكراً فى الربيع للاستفادة من ارتفاع الأسعار، كما يكون عليه الحال خلال الفترة الممتدة من حوالى منتصف شهر مارس إلى آخر شهر أبريل فى مصر يسمح ذلك ببدا الحصاد مبكراً بنحو ٥-٧ أيام.
- ٢ - عند الرغبة فى إسراع النضج فى الخريف، لتجنب التعرض للصقيع فى المناطق التى يحدث فيها صقيع.
- ٣ - عند الرغبة فى تركيز نضج الثمار خلال فترة زمنية قصيرة، لتسهيل الحصاد اليدوى، أو لأجل الحصاد الآلى
- ٤ - زيادة المحصول فى حالات العقد غير المستمر؛ حيث توجد فترتان للعقد تفصلها فترة بدون عقد
- ٥ - التغلب على مشكلة النضج المتأخر فى الحقول ذات النمو الخضرى الزائد
- ٦ - خفض تكاليف فرز الطماطم حسب درجة النضج، لأن نضج لثمار يكون متجانساً

- ٧ - تقليل فقد في وزن الثمار - الذى يحدث خلال الفترة التى يتطلبها اكتمال النضج - لأن النضج يكون سريعاً.
 - ٨ - تقليل الشروط والمواصفات التى يتعين توفرها فى غرف الإنضاج.
 - ٩ - احتفاظ الثمار - التى تنضج بعد المعاملة بالإيثيفون - بمحتوى من حامض الأسكوربيك أكثر ارتفاعاً عما يكون عليه الحال فى الثمار التى تنضج طبيعياً دون أن تعامل بالإيثيفون.
- ويترتب على المعاملة بالإيثيفون بتركيز ١٢٥ - ٥٠٠ جزء فى المليون - سواء أكانت المعاملة للنباتات قبل الحصاد بفترة قصيرة، أم للثمار بعد الحصاد مباشرة - إلى تقصير الفترة التى يستغرقها نضج الثمار ما بين ٥ أيام و ١٢ يوماً، حسب التركيز المستخدم والصنف المستعمل (Kaynas وآخرون ١٩٩٢).
- هذا .. إلا أن الثمار لا تزداد فى الحجم كثيراً بعد المعاملة.

الأمر الذى تجب مراعاتها عن المعاملة بالإيثيفون

- يجب أن تؤخذ الأمور التالية فى الحسبان لأجل ضمان فاعلية المعاملة بالإيثيفون:
- ١ - عدم معاملة الحقول التى تكون نباتاتها ضعيفة النمو أو معرضة لأى شدة؛ ذلك لأن المعاملة بالإيثيفون يمكن أن تحدث سقوطاً لبعض أوراق النبات؛ مما يعرض النباتات للضعيفة النمو الإصابة بثمارها بلسعة الشمس.
 - ٢ - لا تجوز المعاملة بالإيثيلين إذا كان من المتوقع ارتفاع الحرارة عن ٣٢°م.
 - ٣ - لا تفيد المعاملة بالإيثيفون فى إسراع نضج الثمار غير الناضجة؛ فهى يجب أن تكون خضراء مكتملة التكوين لكى تفيد معها المعاملة. وأفضل وقت للمعاملة هو عندما تكون ٥٪ - ١٥٪ من الثمار فى الحقل - بالعدد - وردية أو حمراء اللون. ولا تستفيد الحقول التى تزيد فيها نسبة الثمار - التى بدأت فى التحول اللونى - أو كانت فى أى درجة من درجات التلوين تزيد عن ٤٠٪ - من المعاملة.
 - ٤ - عدم رش مساحات تزيد عما يمكن حصاده فى اليوم الواحد؛ نظراً لأن

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية. التداول والتخزين والتصدير

ثمار النباتات المرشوشة لا تبقى بحاله جيدة على "العرش" كثمار النباتات غير المعاملة.

٥ - تتباين الأصناف فى قوة النمو وصفات الأوراق؛ ومن ثم فى مدى استجابتها لمعاملة الإثيفون هذا وتحصد الثمار - عادة - بعد نحو ٢-٣ أسابيع من المعاملة حسب درجة الحرارة

٦ - لا يخلط الإثيفون مع انبيدات، كما يستعمل محلون الرش أولاً بأول، ولا يترك ولو حتى إلى صباح اليوم التالى

توقيت معاملة حقول الطماطم بالإثيفون ومعدلاتها

يعتبر الرش بالإثيفون إحدى معاملات مظمات النمو التى تتبع على نطاق تجارى واسع فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتجرى المعاملة فى الحقول المعدة للحصاد الآلى سواء أكانت من أصناف التصنيع، أم من أصناف الاستهلاك الطازج. ويقرر المزارع بنفسه أهمية إجراء المعاملة عند تعرض الحقل لظروف بيئية غير مناسبة مثل الجفاف، أو سوء التغذية، أو أى عامل يحد من النمو الجذرى، أو التعرض للإصابات المرضية أو انحشورية

ولا تجوز المعاملة بالإثيفون فى الحالات التى تتجاوز فيها النباتات المرحلة المناسبة للمعاملة، أو عندما يكون التبكير فى الحصاد أمراً غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بعملية الحصاد أو التسويق ولا تجرى المعاملة إلا فى مرحلة معينة من النضج، وهى عندما تكون الثمار ما بين مرحلة النضج الأخضر، و ٥٪ - ١٠٪ تلوين وتقدر حالة النضج فى الحقل بتقليع ٣ - ٥ نباتات من عدة أماكن ممثلة للحقل. وهزها بقوة حتى تسقط الثمار، ثم تستبعد الثمار التى يقل قطرها عن ٢,٥ سم. وتقسم لثمار الباقية إلى ٣ مجاميع خضراء غير مكتملة التكوين، وخضراء مكتملة التكوين، وملونة بأية درجة من بداية التلوين حتى الأحمر التام وتقطع الثمار الخضراء للتأكد من كونها مكتملة أم غير مكتملة التكوين ثم يلى ذلك تقدير نسبة الثمار فى كل مجموعة بالوزن، أو بالعدد

يكون معدل استخدام الإثيفون حوالى ٠.٥ - ١.٠ لتر للفدان فى الحرارة العالية،

يزداد إلى ١.٢٥ - ١.٧٥ لترًا في الجو المعتدل والمائل إلى البرودة، وإلى ٢ لتر في الجو البارد. تذاب هذه الكميات في كمية الماء التي تلزم لرش فدان (٢٠٠ - ٦٠٠ لتر حسب نوع الرشاشات المستخدمة). ولا تفيد زيادة كمية الإثيفون عن ٢ لتر للفدان لأنها تؤدي إلى سقوط نسبة عالية من الأوراق، وخفض جودة الثمار.

وأفضل حرارة لإجراء المعاملة عندها هي ٢٤ - ٢٩ م°.

ويجرى الحصاد - عادة - بعد نحو ١٤ - ١٨ يومًا من المعاملة.

معاملة الفئات الصنفية المختلفة بالإثيفون

معاملة أصناف طماطم (التصنيع)

يراعى عند معاملة حقول التصنيع أن أكثر الثمار استجابة للمعاملة بالإثيفون هي الخضراء مكتملة التكوين، والتي يلزم أن تكون نسبتها من ٥٠٪ - ٦٠٪، بينما لا تزيد نسبة الثمار الملونة عن ٥٪ - ١٥٪ عند المعاملة. تجرى المعاملة مرة واحدة خلال الموسم بمعدل ٨٠ - ٤٠٠ لتر من محلول الرش الذي يتوقف تركيزه على درجة التبيكير في النضج، ودرجة الحرارة السائدة.

ففي الجو الحار يستخدم الإثيفون في الأصناف المبكرة بمعدل ١٨٠ مل (سم^٢) للفدان عند تلون ٥٪ - ١٥٪ من الثمار، وتستمر باقى العمليات الزراعية بصورة طبيعية حتى الحصاد الذي يكون عادة بعد ١٢ - ١٥ يومًا. وفي الأصناف المتوسطة في موعد النضج، مثل: فى إف ١٤٥ - بى ٧٨٧٩، يستخدم الإثيفون بمعدل ٣٦٠ مل للفدان عند تلون ١٠٪ - ٢٠٪ من الثمار، أو عند تلون ٢٥٪ - ٣٥٪ من الثمار في الأصناف الأكثر صلابة، ويجرى الحصاد عادة بعد ١٤ - ١٦ يومًا من المعاملة. ولا ينصح بإجراء المعاملة عند ارتفاع الحرارة عن ٤١ م°.

أما في الجو البارد، فيستخدم الإثيفون في الأصناف المبكرة الصلبة بمعدل ٣٦٠ مل للفدان عند تلون ٢٥٪ - ٣٥٪ من الثمار. ويستخدم الإثيفون في الأصناف المتوسطة النضج بمعدل ٤٥٠ مل للفدان عند تلون ١٥٪ - ٢٠٪ من الثمار.

وتعامل الأصناف المتأخرة معاملة الأصناف متوسطة النضج ، ولكنها تستغرق وقتاً أطول حتى الحصاد كما يجب وصول محلول الرش إلى معظم الأسطح النباتية ولا يجوز خلط الإثيفون بأية مادة أخرى (Sims وآخرون ١٩٧٩)

معاملة أصناف الاستهلاك الطازج

يراعى عند معاملة حقول الاستهلاك الطازج أن تتم هذه المعاملة قبل الحصاد بنحو ٣ - ٦ أيام عند تلون حوالى ٥٪ - ١٠٪ من الثمار ؛ إذ تؤدي المعاملة فى هذا الوقت إلى إسراع نضج الثمار بعد الحصاد ، فلا يستغرق التلون التام لكل الثمار سوى ٣ أيام عند المعاملة قبل الحصاد بستة أيام ، و٦ أيام عند المعاملة قبل الحصاد بثلاثة أيام ، بينما يستغرق التلون التام لثمار النباتات غير المعاملة مدة ١٢ يوماً بعد الحصاد ، ويعنى ذلك إسراع تلون الثمار الخضراء الناضجة فى العبوات أثناء الشحن والتسويق ، مما يقلل الاختلافات فى درجة التلون فى العبوة الواحدة

ويستخدم الإثيفون بمعدل ١.٥-٢ لتر للفدان فى ١٦٠ لتر ماء ويوصى بالتركيز العالى عند المعاملة قبل الحصاد بستة أيام ، وعند انخفاض درجة الحرارة عن ٣٠°م ، وعندما يكون النمو الخضرى غزيراً ، وتقل الكمية المستعملة من محلول الرش عندما تقتصر المعاملة على خطوط الزراعة فقط ، كما لا ينصح بالمعاملة بالإثيفون عند ارتفاع درجة الحرارة عن ٣٨°م ، لأن المعاملة حينئذ تؤدي إلى سقوط بعض أوراق النباتات ، مما يؤدي إلى تعرض الثمار للإصابة بلفحة الشمس . ويجب ألا تتعرض النباتات لأية ظروف بيئية غير مناسبة ، أو لإصابات مرضية أو حشرية أثناء المعاملة أو بعدها مباشرة (Sims & Scheuerman ١٩٧٩)

معاملة أصناف طماطم (الزراعات المحمية)

يمكن أن تبكر المعاملة بالإثيفون من نضج الثمار فى الزراعات المحمية فى إحدى الدراسات وجد أن معاملة الثمار بـ ١٥ - ٣٥ يوماً من تفتح الأزهار بتركيز ٥٠٠ جزء فى المليون أسرعت من وصول الثمار إلى طور بداية التلون بنحو ٧ أيام ،

وأحدثت زيادة في المحصول المبكر. ولكنها لم تؤثر على المحصول الكلى (Iwahori & Lyons ١٩٧٠).

معاملة الأصناف ذات الثمار الكريزية

يشكل حصاد الثمار نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج في الأصناف ذات الثمار الكريزية. وهي التي تزرع - غالباً - في البيوت المحمية وقد وجد Ohta وآخرون (١٩٩٢) أنه يمكن حصاد العناقيد الثمرية كاملة بخفها على ١٥ ثمرة للعنقود غير المتفرع أو على ٢٠ ثمرة للعنقود المتفرع، ثم رش العنقود كله بالإيثيفون بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون أدت هذه المعاملة إلى تجانس نضج الثمار، وزيادة محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية، دون التأثير على وزنها أو محتواها من الأحماض، ولكن مع فقد جلد الثمرة وجدرها لبعض من صلابتها

المعاملة بالـ LPE مقارنة بالإيثيفون

وجد Farag & Palta (١٩٩٣) أن رش نباتات الطماطم جيداً بأى من: الإيثيفون بتركيز ١٠٠ جزء في المليون، أو بمحلول من lysophosphatidylethanol-amine (وهو دهن طبيعي يكتب اختصاراً LPE) بتركيز ١٪ في الميثانول قبل الحصاد بنحو أسبوعين. أدى رشها إلى زيادة نسبة الثمار الصلبة الناضجة جيداً - في أى من المعاملتين - إلى حوالى ٥٠٪، مقارنة بنحو ١٨٪ في معاملة الشاهد التي رشت بالماء ولكن الأوراق التي رشت بالإيثيفون جفت، بينما لم يظهر سوى بعض الأصفرار على الأوراق في كل من حالتى الرش بالـ LPE والكنترول. وقد احتفظت الثمار الصلبة بجودتها لمدة ٥ أيام في حرارة ٢٢°م كما ترتب على أى من المعاملتين زيادة نسبة الثمار المخزنة التي ظلت محتفظة بصلابتها بعد التخزين إلى حوالى ٥٥٪، مقارنة بنحو ٢٨٪ فى الكنترول، مع انخفاض فى نسبة الثمار التى تعفنت إلى نحو ٦٪، مقارنة بنحو ٢٣٪ فى الكنترول وقد أدت معاملة النباتات بكلتا المركبين معاً (الإيثيفون والـ LPE بتركيز ١٠٠ جزء فى المليون لكل منهما) إلى زيادة نسبة الثمار الصالحة للتسويق، ونقص

نسبة الثمار الخضراء عند الحصاد، مع زيادة نسبة الثمار التي احتفظت بجودتها بعد التخزين عما في معاملة الكنترول

الحصاد

مراحل التكوين والنضج المناسبة للحصاد

عند اختيار مرحلة النمو والنضج المناسبة للحصاد يجب مراعاة ما يلي.

- ١ - الثمار الخضراء غير مكتملة التكوين: لا تصلح للقطف، ولا تتلون بعد الحصاد
- ٢ - الثمار الخضراء مكتملة التكوين جزئياً: لا تصلح أيضاً، ولا تتلون بصورة جيدة بعد الحصاد، ولا تكتسب الخصائص الجيدة الصالحة للأكل، حتى لو أنضجت صناعياً

- ٣ - الثمار الخضراء مكتملة النمو. تتلون باللون الأحمر التام بعد قطفها بنحو ١٨ يوماً في الجو الدافئ، وتكون خصائصها الصالحة للأكل جيدة عند اكتمال نضجها تصلح للتصدير إلى مسافات بعيدة

إن الحد الأدنى لرحلة اكتمال التكوين الذي يمكن أن تقطف عنده ثمار الطماطم هو هذا الطور الذي يعرف أيضاً بالاسم Mature Green 2، وفيه يكون قد اكتمل تكوين البذور، ولا تقطع فيه البذور عند قطع الثمار بشفرة حادة، ويكون قد تقدم تكوين الجـل في مسكن واحد - على الأقل - من مساكن الثمرة، بينما يكون الجـل في طريقة للتكوين في باقي المساكن (Suslow & Cantwell ٢٠٠٦)

وتحصد طماطم الاستهلاك الطازج - لأجل الشحن البحري لفترات طويلة أو لأجل حمايتها من الإصابة بأضرار البرودة - بقطفها وهي خضراء ناضجة أو في طور التحول، مع إنضاجها صناعياً بالمعاملة بغاز الإثيلين لمدة ١٢ - ١٨ ساعة على ٢٠°م. أما طماطم التصنيع فإن النباتات تُعامل - لإسراع نضجها - بالرش بالإيثيفون حينما تكون ١٠٪ من ثمارها في أي درجة من درجات التلون

- ٤ - الثمار التي في طور التحول تصلح للتصدير إلى مسافات غير بعيدة

الفصل الأول الطماطم

٥ - الثمار التى فى طور النضج الوردى لا تزال تحتفظ بصلابتها، وتصلح للقطف بغرض التصدير للدول العربية، أو التسويق المحلى فى الجو الدافئ

ويلاحظ أن الثمار ذات الصلاحية الممتدة للتخزين extended shelf-life (وهى الصفة التى تعود - غالبًا - إلى أحد الجينين rin أو nor) لا يجوز حصادها قبل وصولها إلى مرحلة النضج الوردى والتى يكون فيها ٣٠٪ - ٦٠٪ من سطح الثمار بلون وردى.

٦ - الثمار التى فى طور النضج الأحمر تصلح الثمار التى فى بداية هذا الطور للتسويق المحلى فى الجو البارد، بينما لا تصلح الثمار التى فى نهاية هذا الطور إلا للتصنيع فقط.

تقطف الطماطم العنقودية cluster tomato - عادة - عندما يبدأ ظهور اللون الأحمر على أقل الثمار نضجًا. ومن الصفات الهامة فى الطماطم العنقودية تجانس لون الثمار، ونضارة العنق، وعدم سقوط الثمار من العنقود، ويكون تعبئتها - عادة - فى طبقة واحدة

٧ - لا تصلح الثمار التى فقدت صلابتها ودخلت فى طور النضج الزائد للحصاد، حتى ولو بهدف التصنيع، وذلك لأنها تتفلق ويخرج منها العصير، وتسبب مشاكل كثيرة أثناء التداول، كما تسبب فى زيادة التلوث الميكروبي، وما يستتبعه ذلك من زيادة تكاليف التعقيم، وتدهور نوعية المنتجات المصنعة

٨ - لا يجب أبدًا ترك حقول الطماطم دون حصاد حتى انفصال أو قرب انفصال وسقوط الثمار من عناقيدها، وهو الأمر الذى يحدث على النحو التالى. بعد أسبوع من بداية وصول ثمار الطماطم إلى طور النضج التام تبدأ خلايا برانشيمية الخشب فى منطقة الانفصال الأولية فى الاستطالة فى الاتجاه الطولى بدرجة أكبر عما يجاورها من خلايا. وبعد عشرة أيام أخرى يكتمل استطالة تلك الخلايا، إلا أن جذرها تتحلل؛ لتترك فجوات كبيرة بين خلوية، وحينئذ يحدث انفصال الثمار وفى الوقت ذاته تتلجنن الخلايا فى منطقة الانقسام الثانوى للخلايا فى الجانب القريب من منطقة الانفصال، لتعمل كطبقة حامية (Tabuchi وآخرون ٢٠٠٠)

٩ - تحصد أصناف الاستهلاك الطازج آلياً عندما تبلغ اثمار التي تخطت طور اكتمال النمو وهي خضراء - وأصبحت في أية درجة من درجات التلوين - نحو ٢٠٪ من الثمار بالعدد وتقدر النسبة بتقليع عدة نباتات، وهزها جيداً - كما تفعل آلة الحصاد - لإسقاط كل الثمار التي تسقط عادة من النموات الخضرية عند إجراء الحصاد آلياً، ثم تعد الثمار التي تخطت طور اكتمال النمو الأخضر، وتحسب نسبتها من العدد الكلي وقد يكون من الأفضل بدء الحصاد في مرحلة مبكرة قليلاً - وعندما تبلغ نسبة لثمار الملونة ٥٪ - ١٠٪ فقط - ذلك لأن طاقم العمل يكون بطيئاً في البداية، ويستمر كذلك إلى أن تنتظم عملية الحصاد

١٠ - تحصد أصناف التصنيع آلياً عندما تبلغ نسبة الثمار التي تخطت طور اكتمال التكوين الأخضر - وأصبحت في أية درجة من درجات التلوين - حوالى ٨٠٪ من الثمار بالعدد وتقدر هذه النسبة بنفس الطريقة السابقة وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثمار الملونة تزيد بمعدل ٣٪ - ٤٪ يومياً، أى أن نسبة الثمار التي تخطت طور اكتمال التكوين الأخضر تصبح بنسبة ٩٥٪ - ١٠٠٪ خلال ٥ أيام من بداية الحصاد

صفا .. وينتج فطان طماطم التصنيع حوالى ٥ أطنان من المواد الصلبة الطائبة، ويعتقد أن بالإمكان مضاعفة صفا الرقم إذا ما أعطى اهتمام خاص للأمور التالية،

١ - زيادة التحكم في كثافة الزراعة بتعديل المسافة بين النباتات وزيادة عرض المصاطب

٢ - تحسين التغذية النباتية

٣ - تربية أصناف جديدة ذات دليل حصاد أعلى مما فى الأصناف الحالية

٤ - حصاد الثمار فى التوقيت الأمثل

٥ - تحسين توقيت الري، وخاصة بالقرب من الحصاد (Nichols ٢٠٠٦)

تأثير مرحلة تكوين ونضج الثمار عند الحصاد على المحصول وصفات الجودة

إن الطماطم التي تقطف قبل اكتمال نضجها، ثم تكمل نضجها بعد الحصاد على ٢٠ م لا تكون بنفس جودة الثمار التي تقطف وهي حمراء مكتملة النضج، حيث تكون أقل منها حلاوة، وأكثر حموضة، ولا يظهر بها "طعم الطماطم" بنفس قوة ظهوره في الطماطم التي تقطف حمراء، كما يظهر طعم غير عادي غير مرغوب فيه (Kader وآخرون ١٩٧٧)

كذلك كانت ثمار عدد من أصناف الطماطم الشيرى أعلى في كل من الـ pH ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية، والجلوكوز، والفراكتوز، والسكروز عندما تركت لتنضج على النبات عما لو كان حصادها في طور التحول وتركت لتنضج في المخزن (Yu وآخرون ١٩٩٧).

وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم مساحات الطماطم المخصصة للاستهلاك الطازج في الولايات المتحدة تحصد بعد اكتمال نمو ثمارها وهي خضراء، أو في مرحلة التحول كحد أقصى. والهدف من ذلك أن تصل الثمار إلى المستهلك قبل أن تصبح زائدة النضج، وألا تتعرض للتهتك أثناء شحنها وتداولها. كذلك فإن حصاد الثمار وهي خضراء ناضجة يقلل عدد المرات التي تلزم لحصاد المحصول إلى مرتين أو ثلاثة مرات فقط، مقارنة بنحو ٦ - ٨ مرات عند حصادها في طور النضج الوردي

ونظرًا لأنه لا يمكن التأكد من وصول الثمرة إلى مرحلة اكتمال النمو - وهي خضراء - إلا بعد قطعها بالسكين لرؤية المشيمة الجيلاتينية المحيطة بالبذور؛ لذا . يوصى بالانتظار لحين وصول نسبة بسيطة من الثمار إلى مرحلة النضج الوردي، حيث تحصد - حينئذ - كل ثمار العنقود الأول، أو كل الثمار التي لا تقل عن حجم معين ويترتب على ذلك أن نسبة من الثمار التي يتم حصادها على اعتبار أنها خضراء مكتملة التكوين غير مكتملة النمو ولا تتلون بصورة طبيعية بعد قطفها، أو تكون رديئة النوعية عند نضجها

وقد وجد Davis & Gardner (١٩٩٤) أن حصاد ثمار الاستهلاك الطزج وهى خضراء مكتملة النمو يكون مصاحبا بنقص معنوى فى المحصول وفى متوسط وزن الثمرة، مقارنة بحصادها فى طور النضج الوردى ولم يكن لمرحلة التكوين والنضج أية تأثيرات على معدلات الإصابة بمختلف العيوب الفسيولوجية باستثناء تشققات الثمار التى ازدادت نسبتها فى الثمار التى حصدت فى طور النضج الوردى، مقارنة بتلك التى حصدت وهى خضراء مكتملة النمو وقد ترتب على ذلك تساوى مرحلتى النضج - عند الحصاد - فى المحصول الخالى من التشققات هذا إلا أن الحجم الأكبر للثمار التى تحصد وهى فى مرحلة النضج الوردى يعنى حصول المنتج على سعر أعلى فيها، مقارنة بسعر بيعه للثمار التى تحصد وهى خضراء مكتملة التكوين، والتى تكون أصغر حجماً.

طرق الحصاد

يمكن حصاد الطماطم إما يدوياً، وإما آلياً

(المصايد اليدوى)

يجرى الحصاد اليدوى بإدارة الثمرة برفق فتنفصل عن النبات بسهولة ويكون قطف الثمار كل ٤ أيام فى الجو الحار، وكل ٧ - ١٠ أيام فى الجو البارد.

وإذا فصلت الثمرة عند المفصل joint - الأمر الذى يحدث غالباً عندما يكون عنق الثمرة ذا مفصل jointed - فإنه يتعين إزالة الجزء المتبقى من عنق الثمار مع الكأس، لكى لا يخرق هذا الجزء الثمار التى تجاوره أثناء عمليات التداول، وفى عبوات الشحن أو التخزين، الأمر الذى يؤدى إلى إصابة الثمار بالكائنات الدقيقة المسببة للأعفان، ويزيد من فاقد الثمار بعد الحصاد أما فى أصناف الطماطم التى تكون أعناق ثمارها بدون مفصل jointless، فإن الثمار تنفصل بدون عنق، الأمر الذى يوفر حوالى ٢٥٪ من الوقت الذى تستغرقه عملية الحصاد اليدوى (Zahara & Scheuerman ١٩٨٨).

وتحصد ثمار الأصناف الكريزية منفردة - غالباً - وهى فى مرحلة نصف تلوين، أو بعدما تصل إلى طور النضج الوردى، وهى عملية مكلفة. نظراً للوقت الطويل الذى تستلزمه عملية الحصاد كما يتطلب حصاد العناقيد العليا الوقوف على سلام. لأن

النباتات يسمح لها بالنمو الرأسى لارتفاع يصل إلى ٣ - ٣.٥ م قبل أن يتدلى نموها القمى إلى أسفل.

وقد وجد Kagan Zur & Mizrahi (١٩٩٣) أن الهجن العنقودية الخليطة فى الجين nor (والتي يكون تركيبها الوراثى nor+) - مثل BR124 - يمكن حصادها بالعنقود (وليس بالثمار المفردة) بشرط توفر الظروف التالية.

- ١ - الاكتفاء بنحو ١١ - ١٢ ثمرة فى كل عنقود، لكى يمكن للثمار الأولى أن تحتفظ بحدودتها لفترة مناسبة تصل إلى نحو ٢ - ٣ أسابيع من بداية تلويئها
- ٢ - إجراء الحصاد بعدما تتكون بالفعل الثمرة الأخيرة التى سيتم الاكتفاء بها (الثمرة رقم ١٢)

٣ - معاملة العناقيد بحرص لكى لا تنفطر الثمار من العناقيد أثناء تداولها.
هذا علماً بأن الثمار الخضراء المتبقية على العنقود لا تنضج بشكل مرضٍ

ويتمتعون بحصد ثمار طماطم الامتلاك الطازج يدويًا مرارًا ما يلي،
١ - غسيل الأيدي جيدًا.

- ٢ - لا تُحصد إلا الثمار الجاهزة للحصاد، مع ترك الثمار غير المكتملة التكوين للقطفة التالية، ومع الانتهاء من حصاد جميع ثمار النبات قبل الانتقال إلى النبات التالى

٣ - عدم الضغط على الثمار أو تجريحها أو اختراقها بالأظافر.

- ٤ - عدم الاحتفاظ فى اليد بعدد من الثمار أكثر من الممكن؛ لأن ذلك يؤدى إلى سقوط بعضها، ومن ثم تجريحها وخفض كفاءة عملية الحصاد ذاتها
- ٥ - عدم وضع أى مخلفات نباتية أو ثمار غير صالحة للتسويق مع الثمار الجيدة فى عبوات الحصاد

٦ - عدم القذف بالثمار فى عبوات الحقل.

- ٧ - نقل الثمار بلطف ومن على ارتفاع منخفض من عبوات الحقل إلى عبوات نقل

المحصول

المصاء الثاني

يجرى الحصاد الآلي دفعة واحدة باستخدام آلات كبيرة تقوم بتقليع النباتات، ونقلها على "كاثينة" متحركة إلى داخل الآلة، حيث تتعرض لاهتزازات شديدة تؤدي إلى سقوط الثمار وتنقل الثمار بعد ذلك بواسطة سيور متحركة أمام عمال يقومون بفرزها، واستبعاد الثمار غير الناضجة، وزائدة النضج، والمصابة بالأمراض والعيوب الفسيولوجية ويستمر تحرك الثمار إلى أن تسقط في عربة نقل تتحرك في الحقل إلى جانب آلة الحصاد

يبدأ حصاد حقول أصناف الاستهلاك الطازج عندما تصل نسبة الثمار في أية درجة من درجات التلوين إلى ٥٪ - ١٠٪، ويفضل أن تكون النسبة ٢٠٪، ويتوقف حصادها آلياً عندما تزيد النسبة عن ٢٥٪، حتى لا تتعرض الثمار للتلف (Sims & Scheuerman ١٩٧٩) ويبدأ الحصاد في أصناف التصنيع عندما تبلغ نسبة الثمار في أية درجة من درجات التلوين ٨٠٪، ويفضل أن تكون النسبة ٩٠٪، ويتوقف حصادها آلياً عندما توجد نسبة عالية من الثمار زائدة النضج، لأنها تكون طرية، وتتهتك وتعيق عملية الفرز، وتبطئ عملية الحصاد وتزيد من تكاليفها (Smis وآخرون ١٩٧٩)

تختلف آلات حصاد الطماطم في كفاءتها، وتستخدم أنواع يمكن تشغيلها - في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - في حصاد من ٤ - ٥ أفدنة من طماطم الاستهلاك الطازج يومياً. ويعمل على كل منها من ١٨ - ٢٢ عاملاً. أما في أوروبا، فتستخدم نوعيات أصغر.

وقد طورت اليابان روبوت لحصاد ثمار الطماطم الشيري (الكريزية) يعتمد في كشف الثمار الحمراء الناضجة على نسبة الأشعة الحمراء إلى الأشعة تحت الحمراء المنبعثة منها (Kondo وآخرون ١٩٩٥، و Subrata وآخرون ١٩٩٦).

مشاكل المصاء الثاني

برغم ارتفاع ثمن آلات الحصاد بدرجة كبيرة، إلا أن ذلك لا يعد مشكلة في الحصاد الآلي وذلك لأن هذه الطريقة لا تتبع أصلاً إلا في المساحات الكبيرة التي يكون فيها

الفصل الأول الطماطم

الحصاد الآلى ضرورة اقتصادية تفرضها أجور العمال، ومدى توفرهم، والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها ومع ذلك فإن للحصاد الآلى مشكلتين رئيسيتين، هما زيادة الأضرار التى تحدث للثمار، وزيادة كمية الأتربة التى تصل لمصانع الحفظ مع الثمار.

ويمكن الإقلال من الأضرار التى تحدث للثمار بمواعيد ما يلي،

- ١ - تشغيل آلة الحصاد بالسرعة المناسبة.
- ٢ - اتباع الوسائل المناسبة لنقل الثمار من آلة الحصاد إلى عربة النقل التى تسير بجوارها فى الحقل.
- ٣ - إسقاط الثمار من عربات النقل فى خزانات مملوءة بالماء لتقليل تفلقات الثمار.
- ٤ - مراعاة سمك طبقة الثمار فى عربات النقل، وفى العبوات المختلفة أثناء مراحل النقل حتى التعبئة.

وتجدر الإشارة إلى أن أصناف التصنيع الحديثة، مثل: يوسى ٨٢، وبيتو ٨٦ وغيرهما تتميز بصلابتها العالية، ويتحملها لعمليات الحصاد الآلى والتداول، دون أن تتعرض للتلف، كما أن هجن الاستهلاك الطازج الحديثة تتميز كذلك بصلابتها الجيدة قبل وصولها إلى طور النضج الأحمر، مما يسمح بحصادها آلياً بدون مشاكل.

وقد أظهرت الدراسات أن الحصاد الآلى لطماطم التصنيع لا يترتب عليه أضراراً فيزيائية تذكر، فهي تكون بسيطة للغاية إذا ما كانت نسبة الثمار التى تحتفظ بأعناقها لا تزيد عن ٤٠٪ (Studer وآخرون ١٩٨١).

وبالنسبة للأتربة فإنه تصل لمصانع الحفظ كميات كبيرة منها يومياً إما مختلطة مع الثمار، أو ملتصقة بها فى صورة طين. وقد وجد فى إحدى الدراسات أن كمية الطين التى تصل إلى مصانع الحفظ تبلغ ١٦.٦ كجم مع كل طن من الثمار، منها ١٤.٨ كجم - مختلطة بها، وتكون الكمية الباقية عالقة عليها. ومع إمكانية التخلص من الطين العالق بالثمار السليمة بالغسل، إلا أنه يصعب التخلص من الطين الملتصق بالثمار المتشققة مما يؤدى إلى زيادة النشاط الميكروبى، وسرعة تلف المنتجات المصنعة، بالإضافة إلى أن المصنع يشتري الطين بسعر الطماطم وفى الحالات غير العادية قد تصل نسبة الطين

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

إلى ٥٪. ويعنى ذلك أن المصنع الذى يستوعب ١٠٠ طنا يوميا يتلقى ضمناً ٥ أطنان من الطين بسعر الطماطم.

ويتمسبب الطين في المراحل التالية،

- ١ - يعد خسارة اقتصادية للمصنع
- ٢ - يزيد النشاط الميكروبي، ويؤدى إلى سرعة تلف المنتجات.
- ٣ - يحتوى على بعض الميكروبات السامة للإنسان، مثل *C. botulinum*
- ٤ - يزيد كمية الماء المستهلكة فى غسل الثمار
- ٥ - تؤدى كثرته إلى انسداد مواسير الصرف الصحى فى المصانع (Gould ١٩٧٣).

مجممل عمليات تداول طماطم الاستهلاك الطازج بعد الحصاد

تمر طماطم الاستهلاك الطازج بعمليات التداول التالية.

- ١ - الحصاد الهدوى فى دلاء.
- ٢ - النقل إلى أوعية أكبر فى الظل.
- ٣ - النقل إلى محطة التعبئة.
- ٤ - الغمر فى ماء مكلور
- ٥ - الشطف فى ماء صالح للشرب.
- ٦ - تحجيم أولى وفرز أولى للعيوب الواضحة.
- ٧ - التشميع مع مبيد فطرى أو بدونه أو المعاملة بالمبيد الفطرى وحده.
- ٨ - التقسيم حسب اللون وتوجيه الثمار الناضجة الملونة إلى خط تعبئة مستقل.
- ٩ - التدرج حسب المقاييس المعمول بها.
- ١٠ - التحجيم (التدرج إلى أحجام) باستعمال سيور متحركة ذات ثقب تتناسب والأحجام.
- ١١ - ملأ الكراتين بالوزن.
- ١٢ - عمل بالئات وتخزينها، ثم توجيهها نحو أحد طريقتين، كما يلى

الطريق الأول

أ - النقل إلى حجرات الإنضاج لأجل المعاملة بالإيثيلين بتركيز ١٠٠ جزء في المليون على ٢٠°م

ب - ثم التبريد أو التخزين المؤقت على ٧ - ١٣°م حسب مدى نضج الثمار.

ج - ثم التحميل والنقل إلى الأسواق، حيث قد تُعاد فيها التعبئة من جديد.

الطريق الثاني

أ - التبريد أو التخزين المؤقت على ٧ - ١٣°م حسب درجة نضج الثمار.

ب - ثم التحميل والنقل.

ج - ثم النقل إلى حجرات الإنضاج في الأسواق لأجل المعاملة بالإيثيلين بتركيز ١٠٠

جزء، في المليون على ٢٠°م، ثم إعادة التعبئة من جديد (عن Brecht ٢٠٠٣).

تكنولوجيا تداول الطماطم بعد الحصاد وقبل التخزين والشحن

تفريغ حمولة الشاحنات في محطات التعبئة والغسيل بالماء

المكلور

يتم تفريغ حمولة الشاحنات التي تنقل الطماطم من الحقل - لدى وصولها إلى محطة التعبئة - في أحواض كبيرة مملوءة بماء غير ملوث بالميكروبات وتوفر هذه الطريقة كثيراً في الأيدي العاملة، كما تحمي الثمار من الأضرار الفيزيائية، نظراً لأن إسقاطها في الماء يحميها من صدمات الارتطام بأي أسطح صلبة.

لكن يعيب هذه الطريقة زيادة فرصة تلوث نسبة كبيرة من الثمار بالميكروبات الممرضة جراء تلوث الماء بما يتواجد على بعض الثمار من ملوثات، واحتمال تسرب الماء الملوث - من خلال ندبة عنق الثمرة - إلى داخل الثمار؛ نظراً لأن الثمار تكون حرارتها - عند تفريغها - أعلى من حرارة ماء الغمر، مما يؤدي إلى سرعة برودتها نسبياً؛ ومن ثم انكماش الهواء الموجود بداخلها، مما يؤدي إلى اندفاع ماء الغمر فيها، الأمر الذي يحدث من خلال ندبة العنق، وأي جروح أو خدوش سطحية

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية التداول والتخزين والتصدير

ولهذا السبب تتم - دائماً - معاملة ماء الغمر بالكلورين بتركيز ١٠٠-١٥٠ جزءاً في المليون

ويؤدي تأجيل تفريغ حمولة ثمار الطماطم في أحواض الماء بعد جمعها - لمدة لا تقل عن أربع ساعات - إلى الحد من نفاذ الماء - من خلال ندبة العنق - إلى داخل الثمرة (Smith وآخرون ٢٠٠٧)؛ الأمر الذي يقلل - كثيراً - من نفاذ الأنواع البكتيرية المسببة للأعفان، مثل بكتيريا العفن الطرى *Erwinia carotovora*، والعفن الحامضي البكتيري *Leuconostoc mesenteroides*، وكذلك بعض أنواع الـ *Lactobacillus spp.*، بالإضافة إلى فطريات العفن الحامضي *Geotrichum candidum*، وعفن ريزوس *Rhizopus rot*، والعفن الرمادي *Botrytis cinereo*. وقد وجدت اختلافات وراثية بين سلالات الطماطم في مدى قابلية ثمارها للتشرب بالماء من خلال ندبة العنق (Smith وآخرون ٢٠٠٨).

ويتعين لأجل الحد من تشرب ثمار الطماطم بالماء الذي تفرغ فيه حمولة الثمار رفع حرارته عن حرارة لب الثمار بنحو ٦-٧ درجات مئوية، ويحدث ذلك من خلال تجنب تقلص الفراغات الهوائية التي توجد بالثمار (إذا ما كانت حرارة الماء الذي تفرغ فيه الثمار أقل من حرارة الثمار)، وبذا نتجنب اندفاع الماء إلى داخل الثمار من خلال ندبة العنق هذا. علماً بأن تلك الفراغات الهوائية تزداد كثيراً في الثمار التي تُحصَد في الجو الحار، ولذا يراعى دائماً أن تبقى الثمار في الظل بعد الحصاد

كذلك يمكن أن يزداد اندفاع الماء إلى داخل الثمرة بزيادة الضغط عليها إذا ما كانت على عمق كبير في أحواض التفريغ؛ ولذا يوصى بعدم زيادة العمق عن ٣٠ سم وعدم زيادة فترة بقاء الثمار في الماء عن دقيقة واحدة.

وتجدر ملاحظة بعض الأمور التي تتعلق بالماء التي تفرغ فيه حمولة الثمار، كما يلي:

١ - عدم استعمال مواد ناشرة أو زيادة الكلورين بالماء لأن ذلك يزيد من معدل تشرب الثمار بالماء

٢ - الموازنة بين رفع حرارة الماء وفقده للكلورين نتيجة ذلك الارتفاع فى درجة الحرارة، وكذلك زيادة تفاعل الكلورين مع المادة العضوية فى الحرارة العالية، وما قد يترتب على ذلك من تكوين مركبات ضارة بالصحة (Suslow ٢٠٠٧).

والحصول على أفضل نتائج للتطهير بالكلورين من المياه المكلورة التى يُعاد استعمالها، يراعى ما يلى:

- ١ - المحافظة على تركيز ١٥٠-٢٠٠ جزء فى المليون من الكلورين الحر، مع pH للماء يتراوح بين ٦,٥ و ٧,٥.
- ٢ - تدفئة حوض الماء الذى تفرغ فيه حمولة الثمار لتصبح حرارته أعلى من حرارة لب الثمار بمقدار خمس درجات مئوية
- ٣ - عدم زيادة فترة غمر الثمار عن دقيقتين للحد من تشرب الثمار بالماء
- ٤ - عدم السماح ببقاء الثمار طافية على سطح الماء أثناء فترات راحة العاملين، مع ملاحظة الأماكن التى قد لا تتحرك فيها الثمار dead spots، ودفعها للحركة خارجها.
- ٥ - عدم السماح بتواجد الثمار فى أكثر من طبقة واحدة بحوض التفريغ لأجل الحد من ضغط الماء وما يتبعه من تشرب الثمار به.
- ٦ - استخدام نظام آلى للتحكم المستمر فى تركيز الكلورين والـ pH، مع إجراء القياسات يدوياً - كذلك - كل ساعة وإذا ما أظهر القياس اليدوى عدم دقة النظام الآلى يتعين تسجيل القياسات على فترات أكثر تقارباً
- ٧ - تفريغ تانك الثمار يومياً، مع التخلص من الرواسب، وتطهيره وشطفه، وإعادة ملئه بالماء الصالح للشرب.
- ٨ - اتباع النظم المعتمدة للتخلص من الماء (Mahovic وآخرون ٢٠٠٧).

وقد ظلت ثمار الطماطم التى بُردت أولاً - وهى فى طور التحول - بالماء البارد المحتوى على معلق لخلايا البكتيريا *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* و ٥٠-٢٠٠ مجم/لتر من الكلورين الحر (١٠°م، و pH=٧) .. ظلت تلك الثمار خالية من العفن لمدة ١٠ أيام تالية لذلك عندما كان تخزينها على ٢٠°م هذا إلا أن بعض الثمار

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية. التداول والتخزين والتصدير

أصيب بالعفن الذى يسببه الفطر *Rhizopus stolonifer* عندما احتوى ماء التبريد الأولى على جراثيم هذا الفطر وبالمقارنة أصيبت ٥٠٪ إلى ١٠٠٪ من الثمار بالعفن عندما خلا ماء التبريد من الكلور وقد ازداد وزن ثمار الطماطم التى بُردت أولاً بتلك الطريقة بسبب دخول الماء فيها من خلال ندبة العنق، الأمر الذى قد يشكل خطورة صحية بدخول المسببات المرضية - التى قد تتواجد فى ماء التبريد - فى الثمرة (Vigneault وآخرون ٢٠٠٠)

وقد وجد أن نقع الطماطم فى ماء يحتوى على صبغة ذائبة أدى إلى اختراق الصبغة للجروح التى توجد بالثمار ولقد حددت الصبغة إطار الخلايا عند سطح الجرح، وبدا أنها تخترق عدد من المسافات التى توجد بين الخلايا بعد ذلك الإطار. وأدت المعاملة بهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز ١٪ إلى قصر لون الصبغة عند سطح الجرح، بينما ظلت الصبغة المتواجدة تحت سطح الجرح زرقاء اللون وبذا فإن الجراثيم الميكروبية التى قد تتواجد فى ماء التبريد (مثل جراثيم *Rhizopus stolonifer*) يمكن أن تغلت من فعل الكلورين إذا ما حملت إلى المسافات بين الخلوية بخاصية الانتشار أو بالحركة الشعرية للمعير الخلوى والماء (Bartz وآخرون ٢٠٠١)

وعلى الرغم من أن تقصير فترة تعريض ثمار الطماطم للماء المكلور يؤدي إلى زيادة أعداد بكتيريا الـ *Salmonella* فى الجروح الملوثة بها، فإن تلك المعاملة لا تؤدي إلى التخلص التام من البكتيريا حتى على الأسطح غير المجروحة، كما أن ندبة ساق الثمرة لا تُظهر بسهولة بهيبوكلوريت الصوديوم (Felkey وآخرون ٢٠٠٦).

هذا .. ويزداد - كثيراً - فرصة تلوث ثمار الطماطم - داخلياً - بالـ *Salmonella* مع ماء التنظيف إذا ما كانت تلك الثمار قد تلوثت أصلاً بالتربة قبل أو أثناء الحصاد، ذلك لأن البكتيريا يمكنها أن تعيش فى التربة الرطبة لمدة لا تقل عن ٤٥ يوماً، كما أن أعدادها تزداد فى الثمار التى تتلوث بها (Guo وآخرون ٢٠٠٢)

وقد يحتاج الأمر بعد إخراج الطماطم من خزانات الماء التى فرغت فيها الحمولات الحقلية تنظيفها بالفسيل باستعمال ماء صالح للشرب، يكون معاملاً بالكلورين بتركيزات

أعلى بكثير مما يناسب مياه الشرب (١٥٠-٢٠٠ جزء في المليون) تفيد هذه المعاملة في تخليص الثمار من التربة التي قد تكون ما زالت عالقة بها، بالإضافة إلى تطهيرها سطحياً من كل مسببات الأعفان، والميكروبات الضارة بصحة الإنسان وغالباً ما يُعاد استخدام تلك المياه توفيراً للنفقات، وللحد من مشاكل الصرف الصحي

الفرز والتعبئة

تعبأ الطماطم بعد حصادها مباشرة في صناديق من الكرتون، أو البلاستيك، أو الجريد، تتراوح سعتها من ٥ - ١٠ كجم. ويفضل عدم استخدام الصناديق الأكبر من ذلك أو العميقة حتى لا تتفلق الثمار السفلية تحت ثقل الضغط الذي يقع عليها من الثمار العلوية، كما يفضل عدم استخدام أقفاص الجريد، لأنها تؤدي إلى تجريح الثمار، وزيادة نسبة التلف منها.

وعند إنتاج الطماطم في المزارع الكبيرة - سواء لغرض التسويق المحلي أم للتصدير - فإن المحصول يجمعُ أولاً في وحدة التعبئة الموجودة في المزرعة، أو في مكان قريب منها، حيث تمر الثمار على سيور متحركة لتفرز، وتنظف، وتدرج، ثم تعبأ. وبينما يتم التنظيف والتدرج آلياً، يقوم العمال بالفرز أثناء مرور الثمار أمامهم على السيور المتحركة، حيث يقومون باستبعاد الثمار غير الناضجة، وزائدة النضج، والمصابة بالعيوب الفسيولوجية، أو بالأمراض أو الحشرات. وتتوقف درجة الإصابة المرضية أو الحشرية، وشدة العيوب الفسيولوجية المسموح بها على العرض والطلب، ورغبات المستهلك، والقوانين المحلية التي تنظم ذلك، سواء أكان المحصول مخصصاً للاستهلاك المحلي أم للتصدير، وقد تفرز الثمار المتقدمة في النضج بمفردها أحياناً حتى تكون ثمار كل عبوة متقاربة في درجة نضجها. وتصل الثمار المفروزة في نهاية المطاف إلى مكان التعبئة، حيث تتجمع الثمار المدرجة حسب الحجم، أو اللون في أماكن مستقلة بها عمال يقومون بالإشراف على عملية التعبئة، ومن الجدير بالذكر أن عملية التدرج تتم آلياً حسب حجم، أو وزن الثمرة

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

وتوضع الثمار فى العبوات إما بدون ترتيب معين in bulk، أو توضع فى أطباق بلاستيكية تحتوى على انخفاضات بحجم الثمار، ويتوقف عددها فى كل طبق على مساحة الصندوق، وحجم الثمار ويحتوى كل صندوق عادة على ٢ - ٣ طبقات من الأطباق، وتتبع هذه الطريقة فى تعبئة محصول التصدير للأسواق التى تتطلب ثماراً عالية الجودة (شكل ١-١، يوجد فى آخر الكتاب)

وتعبأ الطماطم - غالباً - فى كراتين سعة ١١.٤ كجم (٢٥ رطل) بأبعاد ٤٠ × ٢٤ × ٢٤ سم، حيث تصف بارتفاع ١٠ كراتين فى بالتات ١٢٠ × ١٠٠ سم

هذا وتُحصد طماطم الزراعات المحمية (لأجل الاستهلاك الطازج بطبيعية الحال) فيما بين مرحلتى النضج الأحمر الفاتح والأحمر الكامل، وهى التى تعرف باسم vine-ripe، أى الناضجة على "عروشها"، ويكون حصاد الثمار التامة الاحمرار بمعدل مرتين أسبوعياً وتعبأ هذه الثمار لأجل أسواق الجملة فى كراتين تتسع لنحو ١٥-٢٥ رطلاً من الثمار (٦.٨-١١.٤ كجم)، وتتحدد سعة الكرتونة بأحجام الثمار التى تعبأ فيها، فمثلاً كرتونة ٥×٥ تعنى وجود خمسة صفوف بكل منها خمس ثمار فى كل طبقة من الكرتونة.

وتكون أحجام الثمار كما يلى،

الحجم	العبوة	أقل قطر للثمار (سم)	أكبر قطر للثمار (سم)
أكبر حجم	٥×٤	١٠.٥	أكبر من ذلك
كبيرة جداً	٥×٥ و ٦×٥	٧.٢	١٠.٥
كبيرة	٦×٦	٦.٢	٧.٢
متوسطة	٧×٦	٥.٦	٦.٢
صغيرة	٧×٧	٥.٣	٥.٦
صغيرة جداً	٨×٧	٤.٦	٥.٣

أما الطماطم الشيرى (الكريزية)، فقد تكون على صورة عناقيد أو تعبأ سائبة

الفصل الأول الطماطم

تعرف الطماطم الشيرى التى تسوق على صورة عناقيد باسم cherry tomatoes on the vine، ومن أصنافها المفضلة Aranca تكون عبواتها سعة ٣ كجم، وفى طبقة واحدة عادة، وتشحن عن طريق الجو فقط، وتبقى بحالة جيدة لمدة أسبوع تكون النافذة التصديرية فى أوروبا من أوائل ديسمبر إلى أواخر مارس.

تعرف هذه الطماطم باللائى الحمراء red pearls، وهى حلوة المذاق وحمراء داكنة اللون. يجب أن يتراوح قطر الثمرة بين ٣٠، و ٤٠ مم، مع تواجد ٧-٨ ثمار بكل عنقود. يفضل أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين ٧,٥٪، و ٩٪.

أما الطماطم الشيرى السائبة، فمن أصنافها المفضلة Josphina، وتُعبأ ثمارها فى punnets ذات غطاء، تتسع كل منها لربع كيلو جرام، وتوضع كل تسع منها فى كرتونة. تشحن عن طريق الجو، وتبقى بحالة جيدة لمدة ١٠ أيام. يجب ألا يقل محتواها من المواد الصلبة الذائبة عن ٦٪، ويفضل أن يتراوح بين ٧٪، و ٨٪. تكون النافذة التصديرية خلال شهور الشتاء.

التبريد الأولي

لا تحتاج ثمار الطماطم إلى معاملة التبريد الأولى إلا إذا كانت حرارتها أعلى من ٢٧°م، وكان من المرغوب فيه تأخير وصولها إلى مرحلة اكتمال النضج.

وقد تبرد ثمار الطماطم أولياً بطريقة الدفع الجبرى للهواء بمجرد وصولها إلى محطة التعبئة لتأمين احتفاظها بجودتها.

يمكن تبريد ثمار الطماطم الكريزية من ٣٢°م إلى ١٦°م فى خلال ٣ - ٥ دقائق بغمرها، أو رشها بماء تتراوح حرارته بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية.

وقد أدى تبريد الطماطم بالماء البارد على ١٠°م (pH=٧,٠) يحتوى على ٢٠٠ جزء فى المليون من الكلورين الحر ومعلق من بكتيريا العفن الطرى البكتيرى *Erwinia carotovora* subsp *carotovora* إلى انخفاض حرارتها من ٣٥ إلى ١٥°م فى ١٣,٣ دقيقة وبقائها خالية

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

من العفن لمدة ١٠ أيام على ٢٠°م، وإن ظهرت إصابات متفرقة بعفن ريزوبس الطرى الذى يسببه الفطر *Rhizopus stolonifer*، هذا فى الوقت الذى أصيبت فيه ٥٠٪ - ١٠٠٪ من الثمار بالعفن إن لم يحتوى ماء التبريد (الملوث بالبكتيريا) على الكلورين ولم تظهر أى دلائل على حدوث أى أضرار على ثمار الطماطم التى دخلها محلول الكلورين بتركيز ٢٠٠ جزء فى المليون (Vigneault وآخرون ٢٠٠٠)

وغالبًا يكون تبريد الطماطم بعد تجهيزها فى بالتات إلى ٢٠°م للإنضاج أو إلى ١٢°م للتخزين. ويتم التبريد - عادة - فى الحجرات المبردة، ولكن التبريد بطريقة الدفع الجبرى للهواء يعطى نتائج أفضل وإذا ما كانت حرارة اللب فى الطماطم المعبأة والمجهزة فى بالتات ٢٨°م، فإنها ترتفع بمقدار درجتين - مباشرة - بعد وضع النباتات فى حرارة ٢٠°م، ثم تبرد تدريجيًا إلى ٢٣°م فى خلال ٢٤ ساعة.

وبالمقارنة فإن تلك الطماطم يمكن تبريدها إلى ٢٠°م بطريقة الدفع الجبرى للهواء فى خلال ساعتين ونصف الساعة، وبذا .. يكون نضجها أكثر تجانسًا فى مختلف كراتين البالطة.

ويجب فى جميع الأحوال عدم تعريض الثمار لحرارة تقل عن ١٠°م لأكثر من ٢٤ ساعة، لئلا تصاب بأضرار البرودة

فسيولوجيا الطماطم بعد الحصاد

التغيرات المصاحبة لنضج الثمار

يصاحب نضج ثمار الطماطم، وانتقالها من مرحلة اكتمال النمو وهى خضراء إلى طور النضج الأحمر حدوث تغيرات فى مكونات الثمار تؤثر فى خصائصها، وفى صفات الجودة بها، وتكون بصورة تدريجية، وهى كما يلى

١ - فقد الكلوروفيل

٢ - زيادة محتوى الثمار من الصبغات، مثل الليكوبين، والبيتاكاروتين

٣ - تحلل النشا، وتكوين الجلوكوز والفراكتوز، وزيادة نسبة السكريات، ولكن مع

الفصل الأول الطماطم

انخفاض فى تركيز كل من الجالاكتوز galactose والأرابينوز arabinose (Gross & Wallner ١٩٧٩).

٤ - زيادة معدل التنفس حتى مرحلة النضج الوردى - التى تتوافق مع الكلايمكترك Climacteric - ثم انخفاضه قليلا بعد ذلك. وقد كان يُعتقد أن ثمار الطماطم المقطوفة - فقط - هى التى تظهر بها الزيادة الحادة فى معدل التنفس التى تصاحب مرحلة الكلايمكترك؛ الأمر الذى حداً بالبعض إلى القول بأن ثمار الطماطم ليست كلايمكتيرية، إلا أن Andrews (١٩٩٥) وجد أن معدل تنفس ثمار الطماطم يزداد أثناء نضجها بمقدار ١٠٠٪ سواء أكانت الثمار مفصولة عن النبات، أم مقصولة به.

٥ - زيادة إنتاج الثمار من غاز الإثيلين.

٦ - انخفاض pH الثمار إلى أدنى مستوى له (حوالى ٤,١) فى طور بداية اللون، ثم ارتفاعه إلى أن يصل إلى أعلى مستوى له (حوالى ٤,٥) فى طور النضج الأحمر.

٧ - نقص صلابة الثمار.

٨ - زيادة محتوى الثمار من البكتينات الذائبة soluble pectins.

٩ - زيادة نشاط إنزيم البولى جالاكتيورونيز Polygalacturonase، وهو الإنزيم الرئيسى المسئول عن طراوة الثمار أثناء نضجها.

١٠ - زيادة تركيز حامض الجلوتامك glutamic acid.

١١ - إنتاج المركبات المسئولة عن النكهة المميزة للطماطم.

١٢ - ارتفاع محتوى الثمار من حامض الأسكوربيك (فيتامين ج) ابتداءً من طور النضج الوردى.

١٣ - زيادة نسبة حامض الستريك إلى حامض المالك.

١٤ - زيادة محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة الكلية.

١٥ - تحليل المادة القلوية السامة ألفا تومايتن tomatine.

ويبين جدول (١-٢) التغيرات التى تحدث فى محتوى ثمار الطماطم - من مختلف المركبات - أثناء نضجها

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

جدول (٢-١) التغيرات الكمية التي تحدث في محتوى ثمار الطماطم من مختلف المركبات الكيميائية أثناء نضجها^(١) (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤)

مرحلة نمو ونضج الثمرة					المحتوى ^(ب)
الأخضر المكمل	بداية التلوين	الوردي	الأحمر	الأحمر التام	
٦,٤٠	٦,٢٠	٥,٨١	٥,٨٠	٦,٢٠	المادة الجافة (%)
٠,٢٨٥	٠,٣١٠	٠,٢٩٥	٠,٢٧٠	٠,٢٨٥	الحموضة المعايرة (/)
٠,٠٥٨	٠,١٢٧	٠,١٤٤	٠,١٦٦	٠,١٩٤	الأحماض العضوية (/)
١٤,٥	١٧,٠	٢١,٠	٢٣,٠	٢٢,٠	حامض الأسكوربيك (مجم /)
٤٥,٠	٢٥,٠	٩,٠	صفر	صفر	الكلوروفيل (مجم /)
٥٠,٠	٢٤٢,٠	٤٤٣,٠	-	-	بيتاكاروتين (مجم /)
٨,٠	١٢٤,٠	٢٣٠,٠	٣٧٤,٠	٤١٢,٠	الليكوبين (مجم /)
٢٤,٠	٢٩,٠	٣,١٠	٣,٤٥	٣,٦٥	السكريات المحذولة (/)
٢,٣٤	٢,٢٠	١,٩٠	١,٧٤	١,٦٢	اليكتينات (/)
٠,٦١	٠,١٤	٠,١٤	٠,١٨	٠,٠٧	النشا (/)
١٧,٠	١٧,٩	٢٢,٣	٢٤,٦	٣١,٢	المركبات المتطايرة (جزء في البليون)
٢٤٨,٠	٢٩٠,٠	٢٥١,٠	٢٧٨,٠	٤٠٠,٠	المركبات المختزلة القابلة للتطاير (جزء في البليون)
-	٢٣٥٨,٠	٣٢٥٩,٠	٢٩٤١,٠	٢٧٢٣,٠	الأحماض الأمينية (مول /)
٩,٤٤	١٠,٠٠	١٠,٢٧	١٠,٢٧	٦,٩٤	النيتروجين البروتيني (مجم نيتروجين لكل جم وزن جاف)

(أ) أخذت جميع القياسات على الصنف فيربول Fireball، فيما عدا تقدير محتوى الأحماض الأمينية الذي سُجِّلَ على الصنف موسكو Moscow.

(ب) كانت جميع التقديرات على أساس الوزن الجاف إلا في الحالات المحددة بغير ذلك.

تعد نسبة محتوى ثمرة الطماطم من المواد الصلبة إلى حموضتها المعايرة، أو أى من هذين لمحتويين خصائص مهمة في تحديد مذاق الطماطم والسكريات الرئيسية هي

الفصل الأول الطماطم

الجلوكوز والسكرز بكميات متساوية تقريباً، بينما حامض الستريك والماليك هما الحامضان العضويان الرئيسيان، مع سيادة حامض الستريك. ولقد أمكن التعرف على أكثر من ٤٠٠ مركب متطاير في ثمار الطماطم كان لنحو ١٦ مركباً منها رائحة تدل على أنها يمكن أن تسهم في إضفاء المذاق المميز للطماطم، ولكن دون أن ينفرد أى منها بإضفاء صفة المذاق.

وقد افترح أن خلطة من تسعة مركبات يمكن محض تواجدها بنسب معينة إعطاء المذاق المميز للطماطم، وتلك المركبات هي:

cis-3-hexenal

hexanal

1-penten-3-one

3-methylbutanal

trans-2-hexenal

6-methyl-5-hepten-2-one

methyl silicylate

2-isobutylthiazole

β -ionone

ومن بين تلك المركبات فإن لكل من cis-3-hexenal و β -ionone وزناً أكبر في تحديد نكهة الطماطم المميزة، كما أن الطماطم تنفرد بالمركب 2-isobutylthiazole. كذلك يبدو أن للمركب furaneol أهمية في تحديد مذاق الطماطم (Baldwin ٢٠٠٤).

ونلتقى - فيما يلي - مزيداً من الضوء على التغيرات التي تحدث في مكونات خلوية معينة، أو في أنشطة إنزيمية بعينها.

التغيرات في السكريات والأحماض العضوية والحموضة العالية

تشكل السكريات والأحماض العضوية معظم المادة الجافة في ثمرة الطماطم. وبينما

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

تزداد نسبة السكريات بانتظام من مرحلة اكتمال نمو الثمار وهي خضراء إلى طور النضج الاستهلاكي (الأحمر التام)، فإن الحموضة المعيرة تصل إلى أعلى معدلاتها في طور بداية التلوين، ثم تنخفض - عادةً - في مراحل النضج الأكثر تقدمًا كذلك يكون تركيز حامض الستريك والماليك أعلى ما يمكن في طور بداية التلوين عنه في طور النضج الأحمر وتتشابه الثمار الكريزية الصغيرة مع الثمار العادية الكبيرة في معظم هذه التحولات

ففي صنفى الطماطم الكريزيين لارج رد شيرى Large Red Cherry، وسمول فرای Small Fry، وجد Picha (١٩٨٧) أن تركيز كل من الفراكٲوز والجلوكوز ازداد تدريجيًا في الثمار ابتداءً من مرحلة الثمار الخضراء غير مكتملة النمو إلى حين وصولها إلى طور النضج الأحمر، بينما حدث العكس بالنسبة لتركيز السكروز الذى كان أعلى في الثمار الخضراء مكتملة النمو عنه في طور النضج الاستهلاكي، إلا أن تركيز السكروز في جميع مراحل نمو ونضج الثمرة كان أقل كثيرًا من تركيز كل من الفراكٲوز والجلوكوز وقد كان حامض الستريك أعلى الأحماض العضوية تركيزًا، كما ازداد تركيزه - تدريجيًا - ابتداءً من مرحلة الثمار الخضراء غير مكتملة النمو إلى حين وصولها إلى طور النضج الوردى، حيث ظل تركيزه ثابتًا بعد ذلك إلى أن وصلت الثمار إلى مرحلة النضج الأحمر، هذا بينما لوحظ انخفاض في تركيز حامض الماليك بداية من مرحلة الثمار الخضراء مكتملة النمو إلى حين وصولها إلى طور النضج الاستهلاكي.

وقد قارن Koutsos وآخرون (١٩٩٤) التغيرات التى تحدث فى الثمار التى تنضج طبيعيًا على النباتات مع تلك التى تحدث فى الثمار التى تنضج أثناء التخزين، ووجدوا أن رقم حموضة الثمار (ال pH) يرتفع، بينما تنخفض حموضتها المعيرة أثناء النضج فى كلتا الحالتين، إلا أن محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة ازداد فى الثمار التى تركت لتنضج طبيعيًا قبل حصادها، وانخفض فى الثمار التى قطفت وهي خضراء مكتملة النمو، ثم أكملت نضجها أثناء التخزين، سواء أكان التخزين فى الظل، أم فى الضوء المباشر

ويمكن إيجاز أهم التغيرات التي تطرأ على محتوى ثمار الطماطم من مختلف المواد الكربوهيدراتية والإنزيمات التي تملك تلك التغيرات - أثناء نضج الثمار - فيما يلي،

- ١ - اختفاء النشا كلية - تقريباً - فى مرحلة النضج
- ٢ - ازدياد محتوى الثمار من السكريات الكلية والمختزلة بمقدار خمسة أضعاف، وذلك من مرحلة قبل النضج إلى مرحلة النضج.
- ٣ - انخفاض محتوى الثمار من السكريات غير المختزلة أثناء النضج.
- ٤ - انخفاض نشاط الإنزيم sucrose synthase بشدة وبصورة متوازنة مع الانخفاض فى مستوى النشا فى الثمار خلال مراحل نموها.
- ٥ - لا يحدث تغير فى نشاط الإنفرتيز invertase (يسمى حالياً: -beta fructofuranosidase).
- ٦ - ينخفض محتوى الـ hemicellulose الكلى كثيراً من ١٦٪ إلى ٥,٥٪ أثناء النضج، بينما لا يحدث تغير واضح فى محتوى عديدات السكر الأخرى بالجدر الخلوية.
- ٧ - يزداد نشاط الـ polygalacturonase بمقدار خمسة أضعاف أثناء النضج.
- ٨ - يبقى نشاط الـ cellulose ثابتاً أثناء النضج (Singh وآخرون ٢٠٠٠).

التغيرات فى الصلابة

تبين لدى مقارنة التغيرات فى المواد الكربوهيدراتية ونشاط الـ glucanases (الـ galactanase، والـ glucanase، والـ mannase) فى الجدر الخلوية لثمار الطماطم العادية والـ rin (وهى الحاملة لطفرة الـ ripening-inhibitor) أثناء نضجها أن النشاط الإنزيمى للـ glucanases كان أعلى فى الثمار العادية عما فى الـ rin، وأقترح أن ذلك النشاط الإنزيمى يُسهم فى ليونة الثمار، وأن التغيرات فى نشاط تلك الإنزيمات على صلة وثيقة بتحلل الهييميسيليلوز الـ hemicellulose فى الجدر الخلوية (Hong وآخرون ١٩٩٦).

وقد وجد أن تعريض ثمار الطماطم للضغط (وهى نوع من الشد الميكانيكى) يتبعه

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

زيادة كبيرة في كل من معدل التنفس وإنتاج الإثيلين، مع فقد الثمار لصلابتها قبل ثمار الكنترول - التي لم تعرض للضغط - بيومين كذلك ازداد معدل التسرب الأيوني ونشاط الـ polygalacturonase أثناء النضج في الثمار التي تعرضت للضغط - أيًا كانت مرحلة النضج التي أجريت المعاملة عندها - مقارنة بثمار الكنترول التي لم تعط تلك المعاملة. وكانت تلك الزيادات ٢٣٪ في التسرب الأيوني بعد ٦ أيام من المعاملة في الثمار التي تعرضت للضغط وهي في مرحلة النضج الأحمر الفاتح، و ٤٠٪ في نشاط إنزيم البولي جالاكتورينيز بعد ١٠ أيام من المعاملة في الثمار التي تعرضت للضغط وهي في مرحلة التحول (Lee وآخرون ٢٠٠٧)

يزداد نشاط إنزيم بولي جالاكتورينيز Polygalacturonase كثيرًا أثناء نضج الثمار، وهو الإنزيم الرئيسي المسؤول عن فقد الثمار لصلابتها أثناء النضج. وقد وجد Lu وآخرون (١٩٩٥) أن معاملة الثمار الخضراء مكتملة النمو بأى من الإيثيفون أو الـ I-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (يكتب اختصاراً ACC)، وهو المركب البادئ للإثيلين في النباتات) أسرعت بنضج الثمار وأدت إلى زيادة إنتاج الإثيلين ونشاط إنزيم البولي جالاكتورينيز بها وبالمقارنة لم تؤثر معاملة ثمار الطماطم التي تحمل الجين nor - بأى من المركبين - على نضجها أو نشاط الإنزيم فيها

ولكن وبعد دراسة مستفيضة على العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى فقد ثمار الطماطم لصلابتها، قورنت فيها ثمار الصنف Delayed Fruit Deterioration الذى تحتفظ ثماره - إلى درجة كبيرة - بصلابتها، بينما هي تنضج بصورة طبيعية، مع ثمار الصنف العادى Alisa Craig اقترح أن أديم الثمرة يؤثر في فقدتها لصلابتها مباشرة بتوفير دعم فيزيائى، وبطريق غير مباشر بتنظيم فقد الثمرة للرطوبة (Saladié وآخرون ٢٠٠٧). هذا مع العلم بأن النظريات القديمة التي سبق أن لاقت قبولاً واسعاً منذ ثمانينيات القرن الماضى - والتي كانت تتبنى فكرة فقد الثمار لصلابتها - مباشرة - على نشاط الإنزيمات المحللة للجدر الخلوية - لم يعد لها ما يؤيدها من خلال دراسات الهندسة لورائية (Vicente وآخرون ٢٠٠٧)

التنفس وإنتاج الإثيلين

تنتج ثمار الطماطم الإثيلين بمعدل ١-١٠ ميكروليتر/كجم من الثمار في الساعة على ٢٠°م، وتعد حساسة للإثيلين الذي يمكن أن تتعرض له ويكفي تعرضها للإثيلين بتركيز ٠.٥ حجم في المليون لحفز نضجها وما يصاحبه من تغيرات أيضية وعند الإنضاج الصناعى التجارى تعرض الثمار للإثيلين بتركيز ٥٠ حجم في المليون على ٢٠-٢١°م مع ٩٠٪ رطوبة نسبية؛ إذ يكفي ذلك لتحفيز النضج وما أن تصل الثمار في نضجها إلى مراحل التحول فإنها تنتج - بذاتها - من الإثيلين ما يكفي لاستمرار نضجها ولا تحتاج حينئذٍ إلى أى مصدر خارجى للغاز

ويتباين معدل تنفس ثمار الطماطم الناضجة (مجم ثاني أكسيد الكربون/كجم من الثمار في الساعة) حسب ظروف التخزين، كما يلي (من Sargent & Moretti ٢٠٠٤):

الحرارة (°م)	في الهواء	في ٣٪ أكسجين + ٩٧٪ نيتروجين
١٠	١٣-١٦	٦
١٥	١٦-٢٨	-
٢٠	٢٨-٤١	١٢
٢٥	٣٥-٥١	-

أما الثمار الخضراء المكتملة التكوين فإن معدل تنفسها - في الهواء - ينخفض إلى النصف - تقريباً - حيث يكون (بالمليجرام ثاني أكسيد كربون لكل كيلوجرام من الثمار في الساعة) ٣-٤ على ٥°م، و ٦-٨ على ١٠°م، و ٨-١٥ على ١٥°م، و ١٤-٢٢ على ٢٠°م، و ١٨-٢٦ على ٢٥°م (عن Suslow & Cantwell ٢٠٠٦).

وقد وجد Brecht (١٩٨٧) أن إنتاج ثمار الطماطم لغاز الإثيلين يكون بمعدلات منخفضة في الثمار الخضراء غير المكتملة التكوين، ويزداد معدل إنتاج الغاز بمقدار ٣ - ٤ أضعاف عند بداية تكوّن المادة الجيلاتينية في مساكّن الثمار، ثم إلى ٢٠ ضعفاً في

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

مرحلة بداية التلون وقد أدت معاملة الثمار الخضراء غير مكتملة التكوين بالإيثيلين - بتركيز ٥٠ ميكرو لترًا / لتر - إلى الإسراع بتكوين المادة شبه الجيلاتينية وقد تكون غاز الإيثيلين - في الثمار الخضراء - في المساكن قبل أن يظهر في الجدر الثمرية

كما وجد أن المعاملة بمركب ACC (بادئ الإيثيلين) تزيد معدل إنتاج إثمار لغاز الإيثيلين، ويحدث نفس التأثير عند معاملة الثمار الخضراء مكتملة النمو بمركب Methyl-jasmonate (يكتب اختصاراً JA-Me)، الذي يحفز تمثيل الـ ACC في النباتات وتؤدي معاملة الثمار الخضراء بمركب Aminoxyacetic acid (يكتب اختصاراً AOA) - الذي يثبط تمثيل الـ ACC - مع الـ JA-Me إلى انخفاض إنتاج الإيثيلين إلى مستواه الطبيعي في الثمار الناضجة (Saniewski & Czapski ١٩٩٠)

وبالمقارنة فإن معاملة ثمار الطماطم بمركب diazocyclopentadine (يكتب اختصاراً DACP) يثبط اكتسابها اللون الأحمر لتعارضه مع تمثيل الإيثيلين وقد وجد Sisler & Lallu (١٩٩٤) أن المعاملة بهذا المركب أحدثت تأخيراً في اكتمال اكتساب اللون الأحمر - في حرارة ٢٢°م - بنحو ٨ أيام في الطماطم الحمراء جزئياً، و ١٢ يوماً في الطماطم الوردية، و ١٤-١٦ يوماً في الطماطم الخضراء مكتملة التكوين، وذلك مقارنة بثمار الكنترول وقد أدت المعاملة إلى نقص إنتاج الإيثيلين في الثمار الوردية والحمراء، ولكن ارتفع إنتاج الإيثيلين مرة أخرى بعد ٣-٤ أيام من المعاملة وفي الطماطم الخضراء مكتملة النمو ظل إنتاج الإيثيلين منخفضاً لمدة ١٠ أيام في الثمار المعاملة، ولكن ارتفع معدل إنتاج الغاز بعد ذلك إلى أكثر من معدل إنتاجه في ثمار الشاهد

ويؤدي تعرض ثمار الطماطم للضغوط (شد ميكانيكي) إلى إحداث زيادة واضحة في معدل التنفس وفي معدل إنتاج الإيثيلين بعد ساعة واحدة، وبعد يوم واحد - على التوالي - من التعرض لتلك الضغوط وفي خلال ٢٤ ساعة ازداد معدل التنفس بنسبة ٤٠٪ - ٦٠٪ أيًا كانت مرحلة نضج الثمار، بينما ازداد معدل إنتاج الإيثيلين في الثمار التي كانت في مرحلة التحول بعد المعاملة بمقدار ثلاثة أضعاف (Lee وآخرون ٢٠٠٧)

وبدراسة تأثير تغذية الذبابة البيضاء، *Bemisia argentifolii* على نباتات الطماطم على التغيرات الفسيولوجية للثمار التي تنتجها تلك النباتات، والتي تكون مصابة - جراء تغذية الذبابة - بالنضج غير المنتظم irregular ripening وجد أن ثمار صنف الطماطم Florida Petite التي أنتجتها نباتات خالية من الإصابة بالذبابة بدأت الدخول في كلايمكترك في إنتاج الإيثيلين بين ٤٠، و ٤٥ يوماً من تفتح الزهرة، وكان ذلك مصاحباً بزيادة سريعة في اللون بالأحمر وفي فقد الصلابة، بينما بدأ كلايمكترك إنتاج الإيثيلين بين ٤٥، و ٥٠ يوماً من تفتح الزهرة بالنباتات التي أصيبت بالذبابة، ولم تتلون ثمارها باللون الأحمر بنفس الدرجة، ولا فقدت تلك الثمار صلابتها بنفس السرعة التي حدثت بها في ثمار النباتات الخالية من الإصابة بالذبابة. وقد وصلت الثمار التي قطفت من نباتات خالية من الإصابة بالذبابة بعد ٤٥ يوماً من تفتح الزهرة إلى قمة كلايمكترك التنفس وإنتاج الإيثيلين بعد ثلاثة أيام من القطف، واكتسبت اللون الأحمر الطبيعي وفقدت صلابتها بصورة مماثلة للثمار التي تركت لتتضج على النبات. وفي المقابل .. فإن الثمار التي حُصدت من النباتات المصابة بالذبابة بعد ٤٥، أو ٥٠، أو ٥٥ يوماً من تفتح الزهرة لم تُظهر كلايمكترك تنفسى أو فى إنتاج الإيثيلين، ولم تتلون بشكل جيد، كما لم تفقد صلابتها بنفس درجة فقد الصلابة فى الثمار المائلة التى قطفت من ثمار خالية من الإصابة بالذبابة (McCollum وآخرون ٢٠٠٤).

التغيرات التى تحدث فى ثمار الطفرات المؤثرة فى النضج

إن عملية نضج ثمرة الطماطم تتضمن عدداً من التحولات الفسيولوجية، والكيميائية الحيوية، تؤدى إلى جعل الثمرة فى حالة مناسبة للاستهلاك، فيما يتعلق بكل من اللون، والقوام، والطعم، والنكهة. وتشتمل هذه التغيرات - كما أسلفنا - على زيادة سريعة فى إنتاج غازى ثانى أكسيد الكربون والإيثيلين (مثلاً يحدث فى جميع الثمار الكلايمكتيرية)، وتحلل الكلوروفيل، وتمثيل المركبات الكاروتينية وتراكمها، وذوبان المركبات البكتينية، وتكوين المركبات المسؤولة عن النكهة المميزة لثمرة الطماطم، وتنتهى هذه التغيرات بشيخوخة الثمرة ثم موتها

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

وتعرف في الطماطم بعض الطفرات التي تؤثر في نضج الثمرة، وتتناول - في هذا المقام - تأثير بعض هذه الطفرات على نضج ثمار الطماطم وصفات الجودة فيها بعد الحصاد، ونبدأ بالطفرتين rin (أو مشبط النضج ripening inhibitor)، و nor (أو عدم النضج no ripening)

تفشل ثمار الطماطم التي تحمل الجين rin في الوصول إلى مرحلة الكلايمكترك في التنفس، وهي المرحلة التي يصاحبها - كذلك - إنتاج الإثيلين بكثرة، في الوقت الذي تنضج فيه الثمار غير الحاملة لهذا الجين بصورة طبيعية كذلك فإن الثمار الحاملة لهذا الجين لا يتحلل فيها الكلوروفيل، ولا تتكون فيها الصبغات الكاروتينية بصورة طبيعية، ولا تفقد صلابتها. أو ينشط فيها إنزيم البولي جالاكتورينيز Polygalacturonase، في الوقت الذي تكمل فيه الثمار غير الحاملة للجين نضجها بصورة طبيعية إلى أن تصل إلى مرحلة الشيخوخة

كذلك تفشل ثمار الطماطم الحاملة للجين nor في فقد صلابتها أو في التلون الطبيعي الكامل وهي تتشابه مع الثمار الحاملة للجين rin في كل الخصائص التي سبق بيانها، والتي تقود جميعها إلى زيادة فترة صلاحية الثمار للتخزين كما لا يمكن إنضاج الثمار الأصلية في أي من الطفرتين - بصورة طبيعية - حتى ولو عوملت بالإثيلين وتختلف الطفرتان في أن ثمار الطفرة nor تنتج في نهاية الأمر مستوى منخفضاً من الإثيلين، ويتراكم فيها الليكوبين والبيتاكاروتين بعد فترة طويلة من التخزين، بينما لا تنتج ثمار الطفرة rin أي إثيلين، ولا تحتوى على أكثر من آثار من الليكوبين حتى بعد ١٨٠ يوماً من تفتح الزهرة (Ng & Tigchelaar ١٩٧٧)

ومن الطفرات الأخرى المؤثرة على نضج ثمار الطماطم الطفرة Nr (أو التي "لا تنضج أبداً" Never ripe)، وهي - على خلاف ما يدل عليه اسمها - لا تمنع نضج ثمار الطماطم كلية، وإنما تؤخر فقط بداية التغيرات التي تقود - في نهاية الأمر - إلى نضج الثمرة ونجد في هذه الطفرة أن الارتفاع في تنفس الثمار عند الكلايمكترك - وما يصاحبه من إنتاج لغاز الإثيلين - يبلغ ٥٠ / فقط مما يحدث بالثمار العادية، كما لا

الفصل الأول الطماطم

تكتسب الثمار - أبداً - لونها الكامل، مقارنة بالثمار العادية (عن Atta-Aly & El-Beltagy ١٩٩٢)

ويبين جدول (١-٣) خصائص النضج في ثمار الطفرات الثلاث (rin، و Nr، و nor) مقارنة بالنضج في الثمار العادية غير الطفرية

جدول (١-٣): خصائص النضج في ثمار طفرات الطماطم rin، و Nr، و nor مقارنة بالنضج في الثمار العادية (عن Wills ١٩٩٨).

الطفرة	خصائص النضج
Ripening inhibitor (rin)	نمو طبيعي- تتحول ببطئاً إلى اللون الأصفر الشاحب- يقل إنتاجها كثيراً من الإيثيلين- لا تفقد صلابتها بصورة تذكر- يقل فيها كثيراً نشاط الإنزيم بولي جالاكتونيز- لا تنضج بعد معاملتها بالإيثيلين- يؤدي تعريضها لتركيز عالٍ من الأكسجين إلى تلونها بالوردي.
Never Ripe (Nr)	نمو طبيعي- تتحول ببطئاً إلى اللون الأحمر البرتقالي- لا تفقد صلابتها إلا بصورة محدودة- يقل إنتاجها للإيثيلين- يقل فيها نشاط البولي جالاكتونيز- يقل فيها تمثيل الليكوبين.
Non ripening (nor)	أكثر انحرافاً عن النضج الطبيعي عن rin- لونها النهائي أصفر قاتم- إنتاجها من الإيثيلين منخفض جداً- يقل فيها نشاط البولي جالاكتونيز عن ١٪ من نشاطه في الثمار غير الطفرية- يؤدي تعرض النباتات للوحة عالية إلى إسراع نضج الثمار وإلى ظهور لون برتقالي قاتم مع بعض الفقد في الصلابة.

كذلك تعرف الطفرة alc (من كلمة الكوباكو alcobaco) - التي تتشابه مع الطفرتين rin، و nor في غياب الكلايماكتريك التنفسي، وكذلك غياب الكلايماكتريك في إنتاج الإيثيلين من ثمارها، التي تنضج ببطء شديد، والتي لا يظهر بها سوى آثار من نشاط الإنزيم بولي جالاكتونيز، مع احتفاظها بقدرتها على التخزين لفترة تبلغ ٣ أمثال قدرة الثمار العادية على التخزين هذا وتكون الثمار الخليطة في أي من هذه الطفرات (الهجين بين الطفرة والصورة العادية) وسطاً بين الأبوين في نشاط البولي جالاكتونيز،

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

وفي صلابة الثمار، كما تحتفظ الثمار الهجين بقدرتها على التخزين لفترة أطول قليلا من الثمار العادية (Lu وآخرون ١٩٩٤)

وفي دراسة على ثمار الطفرة nor بصورتها الأصلية (nor nor) والخليطة (nor nor⁺) مقارنة بالثمار العادية (nor⁺ nor⁺) - وجد Ng & Tigchelaar (١٩٩٧) أن الثمار الأصلية في الطفرة لم يحدث بها كلايمتريك - لا في التنفس ولا في إنتاج الإيثيلين - وكان قدما لصلابتها بطيئا، ولم يلاحظ بها سوى آثار من نشاط إنزيم البولي جالاكتورنيز في الثمار مكتملة التكوين، وكانت أهم الكاروتينات فيها الفيتون phytoene، والبيتاكاروتين، والنيروسبورين neurosporene، ولكن أصبح الليكوبين والبيتاكاروتين أهم الكاروتينات بعد ١٢٠ يوماً من تفتح الزهرة، مع بقاء الليكوبين أقل من ١٠٪ من المستوى الطبيعي أما الثمار الخليطة في الطفرة فقد تأخر نضجها عما في الثمار العادية، وكان الكلايمتريك فيها مثبطاً جزئياً، ولم يزد إنتاجها من الإيثيلين عن ١/٥ إنتاج الثمار العادية وقد تأخر فقد هذه الثمار لصلابتها وانخفض فيها نشاط إنزيم البولي جالاكتورنيز عن الثمار العادية في مختلف مراحل النضج، كما تراكم الليكوبين في الثمار الخليطة في هذه الطفرة، وكذلك تراكم الجاماكاروتين، والفيتوفلويين phytofluene، والفيتون ببطء، ولكن تراكم البيتا كاروتين فيها بصورة طبيعية

ويستدل من دراسات Poovarlah & Nukaya (١٩٧٩) على وجود علاقة وثيقة بين انخفاض نشاط إنزيم بولي جالاكتورنيز وفشل ثمار الطفرة rin في النضج الطبيعي فقد لوحظ أن بداية الزيادة في نشاط الإنزيم حدثت في الثمار العادية قبل الكلايمتريك التنفسي بنحو ٦ أيام (٤٣ يوماً من تفتح الزهرة)، وأن أعلى نشاط للإنزيم حدث بعدما وصل إنتاج الثمار من غازي ثاني أكسيد الكربون والإيثيلين إلى أعلى معدلاتهما أما في ثمار الطفرة nor، فلم يلاحظ أي تغير في نشاط إنزيم البولي جالاكتورنيز حتى ١٠٠ يوم من تفتح الزهرة وبالمقارنة كانت التغيرات في نشاط إنزيم السينيوليز cellulose متماثلة في الثمار الطبيعية وثمار الطفرة؛ حيث ازداد نشاط الإنزيم تدريجياً مع تقدم نضج الثمار وبينما أدت معاملة ثمار الطفرة بالإيثيلين - لمدة يومين بعد ٣٦

الفصل الأول الطماطم

يوماً من تفتح الزهرة - إلى زيادة نشاط الإنزيم فيها، فإن هذه المعاملة لم تؤثر على نشاط إنزيم البولي جالاكتورينز

وبمقارنة ثمار الطفرتين rin، و nor بالثمار العادية، وجد Agar وآخرون (١٩٩٤) أن ثمار الطفرة rin كانت أكثرها صلابة، وحموضة معايرة، وأقلها في محتوى المواد الصلبة الذائبة الكلية، بينما تميزت ثمار الطفرة nor بأطول فترة صلاحية للتخزين.

وبمقارنة أزواج سلالات من صنف Rutgers ذات أصول وراثية متشابهة isogenic lines يختلف كل زوج منها في احتوائه أو عدم احتوائه على الجينات الطفرية. nor (non-ripening)، و rin (ripening inhibitor)، و Nr (never ripe) .. كانت السلالات الطفرية أبطأ كثيراً في النضج عن نظيراتها غير الطفرية، وخاصة تلك التي احتوت على صفات الـ nor، أو rin اللتان لم تُظهرا أى من التغيرات المميزة للنضج الطبيعي، فيما عدا حدوث زيادة طفيفة في الـ ACC في ثمار الـ nor الزائدة للنضج، أو في إنتاج الإثيلين في الثمار الناضجة من كل من الـ nor، والـ rin. أما ثمار الـ Nr فقد أظهرت تغيرات النضج الطبيعية ولكن بمعدل بلغ حوالى ٥٠٪ من معدلها في الثمار غير المطفرة، في الوقت الذى ازداد فيها كثيراً نشاط الـ ACC، وازداد قليلاً إنتاج الإثيلين عما في حدث في الثمار غير المطفرة. وقد أدت معاملة نباتات الطماطم - فى المزارع المائية - بالـ EDTA بتركيز ١ جم/لتر من المحلول المغذى إلى خفض إنتاج الإثيلين فى الـ Nr بمقدار حوالى ٣٠٪ أثناء نضج ثمارها، وإلى نضج ثمار الـ nor، والـ rin بصورة اقتربت من الصورة الطبيعية، وبدأت ثمار الـ rin فى فقد صلابتها وازداد فيها إنتاج ثانى أكسيد الكربون والإثيلين ونشاط الـ ACC (Atta-Aly & El-Beltagy ١٩٩٢).

وفى دراسة مقارنة عن تركيز كل من المركب ACC والإنزيم ACC synthase المسئولين عن تمثيل الإثيلين فى الثمار عند النضج - فى ثمار الطماطم العادية وكل من الطفرتين nor، و rin - وجد Teraى (١٩٩٣) أن تركيزات المركب والإنزيم، وكذلك إنتاج الإثيلين ازداد أثناء نضج الثمار العادية، ولكن اختلف الأمر فى ثمار الطفرتين: ففي ثمار الطفرة nor حدثت زيادة طفيفة فى إنتاج الإثيلين، وفى نشاط الإنزيم ACC synthase

بعد حوالى ٥٠ يوماً من تفتح الزهرة، ولكن تراكم الـ ACC بوضوح خلال المراحل المتأخرة من تكوين الثمرة أما فى ثمار الطفرة rin فلم تلاحظ تغيرات تذكر فى تركيز الـ ACC أو الـ ACC synthase خلال جميع مراحل تكوين الثمرة، كما ظل معدل إنتاج الإيثيلين ثابتاً تقريباً وبينما أدى تجريح الجذر الثمرية إلى زيادة نشاط الـ ACC synthase — بشدة — فى كل من الثمار العادية وثمار الطفرة nor، فإنه أدى إلى ظهور قليل من النشاط للإنزيم فى ثمار الطفرة rin، التى يخفى من ثمارها غير المجروحة نشاط هذا الإنزيم -

ودرس Hong & Lee (١٩٩٥) التغيرات التى تحدث فى المركبات غير القابلة للذوبان فى الكحول (البكتين، والسيليلوز، والهيميسيليلوز Hemicellulose) أثناء نضج الثمار فى الطماطم العادية، مقارنة بما يحدث فى الثمار التى تحتوى على الجين rin، ووجدوا ان محتوى الثمار من المركبات غير القابلة للذوبان فى الكحول انخفض أثناء النضج فى الطماطم العادية، بينما ظل ثابتاً فى الطماطم التى تحتوى على الجين rin، فضلاً عن أنه كان مرتفعاً فى تلك الثمار أصلاً، منذ البداية — عما فى الطماطم العادية وقد بلغ النقص فى كل من السيليلوز والهيميسيليلوز فى الطماطم العادية أثناء نضجها حوالى ٢٥٪، و ٥٣٪ على التوالى.

وقد قارن Czapka & Saniewski (١٩٩٢) تأثير معاملة الطفرتين nor، و rin بمركب مثيل جاسمونيت methyl jasmonate على إنتاجها للإيثيلين، ووجدوا أن ثمار الطفرة nor أنتجت الإيثيلين بتركيز منخفض — بصورة طبيعية — فى أطوار النضج المتوسطة والمتقدمة، ولكن معاملتها بالمثيل جاسمونيت أدت إلى زيادة نشاط الإنزيم المسئول عن تمثيل الإيثيلين، وزيادة إنتاج الغاز خلال الأسبوع الأول بعد المعاملة، أما ثمار الطفرة rin فكان إنتاجها الطبيعى من الإيثيلين منخفضاً جداً حتى مراحل النضج المتقدمة، ولكن المعاملة بالمركب حفزت نشاط الإنزيم المسئول عن تمثيل الإيثيلين وزيادة إنتاج لغاز كذلك، ولكن لم يصل مستوى نشاط الإنزيم وإنتاج الغاز فى الطفرة rin إلى أكثر من ١، ٢، و ٢ / نظيريهما — على التوالى — فى الطفرة nor

وأمكن حث ثمار الطفرة nor على النضج الجزئي بتعريض النباتات الحاملة لها لتركيزات مرتفعة نسبياً من كلوريد الصوديوم، ولكن لم تؤثر هذه المعاملة على نضج ثمار الطفرة rin. وعلى العكس.. أدى تعريض ثمار الطفرة rin لتركيز عال من الأكسجين في وجود الإثيلين إلى حثها على النضج وتلونها جزئياً، بينما لم تؤثر هذه المعاملة على نضج وتلون ثمار الطفرة nor (عن Atta-Aly & El-Beltagy ١٩٩٢).

هذا وقد وجد Levy-Meir وآخرون (١٩٨٩) ان مستخلصات ثمار، وجلد ثمار الطفرتين nor، و nn تثبط إنبات جراثيم الفطر *Botrytis cinerea*، مقارنة بالثمار الطبيعية. وقد أحدثت - كذلك - ثمار الطماطم الخضراء، مكتملة التكوين العادية تثبيطاً لإنبات جراثيم الفطر مماثلاً لتثبيط الثمار الناضجة من الطفرتين. كما ظهرت مقاومة الطفرتين للفطر على صورة زيادة في فترة الحضانة اللازمة لحدوث الإصابة، ونقص في حالات أعفان الثمار أثناء التخزين. وكان أعلى مستوى من المقاومة في ثمار الطفرة nor في أي من صورتها الأصلية أو الخليطة. وقد أدى تعريض ثمار الطماطم لحرارة الصفر النوى لمدة ٣ أيام، أو معاملتها بالماء الساخن - على حرارة ٥٢°م - لمدة ٥ دقائق إلى إحداث زيادة كبيرة في قابلية الثمار العادية للإصابة، وإلى كسر جزئي في مقاومة ثمار الطفرتين للعفن.

التغيرات التي تحدث في ثمار الطماطم المحمولة وراثياً بهدف التأثير في النضج

حظيت الطماطم بعدد من الدراسات في مجال الهندسة الوراثية من أجل إنتاج نباتات محولة وراثياً تظل ثمارها محتفظة بصلابتها لفترة طويلة بعد نضجها. وقد تركزت معظم الدراسات على نقل الرنا المضاد Antisense RNA لبعض الجينات المؤثرة في التغيرات التي تصاحب نضج الثمار.

فمثلاً . قام Tucker وآخرون (١٩٩٢) بنقل الرنا المضاد للجينين المسؤولين عن تمثيل كل من الإنزيم بولي جالاكتورونيز polygalacturonase (يعطى الرمز PG)، ويكتن إستريز Pectinestrase (يعطى الرمز PE) وفي الثمار العادية لا يكون PG موجوداً في

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية: التداول والتخزين والتصدير

الثمار الخضراء، ولكن يتم تمثيله أثناء النضج، حيث يتواجد - حينئذ - فيما لا يقل عن ثلاثة نظائر إنزيمية isozymes وقد وجد أن نقل الرنا المضاد لك PG منع تحليل البكتين (Pectin depolymerization) أثناء نضج الثمار، الأمر الذى أدى إلى زيادة صلاحية الثمار للتخزين وزيادة تحملها للشحن، أما نقل الرنا المضاد لك PE فقد أدى إلى زيادة معدلات الـ Pectin esterification خلال كل مراحل نضج الثمار، ولكنه لم يؤثر - فيما يبدو - على فسيولوجيا الثمرة. وفيما عدا ذلك، فإن أيض البكتين لم يختلف بين الثمار المحولة وراثيا والثمار العادية وقد عزل Gaffe وآخرون (١٩٩٤) نظيرين (two isoforms) من هذا الإنزيم.

هذا وقد وجد أن نشاط الـ PG فى الثمار المحولة وراثيا لا يتعدى ١٪ من نشاطه الطبيعي فى الثمار العادية وبينما لم تختلف درجة صلابة الثمار المحولة وراثيا عن الثمار العادية - خلال مختلف مراحل نضجها - فإنها - أى الثمار المحولة وراثيا - كانت أكثر قدرة على التخزين وعلى تحمل عمليات الشحن والتداول بدون أن تحدث لها أضرار وفصلا عن ذلك .. كان عصير الثمار المحولة وراثيا أكثر لزوجة عن عصير الثمار العادية (Schuch وآخرون ١٩٩١).

وبالإضافة إلى التأثيرات التى أسلفنا بيانها للمضاد للإنزيم بولى جالاكتورنيز، فإن الثمار المحولة وراثيا أظهرت - كذلك - قدرًا أكبر من المقاومة لكل من الفطرين *Geotrichum candidum*، و *Rhizopus stolonifer* اللذين يصيبان - عادة - ثمار الطماطم أثناء نضجها (Kramer وآخرون ١٩٩٢).

كذلك وجد Oeller وآخرون (١٩٩١) أن نقل الرنا المضاد للجين المسئول عن تمثيل الإنزيم ACC synthase إلى الطماطم العادية ثبت نضج ثمارها، بينما أدت معاملة الثمار المحولة وراثيا بالإيثيلين إلى نضجها بصورة طبيعية ويعنى ذلك أن الإيثيلين هو الذى يبدأ بإحداث التغيرات التى تقود إلى نضج الثمار، وليس بناتج لعملية النضج ذاتها

كما تمكن Klee وآخرون (١٩٩١) من عزل الجين المسئول عن تمثيل الإنزيم ACC deaminase من أحد أنواع بكتيريا التربة (التي أمكن التعرف عليها بقدرتها على النمو في بيئة تحتوي على ACC كمصدر وحيد للنيتروجين) ونقله إلى الطماطم، حيث ظهر أن النباتات المحولة وراثيا كانت أقل قدرة على إنتاج الإيثيلين، وتأخر نضجها بصورة معنوية عن الثمار العادية، واحتفظت الثمار الناضجة بصلابتها لمدة تزيد عن الثمار العادية بما لا يقل عن ستة أسابيع.

وقد أنتجت طماطم محولة وراثيا من الصنف ألزا كريج Ailsa Craig تحتوي على الرنا (آر إن إيه) المضاد antisense RNA للإنزيم المسئول عن تكوين الإيثيلين، وفيها يكون إنتاج الثمار لغاز الإيثيلين منخفضاً بشدة. وقد تبين لدى مقارنة ثمار الصنف الأصلي بالصنف المحول الأصل في تلك الصفة أنهما يتماثلان في طول الفترة التي تمر بين تفتح الأزهار وبدء التغير في لون الثمار، ولكن تقل سرعة تكوين الصبغات — بعد ذلك — في الثمار المحولة وراثياً، كما تقل فيها — أيضاً — سرعة فقد الحموضة مقارنة بالثمار العادية. وعلى الرغم من أن الطرازين لم يختلفا في سرعة فقد الثمار لصلابتها أثناء النضج، إلا أن الثمار المحولة وراثياً كانت أبطأ فقداً لصلابتها في مرحلة "بعد النضج"، مقارنة بالثمار العادية. وأدت المعاملة بالإيثيلين إلى إسراع تلون الثمار المحولة وراثياً بدرجة أكبر عما في الثمار العادية، ولكن تأثير تلك المعاملة على معدل فقد الثمار لصلابتها كان محدوداً وعموماً.. فقد كانت الثمار المحولة وراثياً أقل تعرضاً للإصابة بالأضرار أثناء النضج والحصاد، واحتفظت بجودتها لفترة تخزينية أطول، مقارنة بالثمار العادية، إلا أنها — أى الثمار المحولة وراثياً — فقدت صلابتها بسرعة أكبر عندما حصدت وهى خضراء مكتملة النمو وخزنت في حرارة ٢٠°م، عما لو سمح لها بالنضج على النبات (Murray وآخرون ١٩٩٣).

تأثير حالة الثمار وطريقة تداولها عند الحصاد وبعده على نوعيتها

تتأثر نوعية ثمار الطماطم بعد الحصاد بالعوامل التالية:

١ - مدى اكتمال نمو الثمار عند الحصاد:

لا يمكن أن تتلون الثمار التي تقطف قبل اكتمال تكوينها بصورة جيدة حتى لو أعطيت معاملات الإنضاج الصناعي

٢ - سرعة التخلص من حرارة الحقل field heat بعملية التبريد الأولى:

تؤدي هذه العملية إلى وقف تدهور الثمار سريعاً بعد الحصاد، وتظل محتفظة بوجودتها لفترة أطول

هذا إلا أن إجراء التبريد الأول بالماء البارد، أو قلب حمولة الثمار في أحواض تحتوى على ماء تقل حرارته عن حرارة الثمار - بهدف تقليل الأضرار الميكانيكية التي يمكن أن تحدث للثمار عند قلبها - يمكن - كما أسلفنا - أن يزيد كثيراً من إصابة ثمار الطماطم بالأعفان ويستدل على ذلك من دراسات Showalter (١٩٩٣) التي توصل منها إلى أن ثمار الطماطم تحتوى على فراغات هوائية كثيرة بين الخلايا، ويؤدى قلبها في ماء تنخفض درجة حرارته عن حرارة الثمار ذاتها إلى انكماش هذه الفراغات الهوائية؛ مما يؤدى إلى اندفاع الماء - مع ما يحمله من كائنات مسببة للأعفن - إلى داخل الثمار من خلال موضع اتصالها السابق بالعنق، ذلك لأن جلد الثمار يكون مغطى بطبقة سميكة من الكيوتين، كما أن بشرتها تخلو من الثغور. وقد أدت تدفئة الماء الذى تقلب فيه الثمار إلى الحد من مشكلة الأعفان

٣ - مدى إصابة الثمار بالأضرار Physical Injuries:

يمكن ان تحدث الأضرار فى أية مرحلة من مراحل تداول الثمار فيما بين الحصاد، ووصولها إلى المستهلك وتوجد عدة أنواع من هذه الأضرار، منها: القطوع cuts، واختراق أعناق الثمار المجاورة لها punctures، والخدوش scuffs، والجروح abrasions الناتجة عن الاحتكاكات تشوه هذه الأضرار مظهر الثمار، وتزيد فقدتها للماء، وقابليتها

الفصل الأول: الطماطم

للإصابة بالأعفان، ومن تنفس الثمار، وإنتاج غاز الإثيلين. وقد تفشل المناطق المصابة في التلون باللون الأحمر الطبيعي.

وتظهر على ثمار الطماطم الخضراء مكتملة النمو أنسجة شبه فلينية تنشأ نتيجة لاحتكاك الثمار ببعضها، أو مع الأسطح الخشبية. وتتحول هذه الأنسجة إلى اللون البني عند نضج الثمار، وتكثر الجروح بالثمار مع زيادة الاهتزازات أثناء نقل الثمار.

من المظاهر الخارجية للخدوش والجروح. فقد الثمار لصلابتها، وظهور أنسجة مبتلة water soaked. أما الأعراض الداخلية، فإنها لا تلاحظ غالباً إلا بعد قطع الثمار، وتكون على شكل أنسجة مبتلة في المشيمة والأنسجة الداخلية، وظهور المادة شبه الجيلاتينية بلون ضارب إلى البياض، أو إلى الأخضر، كما تكون منكشة.

وتؤدي الأضرار الداخلية بالثمار التي تحدث نتيجة لسوء التداول وخشونة المعاملة إلى إحداث تغيرات كبيرة في إنتاج مختلف الأنسجة من مختلف المركبات المتطايرة المسؤولة عن النكهة المميزة، مقارنة بثمار الكنتروال التي لا تتعرض لتلك المعاملات.

وتتضمن التغيرات المرصودة التالية (Moretti وآخرون ٢٠٠٣):

النسيج	المركبات المتطايرة
البيريكارب pericarp	trans-2-hexenal
الغرف locules	1-penten-3-one, cis-3-hexenal, 6-methyl-5-hepten-2-one, cis-3-hexenol & 2-isobutylthiazole
المشيمة placenta	1-penten-3-one & β -ionone

٤ - التعرض لدرجات حرارة غير مناسبة:

أ - الحرارة المنخفضة:

لدرجة الحرارة علاقة كبيرة بنوعية الثمار. فتعرض ثمار الطماطم لدرجة حرارة أقل من درجة التجمد (حوالي -١°م) يؤدي إلى ظهور أعراض التجمد freezing injury، وهي المظهر المائي water soaked appearance، وطراوة الثمار، وجفاف المادة شبه

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية. التداول والتخزين والتصدير

الجيلائينية التي توجد في المساكن، كذلك فإن لدرجات الحرارة الأعلى من ٣٠°م تأثيرات سلبية كبيرة على نضج وتلون الثمار، بينما تحدث أضرار البرودة chilling injury عندما تتعرض الثمار لدرجات حرارة منخفضة تقل عن ١٢,٥°م، وتزيد عن درجة التجمد لمدة يتوقف طولها على درجة الحرارة. فكلما زاد انخفاض درجة الحرارة، قصرت الفترة اللازمة لإحداث الأضرار، وتصبح الأضرار أكثر وضوحاً بعد إخراج الثمار من المخازن وتعتبر الثمار الناضجة أقل حساسية لأضرار البرودة من الثمار الخضراء ومن أهم أضرار البرودة. عدم تلون الثمار بصورة جيدة، أو تلوونها بصورة غير منتظمة، وفقد الثمار لصلابتها، وظهور نقر سطحية بها، وتلون البذور باللون البني، وزيادة قابليتها للإصابة بالعفن، خاصة بفطر الألترياريا *Alternaria* كما تؤثر الحرارة المنخفضة تأثيراً سلباً على طعم الثمار، فتزيد الحموضة، وتفقد نكهتها المميزة قبل ظهور أية أعراض أخرى خارجية عليها.

ب - الحرارة المرتفعة:

وجد Hamauzu وآخرون (١٩٩٤) أن ثمار الطماطم الخضراء مكتملة النمو تغير لونها من الأخضر إلى الأحمر في حرارة ٢٠°م، ولكن لونها أصبح خليطاً من الأحمر والبرتقالي، والأصفر في حرارة ٣٠°م، بينما تغير لونها إلى الأصفر في حرارة ٣٥°م. وقد كانت طبقة البشرة أكثر حساسية للحرارة العالية عن الجدر الثمرية، وأدت الحرارة العالية إلى تثبيط تراكم كل من الفيتوين Phytoene واللكيوبين Lycopene بصورة معنوية، وكان تأثيرها الشبط على الفيتوين أكثر من تأثيرها على الليكوبين. وقد ازداد محتوى البيتا كاروتين في كل من البشرة والجدر الثمرية وبدرجة أكبر في البشرة في حرارة ٣٠°م في بداية الأمر، ولكن نقص محتوى البيتا كاروتين مع زيادة فترة التخزين في حرارة ٣٠°م بعد حوالي ١٥ يوماً كذلك انخفض محتوى الثمار من كل من حامض الأسكوربيك والألفا توكوفيرول α -tocopherol أثناء التخزين في حرارة ٣٠°م أو ٣٥°م.

هذا . ويُحدث التعرض للحرارة المرتفعة بعد الحصاد أضراراً فسيولوجية لثمار الطماطم تتضمن انهيار الخلايا والأنسجة الثمرية وقد وجد Inaba & Crandall (١٩٨٨) أن ترك

الشلل الأول: الطماطم

ثمار الطماطم معرضة للشمس بعد الحصاد أدى إلى رفع حرارتها الداخلية إلى 55°C وعندما قيس الضرر الذى تحدثه الحرارة المرتفعة - تحت ظروف المختبر - بوضع الثمار الخضراء مكتملة التكوين فى درجة حرارة تراوحت بين 25°C و 65°C لمدة تراوحت بين ٣٠ دقيقة و ١٨٠ دقيقة - وذلك بقياس درجة التسرب الأيونى من الثمار المعاملة - وجد أن فترات التعرض الحرجة - التى صاحبها ظهور الأضرار - كانت ١٦٦ دقيقة فى حرارة 45°C ، و ١٠٥ دقائق فى حرارة 50°C ، و ٣٤ دقيقة فى حرارة 55°C .

٥ - طول الفترة بين الحصاد والاستهلاك:

يساعد تقصير هذه الفترة على تقليل فقد النكهة المميزة للثمار، وعدم ظهور أى طعم غير مرغوب فيها.

٦ - سرعة النضج:

تتأثر سرعة نضج الثمار بدرجة حرارة التخزين، وبمعاملات الإنضاج الصناعى.

٧ - العيوب الفسيولوجية Physiological Disorders:

إن من أهم العيوب الفسيولوجية التى تظهر بثمار الطماطم، ما يلى:

أ - النضج المتبقع:

تتميز ظاهرة النضج المتبقع blotchy ripening بظهور مناطق خضراء أو خضراء مصفرة على سطح الثمار، ويبدو أن لظهور تلك الظاهرة علاقة بنقص البوتاسيوم والنيتروجين غير العضوى فى التربة. هذا .. ويقل محتوى الأنسجة - التى يظهر بها النضج المتبقع - فى كل من الأحماض العضوية، ومحتوى المواد الصلبة الذائبة، والنشا.

ب - الجدر الرمادية graywall:

تظهر الجدر الرمادية كأنسجة وعائية متحللة فى النسيج الوسطى لجدار الثمرة، وهى تبدأ فى الظهور فى الثمار الخضراء، ويعتقد بأن لظهورها علاقة بالجو البارد، والإضاءة الضعيفة، ونقص التغذية، والتربة المشبعة بالرطوبة، وكذلك بالإصابة بفيرس موزايك التبغ، إلا أن السبب الحقيقى لم يستدل عليه بعد.

ج - عدم انتظام النضج irregular ripening .

تظهر تلك الحالة على صورة عدم تجانس فى النضج، وفى تواجد نسيج أبيض داخلى، ويرتبط ظهورها بتغذية الذبابة البيضاء *Bemisia argentifolii*

د - الكدمات الداخلية internal bruising :

تتميز الكدمات الداخلية بظهور جل أصفر إلى أخضر فى مساكين الثمار الناضجة، ويحدث ذلك عند ضعف النضج الطبيعى للجل نتيجة لحدوث ضغط فيزيائى على الثمار وهى خضراء أو وهى فى طور التحول. ومثل هذه الثمار ينخفض كثيراً محتواها من حامض الأسكوربيك والحموضة المعيرة والكاروتينات الكلية، كما يسوء طعمها وتزداد حساسية الثمار للإصابة بتلك الظاهرة وهى فى مرحلة التحول عما يحدث لها وهى فى مرحلة اكتمال التكوين وهى خضراء (Sargent & Moretti 1994).

هـ - التفلقات .

يؤدى تفلق ثمار الطماطم إلى فقد الثمار لصلاحيتها للتسويق، سواء أحدث ذلك قبل الحصاد، أم بعده

وقد وجد أن من بين العوامل التى تؤثر على تفلق الثمار الهبرى بعد الحصاد ما يلى،

(١) أدى نقع الثمار فى ماء يحتوى على كالسيوم إلى نقص التفلق، بينما أدت إضافة المواد المخيلية إلى زيادته

(٢) أدت معاملة النقع فى محاليل الكالسيوم إلى زيادة محتوى الثمار من الكالسيوم المرتبط، بينما خفضت إضافة المادة المخيلية CDTA من الكالسيوم الذائب.

(٣) ارتبط الفقد الرطوبى للثمار أثناء التخزين بالانخفاض فى قابلية الثمار للتفلق

(٤) وعلى العكس من ذلك . أدى نضج الثمار أثناء تخزينها إلى زيادة قابلية الثمار

للتفلق

(٥) كانت قابلية الثمار للتفلق أكبر عندما كان الحصاد فى الصباح عما كان عليه

الحال عندما كان الحصاد ظهراً، وكان أقل ما يمكن عندما كان الحصاد ليلاً (Lichter وآخرون ٢٠٠٢)

و - البقع الغائمة:

يظهر على ثمار الطماطم - أحياناً - ما يعرف باسم البقع الغائمة cloudy spots، وهى عبارة عن بقع بيضاء أو صفراء اللون غير منتظمة الشكل تتواجد تحت جلد الثمرة مباشرة، بسبب تغذية الخنفساء التنتة stink bug، وهى التى تفرز عند تغذيتها إنزيماً يمنع التلون الطبيعي للثمرة فى موضع التغذية (جامعة بورديو Purdue - الإنترنت - ٢٠٠٧).

٨ - الأضرار المرضية Pathological Disorders:

تنشأ معظم الأضرار المرضية غالباً قبل الحصاد، ولكنها تكون غير ملحوظة، ولا تبدأ فى الظهور إلا بعد أن تزداد شدة الإصابة، ويكون ذلك أثناء التداول والتخزين. تزداد حدة هذه الأمراض بزيادة الجروح، وتعرض الثمار لأضرار البرودة. وتعتبر الأمراض التالية أهمها وأكثرها خطورة وشيوعاً فى المخازن، وأثناء النقل والتسويق:

أ - العفن الأسود black mould:

يسببه الفطر *Alternaria alternata*، ولا يصيب إلا الثمار الحمراء التى أضيرت بفعل التجريح، أو البرودة، أو خزنت لفترة طويلة. ويمكن أن تتواجد جراثيم الفطر على سطح الثمار قبل الحصاد، ولكنها لا تنمو ولا تحدث الإصابة إلا بعد النضج. ويوجد طراز آخر من الفطر هو *A. alternata f. lycopersici* يمكنه إصابة الثمار وهى خضراء. ويمكن خفض نسبة الإصابة بهذا المرض كثيراً باستبعاد جميع الثمار التى تكون فيها جروح، أو شقوق، أو عيوب فسيولوجية يمكن أن تشكل منفذاً للإصابة، مثل تعفن الطرف الزهري، وكذلك بتجنب أضرار البرودة.

وقد وفرت المعاملة بمعلق خلايا فطر الخميرة البازيدى البحرى *Rhodosporidium paludigenum* (عُزل من جنوب بحر شرق الصين) مكافحة جيدة للفطر *Alternaria alternata*، بينما لم يتحقق ذلك باستعمال مزارع الفطر الخلوية المعقمة بالأوتوكليف

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية. التداول والتخزين والتصدير

وقد ازدادت فاعلية المعاملة عندما أجريت قبل الحقن بالفطر بفترة مناسبة، حيث لوحظ أن الفطر تزداد أعداد خلاياه في جروح ثمار الطماطم بمقدار ٥٠ ضعف في خلال ١٢ ساعة من المعاملة به على ٢٥ م (Wang وآخرون ٢٠٠٨).

ب - عفن فيثوفثورا.

يعرف المرض أيضًا باسم Buckeye. ويسببه الفطر *Phytophthora spp.*، ويظهر على شكل مناطق مائية water soaked ذات دوائر بنية مميزة وتحدث الإصابة عادة في الثمار التي تلامس الأرض، خاصة بعد الري أو المطر. ويؤدي استعمال الأغشية البلاستيكية للتربة إلى تقليل الإصابة.

ج - العفن الرمادي grey mould :

يسببه الفطر *Botrytis cinerea*، ويظهر على الثمار الخضراء على شكل دوائر بيضاء تحيط بمركز أخضر (وهو ما يعرف باسم عين الشبح ghost spot) تصبح المناطق المصابة مائية المظهر، ثم تتحول إلى اللون الأخضر الضارب إلى الرمادي أو البني. تحدث الإصابة بالفطر قبل الحصاد، وقد تظهر الأعراض في الحقل أو بعد الحصاد. تفيد المعاملة ببعض المبيدات الفطرية، مثل بوتران Botran في منع الإصابة بهذا المرض بعد الحصاد

ومن بين ٣٠٠ عزلة حُصل عليها من الخمائر، وجد أن ١٤ عزلة من النوعين *Rhodotorula rubra*، و *Candida pelliculosa* كانت شديدة الفاعلية ضد الفطر *Botrytis cinerea* في البيئة الصناعية. وقد اختبرت فاعلية هذه العزلات في مكافحة الفطر بعد الحصاد في ثمار تم عدواها به صناعيًا، وظهر أن إحدى عشرة عزلة منها (من كلا الفطرين) كانت فعالة في مكافحة الفطر بمقدار ٦٠٪، ووفرت عزلة واحدة هي السلالة 231 من *R. rubra* حماية تامة من الإصابة (Dal Bello وآخرون ٢٠٠٨)

د - عفن ريزوبس rhizopus rot

يسببه الفطر *Rhizopus stolonifer*، ولا يصيب إلا الثمار المجروحة أو المتشققة

الفصل الأول. الطماطم

وتظهر الأعراض كبقع كبيرة يوجد فيها ميسيليوم رمادى اللون، تبدو فيه كتل من جراثيم الفطر بلون أبيض أو رمادى ويكافح هذا الفطر جيداً بالمعاملة بالبوتوران.

هـ - عفن التربة soil rot :

يسببه الفطر *Rhizopus solani*، وتظهر الإصابة أولاً على شكل بقع حمراء ضاربة إلى البنى على سطح الثمار التى تلامس التربة، ثم تأخذ البقع بعد ذلك لوناً بنياً داكناً. وتكون غائرة. يفيد استعمال الأغشية البلاستيكية للتربة، أو التربة الرأسية للطماطم فى خفض حالات الإصابة.

و - العفن البكتيرى الطرى bacterial soft rot والتحلل السريع rapid breakdown :

تسببه البكتيريا *Erwinia carotovora*، وتبدأ الإصابة على شكل بقع صغيرة مائية المظهر، وغائرة قليلاً ثم تتسع البقع بسرعة لتشمل معظم الثمار، وتفقّد الأنسجة المصابة صلابتها كلية وتصبح مائية. وقد تبدأ الإصابة فى الحقل، أو بعد الحصاد، وتنتقل الإصابة من الثمار المصابة إلى الثمار السليمة المجاور لها، وتناسبها الحرارة المرتفعة (عن Grierson & Kader ١٩٨٦).

ويحدث التحلل السريع لثمار الطماطم - عادة - نتيجة للإصابة بأحد مرضين أو كلاهما، وهما: بكتيريا العفن الطرى soft rot، وبكتيريا العفن الحامضى sour rot. وفى كلا المرضين تظهر مساحة فاقدة لصلابتها بعد نحو ١٢-١٨ ساعة من الحصاد تزداد تدريجياً سطحياً وفى العمق حتى بعد التعبئة وفى حجرة الإنضاج. تنتج هذه البقع كميات كبيرة من السوائل؛ لتظهر مساحات مبتلة تنضح على الكراتين ذاتها، ولينتشر العفن داخل الكرتونة.

ومن أهم خصائص الإصابة بالعفن الطرى البكتيرى ما يلى:

- ١ - تصاب الثمار فى أى مرحلة من النضج ومن خلال الجروح أو مع الماء من خلال ندبة العنق.
- ٢ - سريعاً من تتحلل الثمرة وتنتج - عادة - سائلاً غير صاف ورائحة غير مقبولة.

٣ - تكون بداية الإصابة كبقع مائية المظهر عند الب: ح في خلال ١٢ ساعة أيًا كانت مسببات الجروح

٤ - قد يظهر على سطح الثمار المصابة نمو لأحد الخمائر الفطرية

٥ - تنتشر الإصابة من ثمرة لأخرى عن طريق إفرازات الثمار المصابة

٦ - تناسب الإصابة الرطوبة العالية وحرارة تتراوح بين ٢٥، و ٣٦°م.

ومن أهم خصائص الإصابة بالعفن الحامض ما يلي،

١ - تسببه بعض أنواع الـ *Geotrichum spp.* بالانفاعة إلى بكتيريا منتجة لحامض

اللاكتيك

٢ - لا تحدث الإصابة إلا من خلال الجروح، حيث تبدأ الأعراض الأولى بظهور بقع مائية المظهر حول الجروح التي حدثت من خلالها الإصابة.

٣ - لا تتسع مساحة البقع المصابة بنفس سرعة اتساع بقع العفن الطرى البكتيري.

٤ - تكون إفرازات الثمرة في موقع البقع شفاقة وذات رائحة حامضية واضحة

٥ - تُغطى البقع بنمو ميسيليومي لأحد الخمائر في خلال ٢٤ ساعة.

٦ - تناسب الإصابة حرارة ٣٠°م.

٧ - لا تصاب الثمار الخضراء المكتملة التكوين بالعفن الحامضى إلا إذا أُضعفت

أنسجتها بتعرضها لأضرار البرودة، ولكن الثمار الحمراء تكون قابلة للإصابة (J.A. Bartz

وآخرون - Univ Florida IFAS - الإنترنت - ٢٠٠٩).

وفي دراسة أجريت على أعقان ثمار الطماطم في مصر (Omar & Mahmoud ١٩٩٤)

أمكن عزل ستة أنواع فطرية من ١٠٠ عينة ثمرية، وكانت أكثر الأنواع الفطرية تواجدًا

هي: *Alternaria alternata*، و *Aspergillus flavus*، و *A. niger*، وجاءت بعدها

الأنواع *Aspergillus famarii*، و *Cochlibolus spicifer*، و *Penicillium citrinum*.

وإلى جانب خطورة هذه الفطريات في إحداث أعقان الثمار، فإن الفطر *A. alternata*

أنتج أعدادًا كبيرة من السموم الفطرية في الثمار، كما أنتج الفطر *A. flavus*

الأفلاتوكسينات B₁، و B₂، وهي من السموم المحدثة للسرطان

وللتفاصيل المتعلقة بأمراض الطماطم بعد الحصاد وطريقة مكافحتها .. يراجع Mahovic وآخرون (٢٠٠٧)

٩ - المعاملة بأشعة جاما:

لا تعتبر الطماطم من المنتجات البستانية التي يمكن إطالة فترة تخزينها بتعرضها لأشعة جاما أو أشعة X؛ ذلك لأنها تفقد صلابتها في غضون بضع ساعات من تعرضها للإشعاع، حتى ولو كانت الثمار خضراء مكتملة التكوين عند معاملتها، ويرجع ذلك إلى الأضرار التي تحدثها معاملة الإشعاع بالأغشية الخلوية، وبعض إنزيمات الجدر الخلوية.

وقد وجد El Assi وآخرون (١٩٩٧) أن ثمار الطماطم الخضراء مكتملة النمو، والوردية الناضجة فقدت صلابتها بوضوح في خلال ساعات من تعرضها لمعاملة إشعاع تراوحت بين ٠,٧ و ٢,٢ kGy من أشعة جاما أو أشعة إكس، وأن الاختلافات في درجة الصلابة بين الثمار المعاملة وثمار الكنترول استمرت خلال فترة التخزين - التي أعقبت المعاملة - على حرارة ٢٠°م. وكان تأثير المعاملة واضحاً - خاصة - على نسيج الجدر الثمرية. وفي جميع الحالات .. أدت المعاملة إلى زيادة التسرب الأيوني. وعلى الرغم من فقد الثمار الخضراء مكتملة النمو المعاملة بالأشعة لصلابتها - خلال فترة الإنضاج في حرارة ٢٠°م التي أعقبت المعاملة - إلا أنها شهدت انخفاضاً دائماً في نشاط إنزيم البولي جالاكتونيز الذي لم يتعد ١٠٪ من نشاطه الطبيعي الذي لوحظ في ثمار الكنترول. وبالمقارنة .. كان تأثير نشاط إنزيم البولي جالاكتونيز في الثمار الوردية أقل مما في الثمار الخضراء مكتملة النمو، ولكنه استمر منخفضاً - كذلك - عما في ثمار الشاهد، كما ازداد نشاط الإنزيمين: بكتين مثيل استريز Pectinmethylestrase، وبيتا جالاكتوسيداز β -galactosidase في المراحل الأولى بعد المعاملة في كلٍّ من مرحلتى نضج الثمار، ولكن لوحظ انخفاضٌ في نشاط الإنزيمين بعد فترة طويلة من التخزين.

معاملات خاصة تعطلها الطماطم قبل التخزين والشحن

تُعطى ثمار الطماطم معاملات خاصة قبل تخزينها أو شحنها، وذلك بهدف إما إطالة

فترة تخزينها، وإما إبطاء تدهورها، وإما الحد من إصابتها بأمراض ما بعد الحصاد، وإما لكل هذه الأهداف مجتمعة وبينما تطبق بعض هذه المعاملات على النطاق التجارى، فإن غالبيتها ما زالت فى مرحلة النطاق البحثى

معاملة ندبة العنق بالشيتوسان

أدت معاملة مكان اتصال العنق بالثمرة فى الطماطم بالشيتوسان chitosan (بمقدار ٤٠٠ ميكروليتر من محلول شيتوسان بتركيز ١٠ جم/لتر) إلى تثبيط نمو الفطر *Alternaria alternata* المسبب لمرض العفن الأسود (الذى سبق عدوى الثمار به)، وذلك عند حفظ الثمار على ٢٠°م لمدة ٢٨ يوماً ولقد كان نشاط الإنزيمات المحللة للأنسجة (وهى polygalacturonase، و pectate lyase، و cellulase) قريباً من البقع المرضية (التي بدأ ظهورها بعد ٤ أيام فى الكنترول وبعد أكثر من ٧ أيام فى الثمار المعاملة) أعلى فى ثمار الكنترول عما فى الثمار المعاملة بالشيتوسان. كذلك فإن معاملة الشيتوسان ثبتت السموم التى أفرزها الفطر وهى الـ alternariol، و alternariol monomethylether، وحفزت إنتاج الفيتو ألكسين ريشيتين rishitin فى أنسجة الثمرة، وحافظت على بقاء الـ pH عند ٦.٤ مقارنة بانخفاضه إلى ٤.٠ فى ثمار الكنترول ولجميع تلك التغيرات علاقة بزيادة مقاومة الثمار للإصابة المرضية (Reddy وآخرون ٢٠٠٠)

تغليف الثمار بغشاء بروتينى

وجد Park وآخرون (١٩٩٤) أن تغليف ثمار الطماطم - وهى فى طور التحول أو طور النضج الوردى - بغشاء رقيق من زيتين الذرة corn-zein، ثم حفظها فى حرارة ٢١°م أدى إلى تأخير تلونها، وتقليل فقدما لوزنها وصلابتها، وزيادة فترة صلاحيتها للتخزين بمقدار ٦ أيام وتجدر الإشارة إلى أن الغشاء الذى استعمل فى هذه الدراسة عبارة عن مادة طبيعية مأكولة تستخرج من حبوب الذرة

كما أدى تغليف ثمار الطماطم فى غشاء من البولي أوليفين polyolefin بسمك ٠.١٥

مللى ميكرون إلى تقليل الفقد في وزن ثمار الطماطم وفي صلابتها خلال خمسة أسابيع من التخزين على 10°C ، و 80% رطوبة نسبية، وذلك مقارنة بعدم استعمال أى أغشية أو استعمال غشاء من البولي فينيل كلورايد بسبك 0.0177 مللى ميكرون، إلا أن الإصابة بالآلترناريا ازدادت في ثمار جميع المعاملات بعد أربعة أسابيع من التخزين (Freeza وآخرون ١٩٩٨).

التشميع والمعاملة بالمطهرات الفطرية

تفيد المعاملة بالمطهرات الفطرية مثل: الكابتان، والدياثين، والثيرام، و o-phenylphenate في تقليل أعفان الثمار. وأفضل وسيلة للمعاملة بتلك المطهرات هي غمر الثمار في محلول شمعي من المبيد كذلك تفيد معاملة الثمار بالبيثوميل، وبهيبوكلوريت الصوديوم. أما المعاملة بالروفرال Rovral - وهو مبيد فطري كذلك - فإنها تسرع نضج الثمار. ولا تجرى أى من هذه المعاملات إلا عند الرغبة في تخزين الطماطم لفترات طويلة.

التعريض للحرارة المرتفعة نسبياً قبل التخزين

يؤدى تعريض ثمار الطماطم لحرارة مرتفعة نسبياً إلى زيادة قدرتها على الاحتفاظ بجودتها أثناء التخزين البارد، وتقليل حساسيتها للإصابة بأضرار البرودة، وتتشابه الطماطم في هذا الأمر مع كثير من المحاصيل البستانية الأخرى الحساسة للبرودة. وتجري هذه المعاملة - في مختلف الثمار الحساسة للبرودة - إما بإبقاء الثمار في هواء دافئ تتراوح حرارته بين 38°C و 46°C لمدة طويلة نسبياً تتراوح بين ١٢ ساعة و ٤ أيام، وإما بغمرها في الماء الحار الذى تتراوح حرارته بين 45°C و 60°C لفترة قصيرة لا تتجاوز ساعة واحدة. وتعد كلتا المعاملتان مؤثرتين في خفض حساسية الطماطم لأضرار البرودة لدى تخزينها - بعد المعاملة الحرارية - على 2°C ، سواء أكانت خضراء مكتملة التكوين، أم في درجات أكثر تقدماً من التلوين (McDonald وآخرون ١٩٩٨).

ولقد وجد Lurie & Klein (١٩٩١) أن بقاء ثمار الطماطم لمدة ٣ أيام في حرارة 36°C

٤٠ م° إلى ٢ م° - لمدة ٣ أسابيع - منع إصابتها بأضرار البرودة، وقد كملت هذه الثمار نضجها بصورة طبيعية، ولكن بمعدل أبطأ من ثمار الكنترول كذلك انخفضت الإصابة بالأعفان في ثمار الطماطم التي تلقت المعاملة الحرارية القصيرة

وفي دراسة لاحقة، وجد Lune وآخرون (١٩٩٣) أن إنتاج الإيثيلين توقف كلية - تقريباً - خلال فترة معاملة الثمار بالحرارة العالية (٣٨ م°) لمدة ٣ أيام، ولكنه عاد سريعاً إلى معدل إنتاجه الطبيعي بعد نقل الثمار إلى حرارة ٢٠ م° وبعد ٣ أسابيع من تخزين الثمار على حراره ٢ م°، كان إنتاج الإيثيلين - من الثمار التي تنقت المعاملة الحرارية قبل التخزين - طبيعياً أثناء نضجها على حرارة ٢٠ م°، بينما كان إنتاج الإيثيلين من ثمار الكنترول - التي خزنت مباشرة على حرارة ٢ م° بدون أن تتلقى المعاملة الحرارية - منخفضاً كما لم تتلون ثمار الكنترول باللون الأحمر بينما تلونت الثمار التي تلقت المعاملة الحرارية بصورة طبيعية كذلك ظهرت بقع بنية غائرة على ثمار الكنترول التي كانت - أيضاً - أكثر قابلية للإصابة بالفطريات من الثمار المعاملة بالحرارة وقد صاحبت المعاملة الحرارية زيادة كبيرة في الرنا الناقل للشفرة الوراثية mRNA الخاص بالبروتينين المصاحبين للصدمات الحرارية، وهما HSP17 و HSP70، وظلت هذه الزيادة مستمرة خلال فترة تخزين الثمار في حرارة ٢ م° التي دامت لمدة ٣ أسابيع

وعنى الرغم من أن Whitaker (١٩٩٤) وجد - كذلك - أن تعريض ثمار الطماطم لحرارة ٣٨ م° لمدة ٣ أيام جعلها أكثر قدرة على تحمل التخزين - بعد ذلك - في حرارة ٥ م° لمدة ٢٠ يوماً، إلا أنه أوضح أن الإنضاج الجزئي للطماطم - قبل التخزين في الحرارة المنخفضة - يكون - أحياناً - أفضل من المعاملة الحرارية في تجنب إصابة الثمار بأضرار البرودة

وتحدر الإشارة إلى أن إبقاء ثمار الطماطم الخضراء مكتملة التكوين أو الوردية اللون في حرارة ٣٨ م° مدة ثلاثة أيام منع - تماماً - إصابتها بالعفن الذي يسببه لفطر *Botrytis cinerea* (Fallik وآخرون ١٩٩٣)

كذلك أفاد نقع الثمار في ماء ساخن تبلغ حرارته 40°C - بدون المعاملة بالمبيدات - في تقليل الإصابة بالأعفان، ولكن إضافة المبيدات الفطرية إلى الماء الذي تنقع فيه الثمار يزيد كفاءة المعاملة في تقليل الأعفان.

وقد نُس تأثير المعاملة الحرارية لثمار الطماطم الخضراء المكملة التكوين، والوردية، والحمراء الفاتحة اللون، والحمراء على حرارة 38°C لمدة ثلاثة أيام قبل تخزينها على 2°C لمدة ستة أسابيع إما في أكياس ورقية، وإما في أكياس من البوليثلين، وذلك على كل من التغيرات اللونية بالثمار، وأضرار البرودة المنظورة، وإنتاج كل من ثنائي أكسيد الكربون والإثيلين، والتسرب الأيوني بعد انتهاء فترة التخزين البارد، ووجد ما يلي:

١ - أصيبت الثمار التي لم تعامل بالحرارة بأضرار البرودة بدرجة أكبر من الثمار التي عوملت بالحرارة، وكانت أبطأ في التلوين.

٢ - أظهرت الثمار التي خزنت في أكياس البوليثلين - سواء أكانت قد عوملت بالحرارة، أم لم تعامل - قدرًا أكبر من أضرار البرودة، والتسرب الأيوني، وإنتاج ثنائي أكسيد الكربون، وقدرًا أقل من إنتاج الإثيلين مقارنة بما حدث في الثمار التي خزنت في أكياس ورقية.

٣ - تلونت الثمار بسرعة أكبر في الأكياس الورقية.

٤ - تناقصت الحساسية للإصابة بأضرار البرودة - تدريجيًا - من الثمار الخضراء المكملة التكوين إلى الثمار الحمراء (Hakim وآخرون ١٩٩٥).

وأدى حقن ثمار الطماطم بال- ^{35}S -methionine قبل تدفئتها إلى 38°C لمدة ٤٨ ساعة إلى تراكم بروتينات خاصة مُعلّمة لم تكن متواجدة في الثمار التي حفظت - منذ البداية - على حرارة 20°C . واستمرت تلك البروتينات متواجدة لمدة ٢١ يومًا عندما كان تخزين الثمار على 2°C ، ولكنها اختفت في خلال أربعة أيام من وضع الثمار على 20°C بعد المعاملة الحرارية. كذلك أصبحت الثمار حساسة لأضرار البرودة عندما وضعت - بعد معاملتها حراريًا - على 20°C لمدة أربعة أيام قبل نقلها إلى 2°C ، ولكن الثمار لم تظهر

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثموية. القداول والتخزين والتصدير

عليها أضرار البرودة عندما كان نقلها إلى ٢°م بعد تعريضها للمعاملة الحرارية مباشرة (Sabehat وآخرون ١٩٩٥)

كما أدت تدفئة ثمار الطماطم إلى ٣٨°م لمدة ٤٨ ساعة إلى منع إصابتها بأضرار البرودة لدى تخزينها على ٢°م لمدة ٢١ يوماً، مقارنة بإصابة شديدة حدثت في ثمار الكنترول التي لم تعامل. ولقد لوحظ وجود عديد من البروتينات (معظمها ذات وزن جزيئي منخفض وبعضها ذات وزن جزيئي مرتفع) في الثمار التي عوملت بالحرارة، بينما كانت تلك البروتينات معدومة أو قليلة التواجد في الثمار التي لم تعامل. هذا .. ولم يستمر تواجد تلك البروتينات في الثمار، وكذلك لم يستمر تحمل الثمار لأضرار البرودة إذا ما تركت في حرارة ٢٠°م بعد معاملتها بالحرارة (Sabehat وآخرون ١٩٩٦).

وقد وجد McDonald وآخرون (١٩٩٦) أن غمر ثمار الطماطم الخضراء مكتملة النمو في الماء في حرارة ٤٢°م لمدة ٦٠ دقيقة، أو في الهواء في حرارة ٣٨°م لمدة ٤٨ ساعة، ثم تخزينها في حرارة ٢°م، أو ١٣°م، قبل نقلها إلى حرارة ٢٠°م هذه الثمار أكملت نضجها بصورة طبيعية، بينما تعفنت ثمار الكنترول التي لم تعط أي من المعاملتين الحراريتين قبل أن تكتسب اللون الأحمر، علماً بأن المعاملة الحرارية لم يكن لها أي تأثير على اللون النهائي للثمار، أو على محتواها من الليكوبين، أو صفات الجودة الداخلية بها سواء أكان تخزينها - بعد ذلك في حرارة ٢°م أم ١٣°م.

وأدى تعريض ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين لحرارة ٣٩°م لمدة ٧٢ ساعة قبل تخزينها على ٢°م لمدة تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع قبل نقلها إلى ٢٤°م لمدة أسبوع إلى منع تدهور جودة الثمار أثناء تخزينها البارد، مقارنة بالتخزين المباشر على ٢°م، إلا أن إطالة فترة التخزين البارد من أسبوعين إلى ستة أسابيع ازداد معه الفقد في الوزن، والتحلل، كما ازداد الـ pH، بينما انخفض كلا من المحتوى الكلورفيللي والكاروتيني، والصلابة، ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية والحموضة المعايرة (Hakim وآخرون ١٩٩٦)

وكان للتبريد التدريجي لثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين حتى ٢°م أثره الإيجابي في تقليل إصابتها بأضرار البرودة، ولكن معاملتها بالحرارة لمدة ٢٤ أو ٤٨ ساعة على ٣٨°م قبل تخزينها على ٢°م منع ظهور أضرار البرودة، وقد اختفى ذلك التأثير عندما نقلت الثمار من ٣٨°م إلى ٢٠°م لمدة أربعة أيام قبل تخزينها على ٢°م. كذلك لم تكن المعاملة بحرارة تزيد عن ٣٨°م بنفس كفاءة المعاملة بتلك الدرجة، بينما ظهرت أضرار للحرارة العالية عندما كانت المعاملة الحرارية لمدة ٢٤ ساعة على ٤٢ أو ٤٦°م (Lurie & Sabeht, ١٩٩٧).

وأدت معاملة ثمار الطماطم وهي في مرحلة التحول بالهواء الحار على ٣٨°م لمدة ٤٨ ساعة، أو للغمر في الماء لمدة ٣٠ دقيقة على حرارة ٤٠°م أو لمدة دقيقتين على ٤٦°م، أو ٤٨، أو ٥٠°م قبل تخزينها على ٢°م إلى خفض إصابتها بأضرار البرودة وخفض إصابتها بالأعقان لمدة ثلاثة أسابيع، بينما تعرضت الثمار التي لم تعامل بالحرارة لأضرار البرودة على ٢°م. وتواجد بالجدار الثمري الخارجى للثمار التي عوملت بالحرارة كميات أكبر من الدهون الفوسفاتية وأقل من الستيرول sterol عما في الثمار التي لم تعامل بالحرارة. كذلك احتوت الثمار التي عوملت بالحرارة على محتوى أقل من الأحماض الدهنية المشبعة على ٢°م، ولكن ليس على ١٢°م. وأظهر الفحص بالمجهر الإلكتروني المقطعي وجود شقوق دقيقة في سطح كل الثمار، إلا أن الثمار التي لم تعامل بالحرارة ظهر بها - كذلك - نموات فطرية في تلك الشقوق، بينما لم تظهر تلك النموات في شقوق الثمار التي عوملت بالحرارة. ويبدو أن جميع تلك التأثيرات للمعاملة الحرارية تؤدي إلى تقوية الأغشية الخلوية، واستمرارها في عملها، بما يؤدي إلى منع انهيار الخلايا؛ الأمر الذي وجد في أجزاء الثمار التي ظهرت عليها أضرار البرودة (Lurie وآخرون ١٩٩٧).

كذلك أدى غمر الطماطم الخضراء المكتملة التكوين في ماء دافئ (٣٨ إلى ٥٤°م) لمدة ٣٠-٩٠ دقيقة قبل تخزينها على ٢°م لمدة ٢-٦ أسابيع إلى انخفاض أضرار البرودة فيها، مع زيادة في سرعة تحليل الكلورفيل وتمثيل الليكوبين، وانخفاض في الحموضة المعيرة وفي إنتاج الإثيلين وثاني أكسيد الكربون والتسرب الأيوني عما حدث في ثمار

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

معاملة الكنترول التي غُمرت في ماء بلغت حرارته 20°C وقد كانت معاملة الغمر في الماء على حرارة 46°C هي الأفضل من حيث أنها كانت الأقل في كل من أضرار البرودة وإنتاج ثاني أكسيد الكربون. وقد أدت زيادة فترة الغمر إلى خفض أضرار البرودة وإنتاج الإثيلين، كما ازدادت أضرار البرودة بزيادة فترة التخزين (Hakim وآخرون ١٩٩٧).

ولم يؤد غمر ثمار الطماطم الخضراء في الماء على حرارة 50°C لمدة ٢,٥ دقيقة إلى ظهور أى أضرار للمعاملة الحرارية، بينما أدى تعريضها لنفس الدرجة لمدة ٥ أو ١٠ دقائق، أو لمدة ٢,٥ دقيقة على 52°C إلى ظهور أضرار طفيفة للحرارة على الثمار وكل هذه المعاملات منعت ظهور أضرار البرودة (المتثلة في منع النضج، وتشقق مكان العنق، وانهييار الأنسجة، وزيادة التحلل) عند التخزين بعد ذلك على 2°C لمدة أسبوعين، ثم على 20°C - لأجل الإنضاج - حتى ١٠ أيام. أدى التعرض لحرارة 50°C لمدة ١٠ أيام إلى إسرار النضج عند التخزين بعد ذلك على 12°C ، ولكن تأخر التلوين - وإن كان قد حدث طبيعياً - عندما كان التخزين على 2°C وقد ضخمت المعاملة الحرارية من الفروق في درجة اكتمال التكوين بين الثمار في اللوط الواحد، حيث بدا أن الثمار الأقل اكتمالاً في النضج كانت أكثر حساسية للحرارة بتثبيط النضج فيها عما في الثمار التي كانت أكثر اكتمالاً في النضج (Brecht وآخرون ١٩٩٩).

كذلك أدى غمر ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين في ماء ساخن على حرارة $50 \pm 2^{\circ}\text{C}$ يحتوى ٥ جم/لتر من كلوريد الكالسيوم لمدة خمس دقائق، ثم وضعها على $3 \pm 1^{\circ}\text{C}$ لمدة وصلت إلى أسبوعين قبل نقلها إلى $14 \pm 2^{\circ}\text{C}$. أدت تلك المعاملة إلى خفض حساسية الثمار لأضرار البرودة بصورة أفضل من المعاملة المنفردة بأى من الحرارة أو كلوريد الكالسيوم، كما أدت إلى زيادة احتفاظ الثمار بجودتها لمدة وصلت إلى أسبوعين (Lacheene ١٩٩٩).

وأمكن تخزين الطماطم - وهى فى مرحلة النضج الوردى - لأكثر من ثلاثة أسابيع على 5°C دون أن تتعرض للإصابة بأضرار البرودة، وذلك بسبق معاملتها بالماء الساخن مع التفريش لمدة ١٥ ثانية على 52°C ، علماً بأن هذه المعاملة وفرت حماية للثمار من

الإصابة بفطر البيوتريتس فى حالة ما إذا كان متواجدًا بالفعل على سطح الثمار أو حقنت به بعد ٢٤ ساعة من المعاملة (Fallik وآخرون ٢٠٠٢).

وقد نتج عن تدفئة ثمار الطماطم فى الهواء إلى ٣٤°م لمدة ٢٤ ساعة قبل تخزينها على ١٠°م لمدة ٣٠ يومًا أقل فقد فى محتواها من مضادات الأكسدة وأقل تغير فى تطور التلون المناسب. ولم يكن لخفض تركيز الأكسجين إلى ٥٪ أثناء المعاملة الحرارية فائدة فى زيادة كفاءة المعاملة فى تقليل أضرار البرودة (على ٤°م)، أو حماية الثمار من الآثار السلبية للمعاملة الحرارية (Soto-Zamora وآخرون ٢٠٠٥).

التعرض للدفع بصورة متقطعة أثناء التخزين

وجد Artés & Escriche (١٩٩٤) أن غمر ثمار الطماطم الخضراء مكتملة النمو أو التى وصلت إلى طور بداية التلون فى محلول من الإبروديون iprodione بتركيز ٠,٥ جم/لتر، ثم تخزينها على ٩°م لمدة ٤ أسابيع مع نقلها إلى حرارة ٢٠°م لمدة يوم واحد أسبوعيًا خلال تلك الفترة - وهو ما يعرف باسم التدفئة المتقطعة Intermittent Warming - منع حدوث أى تحلل بالثمار أو ظهور أى أعراض للبرودة عليها، وأدى إلى تحسين لون الثمار الخارجى، مقارنة بالتخزين المستمر فى حرارة ٩°م. وعلى الرغم من أن تلك المعاملة صاحبها زيادة فى سرعة فقد الثمار لصلابتها، إلا أنها أخرت انكماشها، وأعطت أقل فاقد فى الثمار سواء أكان ذلك عند نهاية فترة التخزين، أم خلال فترة الإنضاج فى حرارة ٢٠°م لمدة ٤ أيام بعد انتهاء التخزين، وذلك مقارنة بالتخزين فى حرارة ٦°م أو ١٢°م سواء أكان مصاحبًا بتدفئة متقطعة لمدة يوم واحد أسبوعيًا، أم لم يكن مصاحبًا بها.

كذلك أدت تدفئة ثمار الطماطم المخزنة على ٢°م لمدة ٣٦ ساعة على ٢٤°م فى نهاية كل أسبوع من التخزين البارد (الذى استمر حتى أربعة أسابيع قبل انضاج الثمار على ٢٤°م لمدة ستة أيام) .. أدت معاملة التدفئة تلك إلى انخفاض تعرض الثمار للإصابة بأضرار البرودة، مع سرعة اكتسابها للون الأحمر، ونقص حموضها المعايير، وكذلك

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية: التداول والتخزين والتصدير

نقص التسرب الأيونى منها، مع منع تكوين البذور فيها لمدة اسبوعين، ومنع النقر السطحية لمدة ثلاثة أسابيع، ولكن ازداد فيها النقص فى الوزن بين الأسبوعين الثانى والرابع (Hakim وآخرون ١٩٩٧).

المعاملة بالإثيلين

أدت معاملة ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين بالإثيلين قبل التخزين إلى منع إصابتها بأضرار البرودة لمدة خمسة أيام على 2.5°C ، كما أدت إلى زيادة فترة صلاحيتها للتسويق سواء أكان تخزينها فى حرارة 2.5°C أم أعلى من ذلك. هذا إلا أن الطماطم أصبحت أقل استجابة لمعاملة الإثيلين بزيادة فترة تخزينها سواء أكان ذلك على 2.5°C أم على 12.5°C وعليه فإنه يوصى بمعاملة الثمار الخضراء المكتملة التكوين بالإثيلين قبل تخزينها أو شحنها، لأن ذلك يفيد فى زيادة سرعة تلونها مع تجانس التلون، وانخفاض احتمالات إصابتها بأضرار البرودة (Chomchalow وآخرون ٢٠٠٢).

المعاملة بالـ 1-MCP

أدت معاملة ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين بالركب المانع القوى لفعل الإثيلين 1-methylcyclopropene (اختصاراً: 1-MCP) إلى تأخير تلوين الثمار، وطراوتها، وإنتاجها للإثيلين، كما حدث الأمر ذاته عندما عوملت الثمار وهى فى طور التحول أو اللون البرتقالى. كذلك قللت المعاملة من الـ mRNA الخاص بثلاث إنزيمات ذات علاقة بالنضج - عندما كانت المعاملة فى أى مرحلة من النضج - وهى

phytoene synthase 1

expansin 1

1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) oxidase 1

ويستفاد مما تقدم أن عملية نضج ثمار الطماطم يمكن تثبيطها على مستويين الفسيولوجى والجزيئى حتى ولو كانت الثمار فى مرحلة متقدمة من النضج (Hoeberchts وآخرون ٢٠٠٢)

وقد تأخر نضج ثمار الطماطم الخضراء المكملة التكوين بشدة على ٢٠°م في هواء يحتوى على ٠,١ حجم فى المليون من الإيثيلين عندما عوملت بالـ 1-MCP بتركيز تراوح بين ٠,١ و ١٠٠ حجم فى المليون، مع تناسب التأخير طردياً - بصورة مباشرة - مع تركيز الـ 1-MCP وفترة التعرض. وأدى تعريض الثمار لتركيز ٥ حجم فى المليون من الـ 1-MCP لمدة ساعة إلى زيادة الوقت اللازم لاكتمال نضج الثمار بنحو ٧٠٪. وقد أظهرت الثمار المعاملة فقداً أقل فى الحموضة المعايرة عند النضج؛ الأمر الذى انعكس فى صورة انخفاض فى نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الأحماض، مقارنة بما كانت عليه النسبة فى الثمار غير المعاملة. أما معاملة الثمار الناضجة بالـ 1-MCP لمدة ساعتين بتركيز ٥-١٠٠ حجم فى المليون فقد أدى إلى زيادة فترة احتفاظ الثمار بصلاحياتها قياساً على مظهرها، وبلغت تلك الزيادة ٢٥٪ من فترة الصلاحية العادية عندما كانت المعاملة بتركيز ٢٠ حجم فى المليون. وقد أدت المعاملة بالمركب إلى خفض معدل التنفس خلال الـ ٦-٨ أيام الأولى - فقط - بعد المعاملة، ولكنها منعت الفقد فى الحموضة المعايرة خلال كل فترة التخزين. ويعنى ذلك أن المعاملة بالـ 1-MCP تجعل الثمار المخزنة أفضل طعماً من تلك التى لا تُعامل (Wills & Ku ٢٠٠٢).

وبينما أدت معاملة عناقيد الطماطم الشيرى بأى من حامض الجاسمونيك بتركيز مللى مول واحد، أو الإيثيلين بتركيز ٥٠ حجم فى المليون إلى انفصال الثمار عن العناقيد أثناء التخزين، فإن معاملة العناقيد بالـ 1-MCP بتركيز ١٠٠ نانو ليتر/لتر لمدة ٢٤ ساعة أدت إلى وقف انفصال الثمار، إلا أن تأثير تلك المعاملة كان جزئياً فقط إذا ما أجريت بعد ثلاث ساعات من معاملة العناقيد بحامض الجاسمونيك أو بالإيثيلين. كذلك أدت معاملة حامض الجاسمونيك والإيثيلين إلى زيادة التعبير عن إنزيمات الـ $\text{endo-1, 4-}\beta\text{-glucanases}$ ، بينما أو قفت معاملة الـ 1-MCP التعبير عنها؛ بما يفيد علاقة تلك الإنزيمات بعملية انفصال الثمار (Ben-Moualem وآخرون ٢٠٠٤).

كما أدت معاملة ثمار الطماطم الخضراء المكملة التكوين بالـ 1-MCP مرة واحدة إلى تأخير التلوين بمقدار ٦ أيام، وأدت معاملة ثانية بالمركب بعد ١٠ أيام من الأولى إلى

تأخير التلون لمدة ٨-١٠ أيام أخرى أما المعاملة المستمرة بالمركب فقد منعت التلون كلية في كل من الثمار التي كانت في مرحلة التحول والثمار التي كانت نصف ناضجة طوال مدة المعاملة (٣٤ يوماً)، ولكن ذلك لم يكن مصاحباً سوى بنقص جزئى فى الفقد فى الصلابة وعندما كانت معاملة الثمار بالـ 1-MCP فى مرحلة ٥٠٪ تلوين تأخر تلون الجل عن التلون الخارجى مقارنة بما حدث من تغيرات لونية فى ثمار الكنترول هذا بينما كان تأثير المعاملة على مكونات النكهة طفيفاً، ولم تؤثر المعاملة على محتوى الثمار من السكر او الحموضة المعايرة (Mir وآخرون ٢٠٠٤)

وأدى غمر ثمار الطماطم وهى فى طور التحول لمدة دقيقة فى محلول 1-MCP بتركيزات تراوحت بين ٥٠، و ٦٠٠ جزء فى المليون ثم تخزينها على ٢٠°م إلى تثبيط أو تأخير إنتاجها للإثيلين، وتنفسها، وتلونها سطحياً، وتراكم الليكوبين ونشاط الـ polygalacturonase فيها، وكانت تلك التأثيرات مرتبطة بالتركيز المستخدم، حيث بلغ التثبيط أقصى مداه عندما كان تركيز 1-MCP ٤٠٠ أو ٦٠٠ جزءاً فى المليون (Choi & Huber ٢٠٠٨) وقد حدثت تأثيرات معاكسة عندما كان التركيز ٦٢٥ جزءاً فى المليون (Choi وآخرون ٢٠٠٨)

كما أدت معاملة ثمار الطماطم فى مرحلة اللون الوردى بالـ 1-MCP بتركيز ٢٥٠ نانو ليتر/لتر لمدة ٨ ساعات على ١٥°م قبل تخزينها على ١٥°م لمدة خمسة أيام ثم إنضاجها على ٢٢°م لمدة ٥-٨ أيام أدت تلك المعاملة إلى حدوث اختلافات فى خصائص قوام الثمار وصفاتها المرئية، ولكن ليس فى خصائص الطعم، وذلك مقارنة بثمار الكنترول. وكانت أبرز الصفات التى اختلفت فيها الثمار المعاملة أنها كانت أقل احمراراً، وأن المادة الجيلاتينية فيها كانت كذلك أقل احمراراً، وأن بذورها كانت أصغر حجماً، وكان طعمها دقيقياً بصورة أكبر (Cliff وآخرون ٢٠٠٩)

وعندما أعطيت ثمار الطماطم - وهى فى مرحلة التحول اللوني breaker-turning stage - معاملات متعاقبة بالماء الكلور (١٣٤ مول هيبوكلويت الصوديوم /م^٢)، و 1-MCP (٣٧٠ مللى مول / م^٢ أو ٢٠٠ ميكروجرام / لت)، ثم خزنت على ٢٠°م، أدت

معاملة واحدة بال 1-MCP - سواء أكانت منفردة، أم قبل المعاملة بالكلورين - إلى إبطاء التلون السطحي للثمار ونضجها (Choi وآخرون ٢٠٠٩).

التعرض لتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون

يؤدي تعرض ثمار الطماطم لتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون إلى تثبيط إنتاجها للإيثيلين، من خلال تأثير ثاني أكسيد الكربون على موقع يسبق تحول ال ACC إلى إيثيلين (de Wild وآخرون ٢٠٠٥).

الغمر في محاليل أملاح الكالسيوم

أوضحت الدراسات أن غمر ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين لمدة دقيقة واحدة إلى أربع دقائق في محلول ٢٪ كلوريد كالسيوم قبل تخزينها أحدث زيادة جوهرية في محتوى قشرة الثمرة من الكالسيوم وقلل أعفان بعد الحصاد لمدة ٢٤ يومًا على ٢٠°م. كما تبين أن عفن ريزوبس *Rhizopus rot* تأثر بتركيز ٣٪ كلوريد الكالسيوم، بينما تأثر فطر الألترناريا بتركيز ٢٪، و ٣٪ (Ritenour & Narciso ٢٠٠٦).

التعرض لأبخرة حامض الخليك

وجد Sholberg & Gaunce (١٩٩٥) أن بخار حامض الخليك بتركيز ٢,٧ - ٥,٤ مليجرامًا/لتر من الهواء أدى إلى منع إنبات جراثيم الفطرين *Botrytis cinerea*، و *Penicillium expansum* بصورة تامة. كذلك لم تتعفن ثمار الطماطم التي حقنت بالفطر *B. cinerea* عندما تعرضت بعد ذلك لأبخرة حامض الخليك بتركيز ملليجرامين في كل لتر من الهواء في حرارة ٥°م وأدت زيادة الرطوبة النسبية من ١٧٪ إلى ٩٨٪ إلى زيادة كفاءة عملية التبخير بحامض الخليك في حرارة ٥°م، و ٢٠°م.

التعرض لأبخرة الكحول الإيثيلي

وجد Saltveit & Sharaf (١٩٩٢) أن معاملة ثمار الطماطم الخضراء مكتملة التكوين بأبخرة الإيثانول (الكحول الإيثيلي) ثبت نضجها، وأن معاملة الثمار التي في مرحلة

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

بداية التلون أو التي في طور النضج الوردى ثبت احمرارها وقد أدت المعاملة بالإيثانول بمعدل ٢ مل/كجم من الثمار على ٢٠°م إلى زيادة التأخير في النضج خلال فترة التخزين التالية للمعاملة في حرارة ٢٠°م، و ١٥°م، و ١٢°م بمقدار ٥، و ٦، و ٧ أيام على التوالي، مقارنة بثمار الشاهد، دون أن يحدث أى نقص في صفات الجودة كما أحدثت زيادة فترة التعريض لأبخرة الإيثانول من ساعتين إلى ست ساعات تأثيرات واضحة على إنتاج الإثيلين وثنائي أكسيد الكربون، ولكن هذه الزيادة لم تؤثر جوهرياً على فترة تثبيط النضج في الثمار الخضراء مكتملة النمو، أو على معدل فقد الثمار لصلابتها أثناء نضجها وأدت زيادة الحرارة أثناء فترة التعريض للإيثانول إلى زيادة فاعلية المعاملة، مع حدوث نفس المستوى من تثبيط النضج بالتعرض للإيثانول لمدة ٦ ساعات في ٢٠°م، مثل التعريض لمدة ٤ ساعات في ٢٥°م، أو لمدة ساعتين في ٣٠°م.

كما وجد أن تعرض ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين وفي طور التحول إلى أبخرة الإيثانول بمعدل ٥ مل/كجم من الثمار لمدة خمس ساعات على ١٨°م أدى إلى تثبيط تلون الثمار، حيث أكملت نضجها بعد ٣٢ يوماً للثمار الخضراء المكتملة التكوين، و ٢٢ يوماً للثمار التي عوملت في طور التحول، مقارنة باكتمال التلون بعد ٢٠، و ١٦ يوماً في ثمار الكنترول التي كانت من مرحلتى النضج، على التوالي (Hong وآخرون ١٩٩٥، و Hong & Lee ١٩٩٦).

كذلك أدى تعرض ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين بصورة منتظمة لبخار الإيثانول بتركيز ٠,٠٢٪ أو ٠,٠٣٪ لمدة أسبوعين إلى تأخير نضج الثمار من خلال تثبيط تمثيل الإثيلين وفعله، ولكن هذا التأثير كان مؤقتاً حيث توقف بزوال المؤثر (أبخرة الإيثانول) واستعادت الثمار نضجها الطبيعي (Atta-Ally وآخرون ١٩٩٩).

التعرض لأبخرة الهكسانال

أدت معاملة ثمار الطماطم المكتملة التكوين الخضراء بعد الحصاد بتيار مستمر من بخار الهكسانال hexanal أثناء تخزينها لمدة ٧ أيام على حرارة ٢٠±١°م ورطوبة نسبية حوالى ٩٩٪ إلى تثبيط إصابتها بالعفن الرمادى الذى يسببه الفطر *Botrytis cinerea*,

وذلك عند حد أدنى من تركيز الهكسانال قدره ٤٠-٧٠ ميكروليتر/لتر وقد صاحبت المعاملة زيادة في معدل تنفس الثمار مقدارها حوالي ٥٠٪، ولكن مع ببطء في احمرارها. هذا بينما لم تُحدث المعاملة أى تغير باتجاه معين في إنتاج الثمار للإثيلين، كما لم تؤثر في صلابتها. وقد بدا أن معاملة إطلاق الهكسانال بهذا التركيز المنخفض في عبوات الثمار يمكن أن يُطيل من أمد تخزينها (Utto وآخرون ٢٠٠٨).

التعرض لأبخرة الأسيتالدهيد

أدت معاملة ثمار الطماطم بعد الحصاد بأبخرة الأسيتالدهيد إلى تحسين صفات الجودة المحسوسة مقبولة محتوى السكر، ونسبة السكر إلى الحامض، والتغيرات في الطعم؛ وبالمقارنة أدت المعاملة بأبخرة الإيثانول إلى نتائج معاكسة ولكن محدودة. أما المعاملة بالإثيلين فقد كانت أكثر كفاءة في تحسين لون الثمار مع زيادة محتواها الكلى من المواد الكاروتينية، ولكن الإثيلين كان معدوم أو قليل التأثير على صفات الجودة المحسوسة، وأدى - أحياناً - إلى تدهورها. ويستنتج من ذلك أن الأسيتالدهيد والمركبات المتطايرة الأخرى القريبة منه ربما تكون هامة في تطوير صفات الجودة الحسية، سواء أحدث ذلك طبيعياً أثناء نضج الثمار أم كمعاملة بعد الحصاد (Paz وآخرون ٢٠٠٦).

المعاملة بالمثيل جاسمونيت

أدت معاملة ثمار الطماطم ذات التركيب الوراثى nor بالك methyl jasmonate إلى زيادة نشاط الإنزيمات ذات العلاقة بتمثيل الإثيلين وزيادة إنتاج الإثيلين. وحدث الأمر ذاته لدى معاملة الثمار ذات التركيب الوراثى rin إلا أن الزيادة في نشاط الإنزيمات ذات العلاقة بتمثيل الإثيلين، وإنتاج الإثيلين كانت - على التوالى - حوالى نصف، وثلاث الزيادة التى حدثت فى الثمار الـ nor جراء المعاملة. هذا مع العلم بأن النشاط الإنزيمى وإنتاج الإثيلين بالثمار غير المعاملة من كلا التركيبين الوراثيين (الطفرتين) كان منخفضاً (Czapski & Saniewski ١٩٩٢).

هذا . ويلعب المثيل جاسمونيت methyl jasmonate - الذى يُشتق من الهرمون

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية: التداول والتخزين والتصدير

النباتي حامض الجاسمونك jasmonic acid - دوراً حاسماً في حث المقاومة ضد الفطريات. ولقد وجد أن معاملة ثمار الطماطم - بعد الحصاد - بالمثيل جاسمونيت خفضت من أعراض الإصابة بالفطر *Botrytis cinerea* مسبب مرض العفن الرمادى عندما أجريت المعاملة بعد يوم واحد من حقن الثمار بالفطر، وتناقص تأثير المعاملة كثيراً بتأخير إجرائها بعد الحقن حتى اختفى تأثيرها تماماً عندما كان إجراؤها بعد ٩ أيام من الحقن كذلك حدث تنشيط في تمثيل الإثيلين استجابة للمعاملة بالمثيل جاسمونيت في الثمار الخضراء بعد يوم واحد من المعاملة (Yu وآخرون ٢٠٠٩).

المعاملة بمتعددات الأمين

أدت معاملة ثمار الطماطم بمتعدد الأمين: spermine بتركيز مللى مول واحد إلى تحسين الوقت اللازم لاكمال النضج (١٩ يوماً) والصلاحية للتخزين (٤٣ يوماً)، مقارنة بفترات أقل (١١، و ٢٦ يوماً لاكمال النضج والصلاحية للتخزين، على التوالي) في ثمار الكنترول. وبالمقارنة .. أدت المعاملة بالـ spermidine بتركيز مللى مول واحد إلى اكتمال النضج في ١٦ يوماً، والصلاحية للتخزين لمدة ٣٨ يوماً، بينما كانت المعاملة بالـ putrescine أضعفها تأثيراً. وقد حاشطت المعاملة التي أعطت أطول فترة صلاحية للتخزين على أعلى نسبة سكر ومواد صلبة نائية وحموضة بالثمار طوال فترة التخزين (Bhagwan وآخرون ٢٠٠٠).

المعاملة بمضادات الأكسدة

أدى نقع عناقيد ثمار الطماطم الكريزية في محلول من مضاد الأكسدة butylated hydroxyanisole بتركيز ٣٪ إلى خفض انفصال الثمار من أعناقها، وكانت صفات جودة الثمار مقبولة بعد ٢١ يوماً من التخزين أو الشحن على ١٢ أو ١٧ م° (Fuchs وآخرون ١٩٩٥).

التعرض للأشعة الحمراء

أدى تعريض ثمار الطماطم - وهي في مرحلة التحول - للضوء الأحمر لمدة ثلاث

دقائق إلى إسرار تلونها بالأحمر، بينما تأخر تلونها بتعريضها لثلاث دقائق للأشعة تحت الحمراء، وذلك أثناء الأيام الأربعة الأولى من النضج. ولقد كانت هذه التأثيرات قابلة للإنعكاس عندما أعطيت معاملتا الأشعة الحمراء وتحت الحمراء بالتتابع مع فاصل بين كل معاملة والأخرى لمدة يوم أو يومين. كذلك كانت صلابة الثمار التى عوملت بالأشعة الحمراء أقل من صلابة الثمار التى عوملت بالأشعة تحت الحمراء، أو بـ ١٠٠ جزء فى المليون من الإيثيلين لمدة يوم، أو تلك التى خزنت فى الظلام. وقد كان تأثير معاملة الأشعة الحمراء على النضج أقوى ما يمكن عندما أجريت المعاملة فى طور بداية التلوين breaker أو فى طور التحول turning عما كان عليه الحال عندما أجريت والثمار فى طور النضج الوردى أو الأحمر (Lee وآخرون ١٩٩٧).

التعريض للأشعة فوق البنفسجية

أدى تعريض ثمار الطماطم للأشعة فوق البنفسجية (بمعدل ٣.٢-١٩.٢ كيلوجول/م^٢) بعد حصاها إلى خفض العد الميكروبي فى الثمار المجهزة للمستهلك fresh-cut، وزيادة محتواها الفينولى، وكذلك خفض تحليل فيتامين ج بها بعد ٧ أيام من التخزين على ٤-٦ م°، بينما لم يكن لتلك المعاملة أى تأثير على مظهر الثمار أو لونها أو محتوى الثمار المجهزة للمستهلك من الليكوبين (Kim وآخرون ١٩٩٦).

وأفادت المعاملة المزدوجة بكل من الأشعة فوق البنفسجية UV-C (بطول موجة ٢٥٤ نانوميتر)، وفطر المكافحة الحيوية *Debaryomyces hansenii* فى مكافحة الفطر *Rhizopus stolonifer* مسبب عفن ريزوبس الطرى فى كل من الطماطم والبطاطا (Stevens وآخرون ١٩٩٧).

كذلك أدت معاملة ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين بالأشعة فوق البنفسجية UV-C (طول موجى ٢٠٠-٢٨٠ نانوميتر) بجرعة قدرها ٣.٧ كيلوجول/م^٢ (kJ/m^2) إلى تأخير النضج والشيخوخة، بينما أحدثت الجرعات الأعلى عن ذلك إتلافاً فى النضج وتلوّناً بنيّاً غير طبيعى ظهر على صورة انسحاق على سطح

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية: القداول والتخزين والتصدير

الثمرة وأدت جرعة ٣,٧ كيلوجول/م^٢ إلى تأخير تلون الثمار وتأخير ليونة أنسجتها جوهرياً، مع تأخير فى الوصول إلى مرحلة الكلايمكتيريك لمدة لا تقل عن سبعة أيام، وكذلك نقص فى معدل التنفس وإنتاج الإثيلين. ويعتقد أن تأخير المعاملة لحالة الشيخوخة كان مردها إلى ما أحدثته من زيادة فى محتوى البتروسين putrescine، وهو مركب مضاد للشيخوخة يحدث تأثيراً فسيولوجياً مضاداً لتأثير الإثيلين (Maharaj وآخرون ١٩٩٩).

وأدى تعريض ثمار الطماطم - بعد الحصاد - لأشعة UV-C بمعدل ٣,٧ كيلوجول/م^٢ (kJ/m²) إلى زيادة قابليتها للإصابة بالفطر *Botrytis cinerea* بعد المعاملة مباشرة، ولكنها أصبحت مقاومة تدريجياً - بعد ذلك - ولحين انتهاء فترة التخزين التى دامت ٣٥ يوماً وقد حثت المعاملة على تمثيل الفيتوالاكسين ريشتين rishitin وتراكمه، وكان هذا التراكم تدريجياً ووصل إلى أعلى مستوى له (٤٦.٢٣ مجم/كجم) قبل اليوم الخامس عشر من المعاملة، وأعقب ذلك انخفاض مستواه تدريجياً إلى أن وصل إلى ٣.٥ مجم/كجم فى نهاية فترة التخزين وعلى الرغم من أن حقن الثمار غير المعاملة بالأشعة فوق البنفسجية حثت تمثيل وتراكم الريشتين - كذلك - إلا أن تراكم الفيتوالاكسين كان أعلى بكثير فى الثمار التى عوملت بالأشعة فوق البنفسجية وسواء أعوملت الثمار بالأشعة فوق البنفسجية، أم لم تعامل فإن قدرتها على إنتاج الريشتين وتراكمه انخفضت مع زيادة النضج ولقد كان هناك ارتباط جوهري بين تراكم الريشتين فى الثمار المعاملة بالأشعة فوق البنفسجية - قبل وبعد الحقن بالفطر - والمقاومة للمرض ويبدو أن الزيادة القصيرة المؤقتة فى القابلية للإصابة بالفطر التى حدثت بعد المعاملة بالأشعة مباشرة كان مردها إلى حدوث زيادة شديدة فى الشدء التأكسدى الذى استُحثت بواسطة كل من الأشعة فوق البنفسجية والحقن بالفطر ولتركيز الريشتين عند الحقن بالفطر أهميته فى ظهور المقاومة، بينما يبدو أن تراكمه بعد الحقن بالفطر يلعب دوراً فى تأكيد دعم تلك المقاومة ولكن لا يبدو أن الريشتين - وحده - هو المسئول عن استمرار المقاومة للفطر إلى نهاية فترة التخزين (Charles وآخرون ٢٠٠٨).

الفصل الأول: الطماطم

ولقد أحدثت هذه المعاملة بالـ UV-C (٣٧ كيلوجول/م^٢) تحورات تركيبية مجهرية فى نسيج البيريكارب (الجدار الثمرى الخارجى)، حيث حدثت بلزمة فى خلايا الـ epicarp (بشرة الغلاف الخارجى) وفى بعض خلايا الـ mesocarp (الجدار الثمرى الوسطى). وأدى انهيار تلك الخلايا - الذى كان مشابهاً لما يحدث فى تفاعل فرط الحساسية إلى تكوين منطقة مكدسة بالجدار الخلوية كانت أقل قابلية للتحلل بواسطة الإنزيمات المحللة للجدار الخلوية التى يفرزها الفطر (Charles وآخرون ٢٠٠٨ ب).

وبدا واضحاً أن المعاملة حفزت تمثيل المركبات الفينولية فى خلايا الـ epicarp، والـ mesocarp، كما حدث تعزيز بيوكيميائى للجدار الخلوية باللجننة والسوبرة فى المنطقة التى حدث فيها تكدس للجدار الخلوية بفعل معاملة الأشعة، وذلك قبل الحقن بالفطر. وعلى الرغم من أن تلك التغيرات حدثت كذلك فى الثمار التى حقنت بالفطر دون أن تعامل بالأشعة، إلا أنها كانت بطيئة ومتأخرة بدرجة جعلتها غير مؤثرة فى مقاومة الفطر (Charles وآخرون ٢٠٠٨ ج).

كذلك أحدثت معاملة ثمار الطماطم بالأشعة فوق البنفسجية (UV-C) بعد الحصاد زيادة فى محتواها الكلى من البروتين استمر لمدة ١٠ أيام بعد المعاملة، ثم انخفض تدريجياً بعد ذلك خلال ٣٠ يوماً من التخزين، هذا بينما انخفض المحتوى البروتينى للثمار التى لم تُعط معاملة الـ UV-C بصورة ثابتة خلال كل فترة التخزين.

ولقد كان تأثير معاملة الـ UV-C على البروتينات على النحو التالي:

- ١- كبح التعبير الجينى عن بعض البروتينات، ويعتقد بأنها تلك المتعلقة بالنضج.
- ٢- حفز التعبير الجينى لعدة إنزيمات كان منها: an acidic β -1,3-glucanase، وثلاثة acidic chitinases، وثلاثة basic chitinases.
- ٣- حدث تمثيل ما لا يقل عن خمسة بروتينات كانت أربعة منها بروتينات قاعدية. ومن البروتينات المستحثة بالمعاملة كانت ثلاثة (a basic β -1,3-glucanase and two acidic chitinases) لها علاقة - على ما يبدو - بالبروتينات ذات الصلة بالتطفل

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

المرضى pathogenesis-related (اختصاراً PRPs)، حيث استُحث إنتاجها - كذلك -
بالمعاملة بالفطر *Botrytis cinerea*.

ويبدو أن لتلك الـ PRPs دور أساسى فى المقاومة التى تُستحث فى ثمار الطماطم التى
تعالمل بالـ UV-C (Charles وآخرون ٢٠٠٩)

المعاملة بالأوزون

أدت معاملة ثمار الطماطم بالأوزون بتركيزات تراوحت بين ٠,٠٠٥ (الكنترول)، و ٥٠
ميكرومول لكل مؤ لفترات وصلت إلى ١٣ يوماً على ١٣ م قبل أو بعد إصابتها بالفطرين
Alternaria alternata (مسبب مرض البقعة السوداء)، و *Colletotrichum coccodes*
(مسبب مرض الأنثراكنوز) إلى تقليل تطور المرضين وتجرثم الفطرين، مع زيادة تأثير
المعاملة بزيادة تركيز الأوزون، وبزيادة فترة التعرض للغاز وقد حققت المعاملة بتركيز يقل
عن ٠ ٢ ميكرومول/مول (وهى الحدود المسموح بها للمعاملة فى أوروبا) نتائج جيدة جداً
ولما لم يظهر تأثير للمعاملة بالغاز على النمو الفطرى فى البيئات الصناعية، فقد استنتج أن
الأوزون يستحث فى الأنسجة النباتية التى تتعرض له تغيرات تلعب دوراً فى التفاعلات
بين الأنسجة الثمرية والمسببات المرضية (Tzortzakos وآخرون ٢٠٠٨).

التعريض لحقل كهرومغناطيسى

أدى تعريض ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين لحقل كهرومغناطيسى سالب
مقداره ٢- كيلوفولت/سم لمدة ساعتين على ٢٠ م إلى المحافظة على جودة الثمار
وصلاحيتها للتخزين لمدة ٣٠ يوماً على ١٣ + ١ م مع ٨٥٪-٩٠٪ رطوبة نسبية، فقد
أدت هذه المعاملة إلى تأخير التدهور فى صلابة الثمار، والتغيرات اللونية، وكذلك تأخير
التغيرات فى السكر الذائب الكلى والحموضة المعايرة أثناء التخزين، إلى جانب تأخرها
فى الكلايمكتيك التنفسى وإنتاج الإثيلين لمدة ستة وثلاثة أيام على التوالى، وكذلك
تُبظت فيها الزيادة فى كل من محتوى الـ malondialdehyde والتوصيل الكهربائى
(Wang وآخرون ٢٠٠٨)

إنضاج الثمار الخضراء مكتملة التكوين

النضج الطبيعي

تحصد ثمار الاستهلاك الطازج - غالباً - وهي خضراء مكتملة التكوين، وخاصة عندما تكون الأسواق بعيدة عن حقل الإنتاج، حيث تكتسب الثمار لونها الأحمر أثناء الشحن لتصل إلى المستهلك وهي في طور النضج الأحمر الفاتح أو الأحمر، وتتراوح الحرارة المناسبة للشحن من ١٣°م للثمار الخضراء مكتملة التكوين إلى ٢١°م للثمار التي في طور النضج الأحمر الفاتح. ويكون التلون بطيئاً ولا يتم بصورة جيدة في الحرارة الأقل من ١٣°م وتعرض الثمار للإصابة بأضرار البرودة في حرارة ٧°م أو أقل. وتؤدي الحرارة الأعلى من ٢١°م إلى إسراع نضج الثمار، لكن استمرار ارتفاع الحرارة حتى ٢٩°م يؤدي مرة أخرى إلى عدم تلون الثمار بصورة جيدة.

ويلزم توفر الظروف البيئية التالية حتى يحون التلون جيئاً،

- ١- درجة الحرارة المناسبة كما سبق بيانه
- ٢- التهوية الجيدة، لأن الأكسجين ضروري لتنفس الثمار، ولا يفيد تغليفها في الورق، كما أن لتبطين العبوات بالبوليثلين آثار ضارة
- ٣- الرطوبة النسبية المرتفعة التي تتراوح من ٩٠٪ إلى ٩٥٪ لتقليل فقد الماء من الثمار

الإنضاج الصناعي

يعنى الإنضاج الصناعي أية محاولة لإسراع تلون الثمار، ووصولها إلى طور النضج الأحمر. تجرى هذه العملية - عادة - للثمار التي تحصد وهي خضراء مكتملة التكوين، ولكنها قد تجرى أيضاً على أية ثمار لم يكتمل تلونها بعد عند الرغبة في الإسراع بتلونها، ويكون ذلك أمراً مرغوباً فيه في الحالات التالية.

١ - لكي تصل الثمار للمستهلك، وهي تامة التلون

٢ - عند ارتفاع الأسعار

٣ - عند بطة عملية التلون بسبب انخفاض درجة الحرارة

يستعمل غاز الإثيلين فى إنضاج الطماطم صناعياً، ويقتصر تأثير الغاز على الثمار الخضراء مكتملة التكوين، وليس للمعاملة أى تأثير على الثمار الخضراء غير مكتملة التكوين (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨). ومع أن ثمار الطماطم تنتج غاز الإثيلين بصورة طبيعية عند نضجها، ويؤدى وضعها فى مخازن محكمة الغلق إلى إسراع تلونها، دون الحاجة إلى المعاملة بالغاز (Heinze & Craft ١٩٥٣)، إلا أن الإنتاج الذاتى للإثيلين لا يبدأ بكميات محسوسة إلا مع بداية التلون، وهى المرحلة التى تتوافق مع بداية الكلايمكتريك respiratory climacteric، كما تعد الطماطم من الثمار التى يقل إنتاجها من الإثيلين بوجه عام

وقد حل الإثيلون Ethephon فى وقت سابق محل الإثيلين فى إنضاج الطماطم صناعياً، وهو منظم نمو يتحلل داخل الأنسجة النباتية، وينطلق منه غاز الإثيلين. فوجد مثلاً أن غمر ثمار الطماطم الخضراء مكتملة التكوين فى محلول إثيلون بتركيز ١٠٠٠٠ جزء فى المليون أدى إلى إسراع تلون الثمار (Massey & Chase ١٩٧١). كما وجد أن غمس ثمار الطماطم الخضراء الناضجة فى محلول إثيلون بتركيز ١٠٠٠ جزء فى المليون، أو رشها بنفس المحلول، ثم تخزينها فى حرارة ١٣°م، أو ١٥°م، أو ٢٠°م لمدة ١٣ يوماً أدى إلى إسراع التلون فى جميع المعاملات، خاصة فى درجة الحرارة العالية (Sims & Kasmire ١٩٧٢). هذا .. إلا أنه لا يُسمح - حالياً - بالمعاملة بالإثيلون بعد الحصاد

إن نضج ثمار الطماطم يُستحث - طبيعياً - بالإثيلين الذى تنتجه، إلا إنه تجرى - على النطاق التجارى - معاملة ثمار الطماطم الخضراء الناضجة بالإثيلين لإسراع نضجها، حيث تعرض للغاز بتركيز ١٠٠-١٥٠ جزءاً فى المليون لمدة ٢٤-٧٢ ساعة على حرارة ٢٠-٢٥°م، مع ٨٥٪-٩٥٪ رطوبة نسبية. يُطلق الإثيلين فى غرف محكمة الغلق لا يتسرب منها الهواء هذا ولا تجرى هذه المعاملة مع أى ثمار بدأت - فعلاً - فى التلون

ويجب أن تتراوح الحرارة خلال فترة الإنضاج الصناعي ما بين 13°م للثمار التي بدأت في التلون، و 21°م للثمار الخضراء الناضجة وتؤدي المعاملة بالإيثيلين إلى سرعة تحلل الكلوروفيل، وتكوين الليكوبين، وزيادة تجانس اللون، وإسراع مرحلة الكلايمكترك، وزيادة محتوى الثمار من فيتامين ج.

التخزين

التخزين في الحرارة المنخفضة

تتراوح الحرارة المناسبة لتخزين ثمار الطماطم بين 7°م درجات مئوية للثمار الحمراء إلى 15°م للثمار الخضراء مكتملة التكوين، فتتخفض درجة الحرارة المناسبة للتخزين تدريجياً مع ازدياد نضج الثمار. ويجب أن تكون الرطوبة النسبية عالية، وأن يُحتفظ بها في حدود $90\% - 95\%$ لمنع فقد الماء من الثمار. يمكن في هذه الظروف حفظ الثمار الحمراء بحالة جيدة لمدة ١٠ أيام، وتتلون الثمار الخضراء في خلال ٣٠ يوماً وهي بحالة جيدة. وتنخفض مدة بقاء الثمار المخزونة بحالة جيدة فيما بين هذه الحدود حسب درجة نضجها عند بداية التخزين. وتزداد سرعة نضج ثمار الطماطم بارتفاع الحرارة حتى 21°م ، بينما تتدهور بسرعة بارتفاع درجة الحرارة عن ذلك، ولا تتلون بصورة جيدة عند ارتفاع الحرارة إلى 29°م ، أو أعلى من ذلك.

وبينما تخزن الثمار الحمراء الناضجة بعد ذلك في غرف باردة لا تقل حرارتها عن 10°م ، فإن الثمار الخضراء المكتملة التكوين تُعامل بوحدة من أربع طرق - حسب الرغبة - كما يلي:

- ١ - إنضاجها سريعاً بالمعاملة بالإيثيلين في غرف مغلقة لمدة ٢٤-٤٨ ساعة على $20-25^{\circ}\text{م}$ قبل شحنها لتأبين سرعة وتجانس نضجها
- ٢ - إنضاجها سريعاً طبيعياً بحفظها على حرارة $18-21^{\circ}\text{م}$.
- ٣ - إنضاجها ببطء على حرارة $14-16^{\circ}\text{م}$.
- ٤ - تأخذ إنضاجها لمدة أسبوعين بحفظها على حرارة 13°م قبل إنضاجها بعد ذلك

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية التداويل والتخزين والتصدير

على حرارة ١٨-٢١°م، علما بأن حفظها لأكثر من أسبوعين على حرارة ١٣°م يعرضها للإصابة بأضرار البرودة، وتزداد إصابتها بالأعقان، وتفشل في تكوينها اللون أحمر قان (عن Le Strange وآخرين ٢٠٠٠)

لا يمكن تخزين الثمار الخضراء المكملة التكوين بنجاح في الحرارة التي تؤخر النضج، وإذا ما خزنت تلك الثمار لمدة أسبوعين أو أكثر على حرارة ١٣°م فإنها قد تتعرض للتحلل غير الطبيعي، وقد لا تتلون بشكل جيد وتتراوح الحرارة المثلى لتخزين الثمار الخضراء المكملة التكوين بين ١٨، و ٢١°م كذلك فإن الطماطم لا تتلون بشكل جيد في حرارة تزيد عن ٢٧°م ويناسب المدى الحرارى ١٤-١٦°م إبطاء النضج دون أن يتكون تحلل غير طبيعى وفى هذا المدى نجد أن الثمار الخضراء المكملة التكوين يمكن أن تتلون بصورة مناسبة لتعبئتها للعرض بالأسواق فى خلال ٧-١٤ يوماً

وتتعرض الثمار التي تحفظ في حرارة تقل عن ١٠°م للإصابة بالألترناريا خلال فترة تلوونها بعد التخزين، وتكون الإصابة بالألترناريا شديدة عند تعرض الثمار لمدة ٦ أيام وهى على حرارة الصفر المئوى، أو لمدة ٩ أيام على حرارة ٤°م كذلك فإن نسبة كبيرة من الثمار التي تتعرض لحرارة تقل عن ١٠°م لمدة أسبوع قبل الحصاد قد تظهر بها إصابة الألترناريا بعد الحصاد حتى ولو خزنت في حرارة مناسبة.

كذلك فإن أضرار البرودة يمكن أن تظهر على ثمار الطماطم التي تتعرض - قبل الحصاد - لحرارة تقل عن ١٥°م لمدة تزيد عن ١٥ يوماً خلال الأسبوع السابق للحصاد، وتزداد شدة الإصابة بزيادة فترة التعرض للحرارة المنخفضة

يفضل أن يكون تبريد الطماطم فى حجرات التخزين المبردة room cooling التي تخزن فيها مباشرة، وأفضل حرارة للتخزين هى ١٤-١٥°م للثمار الخضراء المكملة التكوين، و ٩-١٠°م للثمار الوردية اللون، و ٧-١٠°م للثمار الحمراء الصلبة، علماً بأن الفترة المتوقعة لاحتفاظ الثمار بجودتها هى ٢١-٢٨ يوماً بالنسبة للثمار الخضراء المكملة التكوين، و ٧-١٤ يوماً بالنسبة للثمار الوردية اللون، و ٣-٥ أيام بالنسبة للثمار الحمراء

الفصل الأول الطماطم

الصلبة، وذلك إذا ما كان التخزين فى الحرارة الموصى بها، مع ٩٠٪-٩٥٪ رطوبة نسبية.

هذا . ويمكن حفظ الثمار التى وصلت إلى مرحلة ٦٠٪-٩٠٪ تلوين لمدة أسبوع على ١٠°م، ولكن حفظها لفترة أطول من ذلك على تلك الدرجة قد يؤثر سلبياً على جودتها أثناء عرضها للبيع. كذلك فإن حفظ ثمار الطماطم المكتملة النضج على حرارة تقل عن ٤°م لفترة طويلة يفقدها لونها الجيد ويؤثر سلبياً على صلابتها وجودتها

ويتعين - دائماً - إنضاج الثمار الخضراء المكتملة التكوين قبل محاولة تخزينها فى الحرارة المنخفضة.

ويؤدى تخزين ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين لعدة أسابيع على ١٣°م إلى تعفنها وعدم نضجها بصورة مناسبة، وأفضل حرارة لنضجها هى ١٨-٢١°م مع ٩٠٪-٩٥٪ رطوبة نسبية وفى حرارة تزيد عن ٢٧°م فإنها تنضج، ولكنها لا تكون فى أفضل نوعية أكلية هذا بينما يمكن إبطاء نضج الثمار الخضراء المكتملة التكوين وتخزينها لأطول فترة ممكنة بتعريضها - كما أسلفنا - لحرارة ١٤-١٥°م.

هذا ويجب عدم إطالة فترة تخزين الثمار الوردية على ٩-١٠°م عن أسبوعين لأن ذلك يترتب عليه قصر فترة الصلاحية للعرض للبيع فى محلات السوبر ماركت. وتجدر الإشارة إلى أن تخزين ثمار الطماطم الوردية أو الحمراء فى حرارة أكثر انخفاضاً (مثل ٤°م) بهدف زيادة فترة تخزينها يترتب عليه فقدانها للون الجيد، ولصلابتها، ولطعمها أيضاً (جامعة بورديو Purdue - الإنترنت - ٢٠٠٧).

وقد قارن Agar وآخرون (١٩٩٤) فترة الصلاحية للتخزين للثمار التى حصدت وهى خضراء مكتملة التكوين، أو وهى فى مرحلة النضج الوردى، بالثمار التى حصدت وهى حمراء مكتملة التكوين، وذلك فى ثلاثة هجن اختلفت فى كونها إما طبيعية النضج، وإما تحمل جين مثبط النضج pin، أو جين عدم النضج nor، مع تخزين الثمار الخضراء أو الوردية فى حرارة ١٠°م ورطوبة نسبية ٨٥٪-٩٠٪، والثمار الحمراء فى حرارة ٢٠°م.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية. التداول والتخزين والتصدير

كانت الثمار التي تحمل الجين rin أكثر الثمار صلابة وأعلامها في الحموضة المعاييرة، ولكنها كانت أقل الثمار في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية، بينما كانت الثمار التي تحمل الجين nor أكثرها قدرة على التخزين. وقد بلغت فترة صلاحية الثمار الحمراء - الطبيعية النضج - للتخزين يومين، بينما بلغت فترة التخزين ٤ أيام لتلك التي تحمل الجين rin، و ٦ أيام لتلك التي تحمل الجين nor وبالمقارنة .. بلغت فترة صلاحية الثمار الوردية للتخزين ٨، و ١٢، و ١٦ يوماً للطرز الثلاثة، على التوالي وأمكن تخزين الثمار الخضراء مكتملة التكوين التي تنضج طبيعياً، وتلك التي تحمل الجين rin لمدة وصلت إلى ٣٠ يوماً

وتتحدد فترة صلاحية الطماطم الشيرى (الكريزية) للتخزين بانفصال الثمار عن محور العنقود rachis، وليس بالتدهور في الثمار ذاتها، وتعرف منطقتين يمكن أن تتكون فيهما طبقة انفصال ويحدث الانفصال، هما عند المفصل joint في منتصف عنق الثمرة، وعند اتصال العنق بالثمرة. وعادة . يحدث الانفصال عند المفصل شتاءً، بينما يحدث الانفصال عند اتصال العنق بالثمرة صيفاً ويؤدى بقاء العناقيد في رطوبة نسبية منخفضة بعد الحصاد إلى فقدانها للرطوبة، وعندما تفقد العناقيد ١٠٪ من رطوبتها، فإن وزن محور العناقيد يكون قد فقد ٧٥٪ من وزنه الأصلي، ويزداد معه الانفصال عند مكان اتصال العنق بالثمرة وبالمقارنة فإن بقاء العناقيد في رطوبة نسبية عالية يحمى الثمار من الانفصال، وعندما يحدث ذلك فإنه يكون عند المفصل (Dvir وآخرون ٢٠٠٩)

أضرار البرودة

أعراض أضرار البرودة والعوامل المؤثرة على شدة ظهورها

تتعرض الطماطم للإصابة بأضرار البرودة إذا خزنت - وهي خضراء مكتملة التكوين - على ١٠°م لمدة تزيد عن أسبوعين أو على ٥°م لمدة تزيد عن أسبوع واحد ومن أهم أعراض أضرار البرودة فشل الثمار في النضج وفي اللون الكامل، مع ظهور مناطق غير ملونة (blotchy) بها، ولا يكون طعمها جيداً، وتفقد صلابتها مبكراً، ويظهر بها نقر

الفصل الأول الطماطم

سطحية، مع تلون البذور باللون البنى وزيادة قابلية الثمار للإصابة بالأعفان، وخاصة العفن الأسود الألترنارى

وبينما تُصاب ثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين بأضرار البرودة إذا خُزنت على حرارة تقل عن ١٠°م، فإن الثمار تصبح أقل تعرضاً للإصابة بتلك الأعراض كلما ازدادت نضجاً؛ فالثمار الوردية اللون يمكن تخزينها على ٥°م لمدة ٤ أيام دون توقع أية مشاكل، ثم استكمال نضجها على ١٣-١٥°م فى خلال يوم واحد إلى أربعة أيام.

تظهر أعراض أضرار البرودة على الثمار التى تعرضت للحرارة المنخفضة الأقل من تلك التى يمكنها تحملها - حسب درجة نضجها - حتى ولو تعرضت لحرارة معتدلة بعد ذلك.

وتزداد شدة هذه الأضرار بزيادة الانخفاض فى درجة الحرارة، وبزيادة فترة تعرض الثمار للحرارة المنخفضة، سواء أتم ذلك قبل الحصاد، أم بعده، ويكون تأثير التعرض للحرارة المنخفضة متجمعاً. وتظهر أضرار البرودة حتى ولو نقلت الثمار من المخازن ذات الحرارة المنخفضة إلى حرارة أعلى، ويكون ظهور الأعراض أوضح بعد إخراج الثمار من المخازن كما تحدث أضرار البرودة حتى إذا تعرضت الثمار لدرجة الحرارة المنخفضة قبل الحصاد ولا يجدى تخزين هذه الثمار - فى المجال الحرارى الملائم - فى وقف إصابتها بهذه الأضرار (Craft & Heinze ١٩٥٤، و Lutz & Hardenburg ١٩٦٨).

وتزداد فرصة تعرض ثمار الطماطم المخزنة فى حرارة ٧°م لأضرار البرودة كلما ازدادت فترة تعرضها لحرارة تقل عن ١٥,٦°م خلال الأسبوع السابق للحصاد (عن Dodds وآخرين ١٩٩٦). وكانت أقل حرارة أمكن تخزين ثمار الطماطم عليها مع نضجها بصورة متجانسة هي ٩°م (Hobson ١٩٨٧).

وتقل فرصة إصابة ثمار الطماطم بأضرار البرودة كلما تقدمت فى النضج، فالثمار الحمراء أقل حساسية لأضرار البرودة من الثمار الوردية، والوردية أقل من تلك التى فى بداية لتلوين وهكذا

وقد افترض Auto & Bramlage (١٩٨٦) أن نقص حساسية ثمار الطماطم للإصابة بأضرار البرودة بعد بداية الكلايمكتريك ربما كان مرتبطاً بزيادة فى لزوجة الأغشية الخلوية

وقد وجد Bergevin وآخرون (١٩٩٣) أن ثمار الطماطم الخضراء مكتملة التكوين المخزنة بأعناقها فى حرارة درجة واحدة مئوية - تصاب بأضرار البرودة بدرجة أكبر من إصابة الثمار المائلة - المخزنة تحت نفس الظروف - بدون أعناقها ظهرت أعراض أضرار البرودة على الثمار المخزنة بأعناقها فى صورة انكماش وتلون سطحى للثمار بعد ٨ أيام أو أكثر من تعرضها للحرارة المنخفضة، ولم تنضج هذه الثمار طبيعياً عندما نقلت بعد ذلك إلى حرارة ٢٠°م أما الثمار التى خزنت بدون أعناقها فإنها لم تصب بشدة بأضرار البرودة، كما أنها أكملت نضجها بصورة طبيعية بعدما نقلت إلى حرارة ٢٠°م. وقد وجد الباحثون أن تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الداخلى للثمار التى خزنت بدون أعناقها - بعد نقلها إلى حرارة ٢٠°م - كان أقل جوهرياً من تركيزه فى الثمار التى خزنت بأعناقها، وتبين أن موقع أثر العنق المزال بالثمرة هياً منفذاً ملائماً لتبادل الغازات بين داخل الثمرة وخارجها، الأمر الذى لم يحدث من خلال جلد الثمرة وقد استنتج الباحثون من ذلك أن الهواء الداخلى للثمار التى تخزن بأعناقها يحتوى على تركيز مرتفع من غاز ثانى أكسيد الكربون - بعد نقلها إلى ٢٠°م - وأن ذلك يحفز ظهور أعراض البرودة عليها.

وتنقسم أضرار البرودة فى الطماطم - حسب شدة الضرر الحاد - إلى المراحل التالية:

١ - أضرار طفيفة، وفيها يقتصر الضرر على فقد الثمار لصلابتها، مع عدم انتظام التلون

٢ - أضرار متوسطة، وفيها تظهر بالثمرة بقع مائية النظهر، وتبرقشات صفراء فى خلفية حمراء، ويكون سطحها غير منتظم أو غير أملس

٣ - أضرار شديدة، وفيها تظهر بالثمرة بقع كبيرة خضراء صلبة في خلفية حمراء، مع انهيار في الخلايا يترتب عليه عدم انتظام سطح الثمرة، وفقد الثمرة لرطوبتها وذبولها (عن Jackman وآخرين ١٩٩٠)

وقد جرت العادة على قياس شدة الضرر الحادث من جراء التعرض للحرارة المنخفضة بقياس التغير في درجة التوصيل الكهربائي لراشح خلايا الأنسجة الثمرية (والذي يحدث نتيجة للتسرب الأيوني الذي يصاحب أضرار البرودة)، ولكن Côte وآخرين (١٩٩٣) أوضحوا أن هذه الطريقة لا تعطى - دائماً - نتائج يمكن الاعتماد عليها

طبيعة أضرار البرودة

من المعتقد أن أعراض أضرار البرودة تنشأ نتيجة للأضرار التي تحدثها الحرارة المنخفضة (صفر إلى -10°C) في كل من الأغشية الخلوية المحيطة بالبروتوبلازم plasma membrane، والمبطنة له (المحيطة بالفجوات العصارية) tonoplast، وذلك في خلايا الجدر الثمرية pericarp؛ الأمر الذي ينعكس على صورة زيادة في التسرب الأيوني من تلك الثمار.

كذلك تضر الحرارة المنخفضة بالأغشية البلازمية للبلاستيدات الخضراء في ثمار الطماطم الخضراء مكتملة التكوين؛ الأمر الذي يتعارض مع تحولها إلى بلاستيدات ملونة بعد ذلك.

كما صاحب ظهور أعراض البرودة (بعد أيام من نقل الثمار إلى حرارة -2°C)، بعد تخزينها لمدة ٢٠ يوماً في حرارة 5°C) حدوث انفصال في لبييدات الغشاء الخلوي للميكروسومات (Sharom وآخرون ١٩٩٤).

ويستدل من دراسات L. Heureux وآخرين (١٩٩٣) حدوث زيادة جوهريّة في نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة خلال فترة تعريض ثمار الطماطم للحرارة المنخفضة (-1°C)، مع عودة جزئية فقط لحالة التشبع بعد نقل الثمار إلى حرارة مرتفعة

(٢٠م)، الأمر الذى قد يتسبب فى عدم ثبات الأغشية الخلوية وعدم أدائها لوظائفها بصورة طبيعية بعد نقل الثمار إلى الحرارة المرتفعة لاستكمال نضجها

ويذكر Whitaker (١٩٩٤) أن الفوسفوليبيدات phospholipids - التى توجد فى الأغشية الخلوية - لا تتأثر بالحرارة المنخفضة، بينما تتغير الاستيروولات sterols أثناء التعرض للبرودة وبعد التعرض للدق؛ الأمر الذى قد يؤثر على وظائف الأغشية الخلوية كما حصل Bergevin وآخرون (١٩٩٣) على نتائج مماثلة فيما يتعلق بعدم حدوث تغيرات مؤثرة فى الفوسفوليبيدات من جراء التعريض للبرودة، ولكنهم أرجعوا أضرار البرودة إلى الفقد الذى تحدثه الحرارة المنخفضة فى الـ galactohpid و polyunsaturated fatty acids.

هذا . ويصاحب ظهور أضرار البرودة فى الطماطم حدوث انهيار تدريجى لخلايا الطبقات العميقة من الجدار الثمرى الخارجى، مع حدوث خفض فى نشاط أيون النضج لكل من السكريات (الجلوكوز والفراكتوز والسكروز)، والأحماض العضوية (الطرطريك tartaric والماليك malic والأسكوربيك ascorbic والصكك succinic)، ومضادات الأكسدة الفينول والليكوبين، مع حدوث توقف لتمثيل الكاروتينات، هذا بينما يزداد مستوى الجلوتاثيون glutathione (Gómez وآخرون ٢٠٠٩).

التغيرات فى النكهة أثناء التخزين العادى

أوضحت دراسات Stern وآخرون (١٩٩٤) أن نحو ٥٠٪ فقط من المركبات المتطايرة التى أمكن عزلها من ثمار الطماطم كانت تركيزاتها عالية بالقدر الذى يمكن من الإسهام فى إعطاء الطماطم نكهتها العامة المميزة. وقد كان هناك تفاعل بين هذه المركبات - باستثناء المركب ميثيل سيليكيت methyl silicate - ودرجة الحرارة التى خزنت فيها الثمار، حيث انخفض إنتاج المركبات المتطايرة بشدة مع انخفاض حرارة تخزين الثمار إلى أقل من ١٠م. ولكن اعتمد المستوى النهائى للمواد المتطايرة المنتجة على درجة الحرارة النهائية لتي أنضجت عليها الثمار فعندما رفعت حرارة الإنضاج النهائية إلى ٢٠م للثمار التى

الفصل الأول: الطماطم

خزنت في البداية في ١٠°م أو أقل من ذلك - أنتجت المركبات التطايرية بمستويات مماثلة لمستويات إنتاجها في الثمار التي خزنت في حرارة أعلى من ١٠°م وعندما كان اكتمال النضج في حرارة أقل من ١٠°م انخفض إنتاج المركبات التطايرية.

وأدى تخزين ثمار الطماطم الحمراء على حرارة ١٠°م - مقارنة بحرارة ٢٠°م - إلى إحداث تغيرات في مستويات المركبات التطايرية: 3-methylbutanol، و linalool، و guaiacol، و hexanol، و trans-2-hexenal، و trans-3-hexenol. وقد ارتبطت تلك التغيرات بأخرى سلبية في طعم الثمار في اختبارات الذوق (De León Sánchez وآخرون ٢٠٠٩).

وقد دُرست التغيرات في مكونات ثمار ثلاثة أصناف من الطماطم من المواد التطايرية المسؤولة عن النكهة، وذلك أثناء تخزينها - بعد حصادها وهي حمراء - لمدة ٢١ يوماً على ٢٠°م، مع ٥٥٪ رطوبة نسبية، ووجد ما يلي:

١ - ازداد تركيز ثمانى مركبات في جميع الأصناف، وهي:

hexanal	(E)-2-heptenal
(E,E)-2,4-decadienal	6-methyl-5-hepten-2-one
geranylacetone	2-isobutylthiazole
1-nitro-2-phenylethane	geranial

٢ - انخفض تركيز المركب المتطاير methyl salicylate في كل الأصناف.

٣ - انخفض تركيز المركب (Z)-3-hexenal في الصنفين Mickey، و Venessa.

٤ - انخفض تركيز المركب (E)-2-hexenal في الصنف Venessa بعد ١٠ أيام من التخزين.

٥ - ازداد "طعم الطماطم" مع التخزين (Krumbein وآخرون ٢٠٠٤).

التخزين في الجو المعدل والجو المتحكم في مكوناته

على الرغم من نجاح تخزين الطماطم في الجو المعدل إلا أن هذه الطريقة لم تطبق -

بعد - على النطاق التجارى، لعدم وجود مبررات للحاجة إليها حتى الآن، ولأن لها بعض المساوىء التى تترتب على عدم الدقة فى تنفيذها.

ومن بين الحركات العديدة التى أجريتها هذه المجال، نطرح ما يلى:

• كان أفضل جو معدل لزيادة فترة احتفاظ ثمار الطماطم بقدرتها على التخزين هو الذى احتوى على ٣٪ أكسجين والباقي نيتروجين، حيث تلونت الثمار الخضراء مكتملة النمو - التى حُفظت فى هذا الجو لمدة ٦ أسابيع فى حرارة ١٢.٨°م - عندما نقلت إلى الهواء العادى فى حرارة ١٨.٣°م، وكان طعمها "مقبولاً". وقد بلغت نسبة الإصابة بالعفن فى هذه الثمار أقل من ٥٪، مقارنة بنسبة عفن بلغت أكثر من ٩٠٪ فى الثمار التى حفظت فى الهواء العادى.

• كان من الضرورى عدم تعريض الثمار المخزنة فى الجو المعدل للحرارة المنخفضة (التي تحدث معها أضرار البرودة)، لتجنب زيادة إصابتها بالأعفان.

• ازدادت فترة احتفاظ ثمار الطماطم - التى كانت فى كُلى من مرحلتى بداية التلوين أو اللون الوردى - بقدرتها على التخزين عندما حفظت فى جو معدل يحتوى على ٤٪-٨٪ أكسجين، و ١٪-٢٪ ثانى أكسيد كربون. وقد أدى نقص نسبة الأكسجين عن ٤٪، أو زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون عن ٤٪ إلى عدم انتظام نضج الثمار.

• أدى حفظ ثمار الطماطم فى جول معدل يحتوى على أكسجين بنسبة ١٠٪، أو ٣٪، أو ١٪ (والباقي نيتروجين) - فى حرارة ١٢.٨°م - إلى زيادة قدرتها على التخزين إلى ٦٢، و ٧٦، و ٨٧ يوماً على التوالى.

• احتفظت ثمار الطماطم التى خزنت فى جول معدل يحتوى على ٥٪ أكسجين، و ٥٪ ثانى أكسيد كربون بطعمها الجيد عن تلك التى خزنت فى ٣٪ أكسجين مع ٥٪ ثانى أكسيد كربون. وقد كان وجود ثانى أكسيد الكربون ضرورياً لتجنب فقد الثمار للونها الأحمر الزاهى

• تفيد تعبئة الثمار فى البوليثلين packaging polyethylene فى توفير جو معدل تنخفض فيه نسبة الأكسجين، وتزيد فيه نسبة ثانى أكسيد الكربون - بسبب تنفس

الفصل الأول الطماطم

الثمار - الأمر الذى يؤدى إلى تقليل أعفان الثمار، وإبطاء نضجها وطراوتها وفقدانها لרטوبتها، وزيادة فترة احتفاظها بجودتها أثناء التخزين، وبمحتواها من المواد الصلبة الذائبة التى تفقد تدريجياً بالتنفس. كذلك تؤدى التعبئة فى أغشية البوليثلين بسمك ١٠ ميكرونات إلى تقليل إصابة الثمار بأضرار البرودة وبالتشوهات السطحية فى لون الثمار (blemishes، أو red blotches)؛ بسبب سرعة التثام الجروح فى ظروف الرطوبة العالية المحيطة بالثمار التى تمنع كذلك فقد الرطوبة من الجلد، علماً بأن فقد الرطوبة من الجلد يعد العامل الرئيسى لظهور التشوهات اللونية السطحية (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

• يؤدى تعريض ثمار الطماطم الخضراء مكتملة التكوين لتركيز ٣٪-٥٪ من ثانى أكسيد الكربون - لمدة تتوقف على الصنف - إلى تأخير نضجها وعدم انتظامه، وفقدانها لصلابتها، وظهور بقع بنية عند طرفها الزمى. كما أن خفض نسبة الأكسجين فى هواء المخزن بهدف إبطاء نضج الثمار يؤثر كذلك على نوعية الثمار. ولكن هذه الأضرار لا تحدث إلا فى التركيزات المنخفضة كثيراً؛ فعندما يكون تركيز الأكسجين ٢٪ أو أقل، يكون نضج الثمار غير منتظم، ولا يكون طعمها مستساغاً، إلا أن التخزين فى الجو المعدل يساعد على إبطاء نضج الثمار، وفقد الكلوروفيل، وتمثيل الليكوبين، والصبغات الكاروتينية carotenoids، والزانتوفيلية xanthophylls. ويمكن لثمار الطماطم الخضراء المكتملة التكوين أن تخزن لمدة ٧ أسابيع فى هواء معدل حرارته ١٢,٨°م يحتوى على ٤٪ أكسجين، و ٢٪ ثانى أكسيد الكربون، و ٥٪ أول أكسيد الكربون. وتبقى الثمار بعد ذلك بحالة جيدة لمدة أسبوع واحد إلى أسبوعين فى حرارة ٢٠°م لحين استهلاكها. ويعمل أول أكسيد الكربون مع نسبة الأكسجين المنخفضة على خفض أو منع تعفن الثمار أثناء وجودها فى المخازن، دون التأثير على جودتها.

• ولقد وجد أن استعمال الأرجون argon كمكون رئيسى لجو التخزين (مع الأكسجين المنخفض) يقلل من النمو الميكروبي ويحافظ على جودة منتجات الخضر

• وقد تأخر نضج الطماطم الخضراء المكتملة التكوين وانخفض معدل إنتاجها

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

للإثيلين ومعدل تنفسها في جو يحتوى على ٣٪ أكسجين مع الأرجون، مقارنة بما حدث عندما كان النيتروجين هو المستخدم مع تركيز منخفض من الأكسجين (عن Jamie Saltveit & ٢٠٠٢).

• أدى تخزين الطماطم في هواء خالٍ من الأكسجين لمدة ٢٤ ساعة فقط إلى خفض عفن الثمار المحقونة صناعياً بالفطر *Botrytis cinerea*، وذلك دون التأثير على أى من صفات جودة الثمار هذا إلا أن إطالة فترة المعاملة بالهواء الخالي من الأكسجين إلى ٤٨ ساعة كانت لها تأثيرات سلبية على الجودة (Fallik وآخرون ٢٠٠٣).

• عندما خزنت ثمار الطماطم وهي في مرحلة النضج الوردى في عبوات من أغشية البولييثيلين بسبك ٢٠ أو ٥٠ ميكرون، أو البولي بروبيلين بسبك ٢٥ ميكرون، أو البولي فينيل كلورايد بسبك ١٠ ميكرون لمدة ٦٠ يوماً على ١٣ م، انخفض تركيز الأكسجين، بينما ازداد تركيز ثاني أكسيد الكربون خلال الأيام القليلة الأولى من التخزين، ليصل بعدها هواء العبوات إلى حالة توازن. ولقد أصبحت ثمار الكنترول التى لم تعبأ فى أى من تلك الأغشية زائدة النضج بعد ٣٠ يوماً من بداية التخزين، بينما تأخر تلون الثمار التى عبئت فى الأغشية - وخاصة أغشية البولييثيلين والبولي بروبيلين لأكثر من ٣٠ يوماً، وكانت الثمار مازالت صلبة بعد ٦٠ يوماً من التخزين، كما أظهرت أقل فقد فى الوزن وكانت الأعلى محتوى من المواد الصلبة الذائبة بعد ٦٠ يوماً من التخزين (Batu & Thompson ١٩٩٨).

• بينما أدى تخزين ثمار الطماطم فى ٣٪ أكسجين إلى تقليل إصابتها بالأعفان التى يسببها الفطرين *Rhizopus*، و *Alternaria*، فإن ذلك التركيز - وأقل منه - لم يكن له تأثير على نمو الفطرين فى البيئات الصناعية، بما يعنى أن انخفاض نسبة الأكسجين فى هواء المخزن يؤثر فى أنسجة الثمار ذاتها، بما يجعلها أكثر مقاومة للفطرين (Thompson ١٩٩٨).

• يحقق التخزين فى الجو المعدل مزايا أخرى، منها المساعدة فى خفض الآثار المتبقية

الفصل الأول. الطماطم

من المبيد أوكساميل (وهو مبيد حشائش ومبيد حشرى) فى ثمار الطماطم؛ حيث لا يُسمح بزيادة التركيز المتبقى من هذا المبيد فى ثمار الطماطم عن جزئين فى المليون فى الولايات المتحدة، وعن ٠.١ جزءاً فى المليون فى الطماطم المستوردة فى كندا وقد وجد McGarvey وآخرون (١٩٩٤) أن تركيز هذا المبيد ينخفض - سريعاً - فى ثمار الطماطم المخزنة فى حرارة ١٥°م فى جو معدل يتكون من ١.٥٪ أكسجيناً + ٨٩.٩٪ نيتروجيناً، أو ١.٥ أكسجيناً + ٤.٠٪ ثانى أكسيد كربون + ٩٤.٥٪ نيتروجيناً عما فى الثمار التى خزنت فى نفس درجة الحرارة ولكن فى الهواء العادى. وقد كان نضج الثمار أسرع فى الهواء العادى مما حدث فى معاملتى الهواء المتحكم فى نسب مكوناته.

الخلاصة

على الرغم من تباين الجو المعدل المناسب لثمار الطماطم فى مختلف درجات النضج، فإن ٣٪ أكسجين + ٢٪ ثانى أكسيد كربون يعد مناسباً بصورة عامة، حيث تحتفظ الثمار بجودتها لفترة أطول. فمثلاً... تحتفظ الثمار الخضراء المكتملة التكوين بجودتها لمدة ٦ أسابيع على حرارة ١٣°م فى جو يحتوى على ٣٪ أكسجين + ٩٧٪ نيتروجين، دون أن يظهر بها أى تغيرات غير مرغوب فيها فى المذاق. كذلك يساعد التخزين فى الجو المتحكم فيه فى تأخير ظهور الأعراض غير المرغوب فيها للأضرار الميكانيكية.

وبعد ظروفه الهواء المعتمده فيه المناسبة للطماطم كما يلي،

- ١- الطماطم الخضراء المكتملة التكوين. ٣٪ إلى ٥٪ أكسجين + ٢٪ إلى ٣٪ ثانى أكسيد كربون على حرارة ١٢-٢٠°م، والاستفادة تكون قليلة
- ٢- الطماطم الحمراء ٣٪ إلى ٥٪ أكسجين + ٣٪ إلى ٥٪ ثانى أكسيد كربون على حرارة ١٠-١٥°م، والاستفادة تكون متوسطة (Sargent & Moretti ٢٠٠٤).

التخزين تحت ضغط منخفض

يفيد تخزين جميع الثمار الكلايمكتيرية Climacteric Fruits تحت ضغط منخفض subatmospheric pressure (أو Hypobaric) فى إطالة فترة قدرتها على التخزين، ذلك

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

لأن الإثيلين الذى تنتجه هذه الثمار - وهو الذى يُسرّع إنضاجها - تتم إزالته أولاً بأول بسبب عملية التفريغ الجزئى الدائمة التى تتعرض لها الثمار المخزنة، كما أن عملية التفريغ تلك تُزيل - كذلك - الأكسجين مع الإثيلين، الأمر الذى يبطن إنتاج الثمار للإثيلين، لأن عملية إنتاج الإثيلين تحتاج إلى توفير الأكسجين، ويترتب على ذلك كله إبطاء نضج الثمار وزيادة فترة صلاحيتها للتخزين.

وكما أوضحنا فى حالة التخزين فى الجو المعدل، فإن الحاجة إلى تخزين الطماطم تحت تفريغ ليست لها مميزات اقتصادية للتطبيق تجارياً - بعد - على الرغم من نجاحها بحثياً.

ومن بين الدراسات التى أجريتها فى صلا الممال، مظهر ما لى (من Salunkhe & Desai، ١٩٨٤)،

• أمكن تخزين الطماطم لمدة ١٠٠ يوم تحت ضغط ١٠٢ مم زئبق إذا نقلت الثمار - بعد ذلك - إلى ضغط ٦٤٦ مم زئبق، وذلك فى حرارة ١٢,٨°م ورطوبة نسبية ٩٠٪ إلى ٩٥٪ وقد أدت المعاملة إلى تأخير فقد الكلوروفيل، وتثبيط تمثيل الليكوبين والبيتاكاروتين، وتحلل النشا، وتكوين السكريات

• ازدادت قدرة ثمار الطماطم على التخزين بحفظها تحت ضغط منخفض يتراوح بين ٦٥٨ و ٧٠٩ مم زئبق.

• أمكن حفظ ثمار الطماطم التى فى طور بداية التلوين لمدة ٤ أسابيع تحت تفريغ جزئى دون أن تتقدم فى النضج إلى أكثر من اللون الوردى الفاتح، الأمر الذى يمكن معه شحن الثمار وهى فى هذه المرحلة من النضج، حيث تكون صفاتها الأكلية أفضل من الثمار التى تحصد وهى خضراء مكتملة التكوين

التصدير

يزداد الطلب على الطماطم المصرية فى الفترات التى يقل فيها الإنتاج فى الدول المستوردة. وهى الفترة من ديسمبر إلى مارس بالنسبة للدول الأوروبية، والفترة من يونية

الفصل الأول الطماطم

إلى أكتوبر بالنسبة للدول العربية الخليجية، حيث يقتصر إنتاج الطماطم على الزراعات المحمية خلال الفترات المشار إليها في هذه الدول وبالرغم من ارتفاع إنتاجية الزراعات المحمية، إلا أنها لا تكون في وضع منافس للمحصول المستورد، وذلك نظراً لارتفاع أسعار طماطم البيوت المحمية بالنسبة لمحصول الحقول المكشوفة

وقد أصبحت الطماطم الكريزية من المنتجات المطلوبة بكثرة وبأسعار مجزية، وخاصة في أسواق أوروبا الغربية.

تُصنَّر الطماطم العادية إلى الدول الأوروبية وهي خضراء في مرحلة اكتمال النمو - حيث تعرف بظهور نجمة بيضاء على الطرف الزهري للثمرة - أو في طور بدء التلون الذي يظهر فيه التلون على مساحة لا تتجاوز ١٠٪ من سطح الثمرة. كما تصدر الطماطم إلى الأسواق العربية وهي في طور التحول الذي يظهر فيه التلون على مساحة تزيد عن ١٠٪، ولا تتجاوز ٣٠٪ من سطح الثمرة.

يتطلب القادون المصري توفر الشروط التالية بالنسبة للطماطم المستوردة:

- ١- أن تكون الثمار كروية ملساء، أو قليلة التفصيص، وألا يقل قطر ثمار الأصناف غير الكريزية عن ٤ سم.
- ٢- ألا تكون الثمار ذابلة، أو لينة، أو متقدمة في النضج.
- ٣- ألا يزيد طول عنق الثمرة عن مستوى أكتافها، ويجوز تصدير الطماطم بدون عنق بشرط أن يكون موضع العنق سليماً.
- ٤- أن تكون الثمار من نفس الصنف، وأن تتماثل ثمار كل عبوة في الحجم ودرجة التلون.

٥- ألا يزيد التلون عن ١٠٪-٢٥٪ من سطح الثمرة بالنسبة للدول البعيدة، مثل: المملكة المتحدة وهولندا، و ٢٥٪-٥٠٪ بالنسبة للدول المتوسطة البعد، مثل: إيطاليا وإسبانيا، و ٧٥٪-٩٠٪ بالنسبة للدول القريبة، مثل: المملكة العربية السعودية وتركيا ويسمح بالحدود العليا للتلون عند التصدير خلال الفترة من أول نوفمبر إلى آخر مارس،

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية التداول والتخزين والتصدير

بينما تشترط الحدود الدنيا للتولين عند التصدير خلال الفترة من أول أبريل إلى آخر أكتوبر

٦ - تقسم الطماطم إلى درجتين كالتالى .

- أ - الدرجة الأولى : وهى ما لا تزيد فيها نسبة الثمار التى بها عيوب فسيولوجية ، أو آثار جافة لإصابات مرضية أو حشرية عن ٥٠٪ من الوزن فى العبوة الواحدة
- ب - الدرجة الثانية : وهى ما لا تزيد فيها نسبة الثمار المصابة بالعيوب السابقة الذكر عن ١٠٪ من الوزن فى العبوة الواحدة

٧ - تعبأ الثمار فى صناديق سليمة ، ونظيفة ، وجافة مصنوعة من الكرتون بأبعاد حوالى ٣٨ سم طولاً × ٢٨ سم عرضاً × ١٥ سم ارتفاعاً ويتراوح الوزن الصافى للعبوة عادة من ٣ - ٨ كجم

٨ - قد تبطن العبوات بورق الكرفت ، أو البارشمنت

٩ - تعبأ الطماطم إما ملفوفة أو بدون لف ، وتوضع بطريقة منتظمة ، بحيث تملأ العبوة تماماً ، دون أن تكون مضغوطة ، أو ترتب فى طبقات مع فصل كل طبقة عن الأخرى بقصاصات الورق ، أو بورق الزبدة

١٠ - توضع على كل عبوة البيانات الخاصة بها ، وهى كلمة "طماطم" ، والدرجة ، والعلامة التجارية ، واسم المصدر وعنوانه ، ووزن العبوة الصافى

الطماطم المجهزة للمستهلك (الجاهزة للأكل)

تجهز الطماطم للمستهلك fresh-cut وهى بلون أحمر متجانس وصلبة ، حيث تُقدم إما على صورة شرائح ، وإما مقطعة إلى مكعبات صغيرة . يجب ألا تكون الشرائح فاقدة للجل الذى يوجد فى حجيرات الثمرة حول البذور ويستخدم صنف الطماطم Roma - غالباً - فى تجهيز مكعبات الطماطم . يجب أن تكون الثمار المستعملة صلبة وذات وجوات بذرية صغيرة تغسل الطماطم بماء مكلور قبل تقطيعها ، ثم بعد تجهيز المكعبات الصغيرة تغسل مرة أخرى فى تيار من الماء المكلور بتركيز ١٠٠ جزء فى المليون من الكلور . ينصف إليه كلوريد الكالسيوم بتركيز ٢٥٠٪ . أما بالنسبة للطماطم التى تقطع

الفصل الأول الطماطم

إلى شرائح فإن الثمار الكاملة تغمس أولاً في ماء مكلور بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون لمدة دقيقة واحدة قبل تقطيعها.

وعلى الرغم من أن الطماطم تعد حساسة للبرودة إلا أنها يمكن أن تخزن على صفر-٥°م لأيام قليلة قبل تجهيزها لتأخير طرواتها. ويستفاد من جو يحتوى على ٣٪ أكسجين + ٣٪ ثانى أكسيد كربون فى تأخير نضج الثمار وفقد محتواها من المواد الصلبة الذائبة والحموضة المعاكسة.

وتفقد الطماطم المجهزة على صورة مكعبات جودتها بعدة مظاهر، منها: شفافية الأنسجة، وتغيرات القوام، والطراوة، والمظهر المائى. أما شرائح الطماطم فإنها - إلى جانب ما تقدم من مظاهر فقد الجودة - قد تقل جودتها - كذلك - بإنبات البذور وفقد الجل. وعلى الرغم من أن حموضة ثمار الطماطم تثبط النمو الميكروبي، إلا أن نمو الخمائر وفطريات الأعفان يقلل من جودتها أثناء التخزين.

ويتراوح معدل تنفس الطماطم المجهزة بين ٥٧,٦، و ٩٣,٦ ملليجرام ثانى أكسيد كربون لكل كيلو جرام واحد من الطماطم فى الساعة على ٢٠°م.

وتزداد جودة شرائح الطماطم المخزنة على ٥°م - فى جو معدل - عندما يستعمل فى إنتاجها ملش من الغطاء النباتى الحى للتربة (من الـ hairy vetch، وهو: *Vicia villosa* Roth) مقارنة بملش البولى إيثيلين الأسود، وعندما لا ترش بالمبيدات أو يستعمل معها برنامج للتنبؤ بالأوبئة لتحديد مواعيد الرش بالمبيدات (مثل TOM-CAST) مقارنة بالرش الأسبوعى. وقد ظهرت تلك الجودة فى صورة احتفاظ الشرائح بصلابتها لمدة ١٢ يوماً، وقلة ظهور المساحات المبتلة water-soaked areas (التي هى أحد مظاهر أضرار البرودة)، وضعف التسرب الأيونى منها حتى عندما حُفظت على ٢٠°م لمدة ٦ ساعات (Hong وآخرون ٢٠٠٠).

وقد دُرس تأثير معاملة شرائح ثمار طماطم حمراء فاتحة اللون بهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز ٢٦ ٪، و ١,٠٥ ٪ لمدة صفر، و ٢٠، و ٦٠ دقيقة على تحولات النضج فيها

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية: التداول والتخزين والتصدير

أثناء تخزينها - بعد المعاملة - على ٥°م فى هواء معدل أدت جميع المعاملات إلى خفض صلابة الشرائح مقارنة بصلابة شرائح ثمار معاملة الكنترول. وبعد ١٢ يوماً من التخزين كانت صلابة شرائح الثمار التى عوملت بتركيز ١٠٥٪ هيبوكلوريت الصوديوم لمدة ٦٠ ثانية أقل من ٥٠٪ من صلابة شرائح الثمار التى عوملت بالماء، وأقل - كذلك - من صلابة شرائح ثمار المعاملات الأخرى. ويعنى ذلك أن التطهير السطحى لثمار الطماطم بهيبوكلوريت الصوديوم قد يقود إلى تحورات فسيولوجية وبيوكيميائية فى سلوك الثمار (Hong & Gross ١٩٩٨).

وحافظت شرائح الطماطم على جودتها عندما عوملت الثمار - قبل تقطيعها إلى شرائح - بماء مكلور يحتوى على ٠,٧ مللى مول كلورين مع ٠,٠٩ مللى مول كلوريد الكالسيوم أو بدونه، ثم حُفظت الشرائح على ٢°م فى جو معدل، ولكن معاملة كلوريد الكالسيوم لم تكن ضرورية إلا إذا كان حفظ الشرائح فى أغشية مثقبة (Artés وآخرون ١٩٩٩).

وعلى الرغم من أن أعداد *Salmonella* spp ازداد على ثمار الطماطم مع قصر فترة الغمر فى الماء المكلور بتركيز ١٥٠ جزء فى المليون على pH قدره ٦,٥، إلا أن تلك العملية لم تؤد إلى التخلص التام من البكتيريا حتى على السطح الناعم للثمار غير المجروحة؛ هذا فضلاً عن أن ندبة ساق الثمرة لم تطهر جيداً بهيبوكلوريت الصوديوم (Felkey وآخرون ٢٠٠٦).

تنتج شرائح الطماطم المجهزة للمستهلك *fresh-cut* - والمحافظة على ٥°م - الإيثيلين، الذى يتراكم إن لم توجد وسيلة للتهوية وأدت المعاملة بالحشوات المعتصة للإيثيلين *ethylene absorbent pads*، أو بالـ *1-aminoethoxyvinylglycine* إلى خفض تركيز الإيثيلين بشدة، مع زيادة فى إصابة الشرائح بأضرار البرودة التى تمثلت فى ظهور مناطق مائية النظم بها.

وعندما عوملت شرائح الطماطم أثناء تخزينها بالـ AVG (وهو 1-

aminoethoxyvinylglycine) انخفض انتاجها من الإثيلين عن المعدلات العادية في الشرائح التي لم تعامل بالـ AVG، وصاحبت المعاملة بالـ AVG زيادة خمسة أضعاف في أضرار البرودة مقارنة بما حدث في شرائح الكنترول. وبالمقارنة .. ظهر عند معاملة الثمار بالإثيلين قبل عمل الشرائح مباشرة أو بعد تجهيزها بثلاثة أيام أن معدل إنتاج الإثيلين فيها ارتبط ارتباطاً سالباً بأضرار البرودة (Hong & Gross ٢٠٠٠).

وقد انخفضت صلابة الثمار الطفريّة rin، و nor قليلاً خلال ٩ أيام بعد معاملتها بالإثيلين، ولكن بدرجة أقل كثيراً من الثمار العادية التي عوملت بالمثل، ومع استمرار صلابة الثمار الـ nor بدرجة أعلى من الـ rin. هذا .. إلا أن شرائح ثمار الـ nor والـ rin التي سبقَت معاملتها بالإثيلين فقدت صلابتها بسرعة أكبر عن الثمار الكاملة، وحدث ذلك بدرجة متساوية في شرائح ثمار الطفرتين (Smith وآخرون ٢٠٠٨).

الفصل الثاني

الفلفل

مرحلة النضج المناسبة للحصاد

يبدأ نضج ثمار الفلفل بعد نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر من الشتل، ويستمر لمدة شهرين إلى أربعة أشهر أخرى، ويتوقف ذلك على الصنف، وموعد الزراعة.

تقطف الثمار الخضراء بعد اكتمال نموها وهي مازالت خضراء، وتتميز الثمار المكتملة النمو بلونها الأخضر الزاهي. أما الثمار غير المكتملة النمو .. فإنها تكون ذات لون أخضر قاتم. وطبيعي أن الأصناف ذات الثمار الصفراء، والبرتقالية، والحمراء تقطف عند وصولها إلى مرحلة التلوين الخاصة بالصنف للتسويق المحلي، أو عند ٥٠٪-٩٠٪ تلوين حسب مدة الشحن ودرجة حرارته.

وتصل الثمار التي تستهلك وهي خضراء إلى طور النضج الاستهلاكي عادة بعد ٤٥-٥٥ يوماً من تفتح الزهرة. أما الأصناف الحلوة التي تستهلك ثمارها وهي حمراء فإنها تتطلب مدة أطول حتى تصل إلى مرحلة النضج الاستهلاكي. وقد قدرت هذه الفترة بنحو ٦٥ يوماً من تفتح الزهرة في الصنف فيبولا Fibola، و ٧٠ يوماً في الصنف أميريكانو Americano (Mardrid وآخرون ١٩٩٩). كذلك تصل الأصناف الحريفة التي تقطف بعد تمام تلوينها باللون الأحمر إلى هذه المرحلة - عادة - بعد ٦٠-٧٠ يوماً من التلقيح.

وقد وجد أن تأخير الحصاد يؤدي إلى زيادة المحصول الصالح للتسويق بنسبة ٥٠٪، وزيادة عرض الثمار عند الأكتاف، وزيادة سمك جدرها، وحجمها، وذلك مقارنة بمحصول وثمار النباتات التي تحصد في الموعد العادي. كما يؤدي تأخير الحصاد إلى تقليل عدد مرات القطف، ومن ثم خفض تكاليف الحصاد (Russo ١٩٩٦).


تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ويعتبر حساب الوحدات الحرارية المتراكمة - بالنسبة لكل موسم زراعى فى كل منطقة - أفضل وسيلة للتنبؤ بموعد الحصاد فى أصناف الفلفل الناقوسية (Perry وآخرون ١٩٩٣)

وتبلغ ثمار الفلفل الحمراء المكتملة النضج أقصى حجم لها وأكبر سمك لجدرها، كما يزيد محتواها من السكريات بمقدار ٥٠٪، ومن بادئات فيتامين أ بمقدار ١٠ أضعاف عما فى الثمار الخضراء

التغيرات المصاحبة لنمو الثمار ونضجها

يواكب النمو السريع للثمار بعد العقد ازدياد محتواها من الجلوكوز والفركتوز، ونقص فى محتواها من السكروز والنشا ومع تناقص معدل نمو الثمار، يتراكم السكروز والنشا مرة أخرى وتحدث عند نضج الثمار زيادة أخرى سريعة وحادة فى محتواها من السكريات المختزلة، بينما ينخفض محتواها من السكروز والنشا (شكل ١-٢) وقد كان لنمو ثمرة الفلفل ومحتواها من السكريات السداسية علاقة قوية بمحتواها من إنزيم آسيد إنفرتيز acid invertase (عن Wien ١٩٩٧).



شكل (١-٢) التغيرات فى محتوى ثمار الفلفل من أهم السكريات خلال مختلف مراحل نموها حتى اكتمال النضج

الفصل الثاني. الفلفل

وبمتابعة التغييرات المورفولوجية في ثمار الفلفل الخيلي Chile صفـه New Mexico 6-4، لوحظ ما يلي،

- ١ - ازدياد نشاط إنزيم β -galactosidase سريعاً بداية من اليوم الرابع والخمسين من تفتح الزهرة، ووصل إلى أعلى مستوى له في اليوم التاسع والثمانين.
- ٢ - كانت صلاحية الثمار أعلى ما يمكن في اليوم الرابع والخمسين من تفتح الزهرة، ونقصت جوهرياً في اليوم التاسع والستين.
- ٣ - كان إنتاج ثاني أكسيد الكربون ومحتوى الكلوروفيل أعلى ما يمكن عند عمر عشرين يوماً من تفتح الزهرة، ثم انخفض سريعاً بعد ذلك (Biles وآخرون ١٩٩٣).

هذا . ويزداد محتوى ثمار البابريكا من مضادات الأكسدة: حامض الأسكوربيك، والتوكوفيرولات tocopherols، والكاروتينات .. يزداد تدريجياً أثناء نضج ثمار، ولكن يصل تركيز حامض الأسكوربيك إلى أعلى مستوى له في مرحلة منتصف التلون، ثم ينخفض، بينما يستمر تركيز مضادات الأكسدة الأخرى في الزيادة. وبعد الحصاد - وأثناء التخزين والتجفيف - ينخفض تركيز حامض الأسكوربيك والتوكوفيرول بصورة حادة، بينما يحدث انخفاض تدريجي في محتوى الكاروتينات. وقد أدى تجفيف الثمار بطريقة الدفع الجبى للهواء الدافئ إلى احتفاظها بقدر أكبر من مضادات الأكسدة (Daoud وآخرون ١٩٩٦).

وتزداد سرعة فقد الصبغات من ثمار البابريكا مع ارتفاع حرارة التخزين، بينما يقل فقدها مع ارتفاع الرطوبة النسبية، وتختلف الأصناف جوهرياً في تلك الخاصية (Gomez-Ladron de Guevara وآخرون ١٩٩٨).

كما حدثت التغييرات التالية في محتوى ثمار الفلفل الحلو من الصبغات ووفق الخصائص الأيضية والإبراهيم المضادة للأحماض أثناء احتمال تحويها ونضجها،

- ١ - انخفض محتوى الكلوروفيل بانتظام من مرحلة اللون الأخضر إلى مرحلة اللون الأخضر الفارب إلى الصفرة، ثم أعقب ذلك انخفاضاً معنوياً حتى مرحلة اللون الأصفر.

- ٢ - ازداد محتوى الكاروتينات بانتظام خلال كل المراحل اللونية
- ٣ - ازداد محتوى فوق أكسيد الأيدروجين ٢.٥ ضعف بين مرحلتى اللون الأخضر واللون الأخضر الضارب إلى الصفرة، ثم انخفض المحتوى ببطء بعد ذلك حتى مرحلة اللون الأصفر، إلا أن المستوى النهائى كان أعلى مما فى مرحلة اللون الأخضر
- ٤ - ازداد نشاط الإنزيمين superoxide dismutase (اختصاراً SOD)، و ascorbate peroxidase (اختصاراً APX) بين مرحلتى اللون الأخضر واللون الأخضر الضارب إلى الصفرة، ثم تشابه مسلكهما بعد ذلك مع مسلك محتوى فوق أكسيد الأيدروجين
- ٥ - ازداد نشاط الإنزيم glutathione reductase بين مرحلتى اللون الأخضر واللون الأخضر الضارب إلى الصفرة
- ٦ - استمر نشاط الإنزيم catalase ثابتاً أثناء نضج الثمار ويستدل مما تقدم أن نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة ربما يزداد فى ثمار الفلفل الحلو أثناء نضجها بسبب تراكم فوق أكسيد الأيدروجين فيها (Imahon وآخرون ٢٠٠٠)
- وتزداد صلابة الجدر الثمرية للفلفل تدريجياً مع تقدمها فى التكوين ثم فى النضج حتى تبلغ الصلابة أقصى مدى لها عندما تصبح الثمار ملونة بالأحمر بنسبة ٣٠٪-٤٠٪، وذلك بعد نحو ٤٠-٥٠ يوماً من العقد ويصاحب تلك التغيرات فى الصلابة تغيرات بيوكيميائية وإنزيمية كثيرة، فيزداد البكتين الذائب بعد تلك المرحلة من النضج، وينخفض معها نشاط السليوليز cellulase، بينما يزداد نشاط البولى جالاكتيرونيز polygalacturonase والبكتين مثيل إستريز pectin methyl-esterase (Cheng وآخرون ٢٠٠٩)

العوامل السابقة للحصاد ذات الأهمية بما بعد الحصاد

الرش بأملاح الكالسيوم

أدى رش نباتات الفلفل ثلاث مرات بكلوريد الكالسيوم إلى زيادة وزن الثمرة وتحسين احتفاظها بصلابتها أثناء التخزين، وانخفاض إصابتها بالأعفان، وزيادة سمك الجدار الثمرى ومحتواه من المركبات البكتينية غير الذائبة (Toivonen & Bowen ١٩٩٩)

المعاملة ببعض منظّمات النمو

أدى رش نباتات الفلفل في مرحلة الإزهار بأى من: الباكلوبترازول paclobutrazol (بتركيز ٥٠ أو ١٠٠ جزء في المليون)، أو اليونى كونازول uniconazole (بتركيز ٢٠ أو ٥٠ جزء في المليون)، أو المفلويدايد mefluidide (بتركيز ٢٠ أو ٥٠ جزء في المليون) إلى الحد بشدة من أضرار البرودة التى ظهرت على ثمار الفلفل الخضراء والحمراء بعد ٢٨ يوماً من تخزينها على ٢°م. ولم يختلف معدل إنتاج الإثيلين وثانى أكسيد الكربون - فى حرارة ٢٠°م - بين الثمار التى أعطيت معاملة الباكلوبترازول والتى سبق تخزينها لمدة ٢٨ يوماً على حرارة ٢°م، وثمار معاملة الكنترول التى لم تعط تلك المعاملات (Lurie وآخرون ١٩٩٣، و ١٩٩٥). وجدير بالذكر أن المعاملة بالباكلوبترازول لم يعد مصرح بها؛ لما وجد له من تأثير مسرطن.

معاملة البابريكا بالإيثيفون

تعامل نباتات البابريكا بالرش بالإيثيفون بهدف إسراع نضج الثمار وجعله أكثر تركيزاً، إلا أن تأثير المعاملة يتوقف على تركيز الإيثيفون، وعدد مرات الرش، ودرجة الحرارة السائدة، والصنف المزروع؛ فلا تحدث استجابة للمعاملة فى حرارة تقل عن ٢١°م حتى ولو كان الرش بتركيز ٣٠٠٠ جزء في المليون. وفى الحرارة الأعلى يُفيد الرش بتركيزات تتراوح بين ١٠٠٠، و ٥٠٠٠ جزء في المليون، ولكن يصاحب ذلك مخاطر سقوط الأوراق وانفصال الثمار والإصابة بلسعة الشمس. كذلك فإن الرش بالإيثيفون فى الحرارة العالية تزيد معه الأضرار التى يمكن أن تحدث بالثمار والأوراق (Dris وآخرون ٢٠٠١).

وقد اقترح إعطاء ثلاث رشات بالإيثيفون بتركيز منخفض (١٠٠-٢٠٠ جزء في المليون) بدلاً من رشة واحدة بتركيز عال، حيث تنخفض الأضرار بشدة ويزداد متوسط حجم الثمرة، ولا تتساقط الأوراق والثمار (Bosland & Votava ٢٠٠٠).

الحصاد

يجرى الحصاد يدوياً كل ٣-٤ أيام، ويتم ذلك بشنى عنق الثمرة لأعلى قليلاً،

تكنولوجيا وقسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

فتنفصل بسهولة عن النبات ويمكن حصاد ثمار الأصناف الحريفة آلياً، ويتم ذلك مرة واحدة بعد نضج معظم الثمار في الحقل ويتوقف نجاح الحصاد الآلى على توفر الأصناف التى تنضج ثمارها خلال فترة زمنية وجيزة

بدأ حصاد الفلفل آلياً فى عام ١٩٦٧، وحتى عام ١٩٩٥ كانت أكثر من ٢٠٠ آلة تعمل فى حصاد الفلفل فى أكثر من تسعة دول. وتصل كفاءة بعض تلك الآلات إلى نحو ٣٠٠٠ كجم من الفلفل الى sweet cherry ونحو ٥٠٠٠ كجم من الفلفل الجلابينو jalapeno فى الساعة (Marshall ١٩٩٥) وتبلغ نسبة الفاقد فى ثمار البابريكا عند حصادها آلياً حوالى ١٠٪ من المحصول (Palau & Torregrosa ١٩٩٧)


وعلى الرغم من أن حصاد الفلفل الحريف تباسكو آلياً - مرة واحدة - يخفض كثيراً من تكاليف عملية الحصاد، إلا أن ذلك يقلل من جودة المنتج بسبب حصاد كثير من الثمار الخضراء والثمار غير المكتملة التلوين مع الثمار الحمراء الناضجة ويتم غالباً فرز المحصول يدوياً للتخلص من الثمار الخضراء، إلا أن ذلك يضيف إلى تكلفة الإنتاج وقد وجد أن رش نباتات الفلفل التباسكو بالإيثيفون بتركيز ٢٠٠٠-٣٠٠٠ جزء فى المليون (٠٧٥ لتر للفدان) قبل الحصاد الآلى بثلاثة أسابيع يفيد فى التخلص من الثمار غير الكاملة التكوين ويقلل من نسبة الثمار الخضراء فى المحصول المنتج، علماً بأن هذه المعاملة لم تكن لها أهمية بالنسبة لتحفيز نضج الثمار وتلونها (Kahn وآخرون ١٩٩٧)

وتتراوح كفاءة الحصاد الآلى بين ٧٣٪، و ٨٣٪ حسب الصنف، كذلك يتباين محتوى النفايات بعد الحصاد الآلى بين ٢٥٪، و ٤٢٪ من الوزن الجاف، وتتكون معظم النفايات من ثمار مصابة وغير ملونة جيداً، وأوراق، وأجزاء من السيقان (Wall وآخرون ٢٠٠٣)

ويعد توقيت موعد حصاد فلفل البابريكا أمراً حاسماً، ذلك لأن النبات الواحد يحمل ثماراً فى درجات متباينة من النضج، ويرجع ذلك إلى طبيعة النبات ذات التفرع الثنائى (شكل ٢-٢)، الذى يعطى زهرة عند كل نقطة تفرع ومن الطبيعى أن عدد الثمار العاقدة يتضاعف عند كل مستوى أعلى من التفرع ويمكن الحصول على أعلى محصول

الفصل الثاني الفلفل

إما بتكرار حصاد الثمار الناضجة أولاً بأول، وإما بالحصاد الآلي عندما تصبح معظم ثمار النبات ناضجة، والطريقة الثانية هي الأكثر كفاءة، ولكن يترتب عليها وجود بعض التباين بين الثمار في اللون والحراقة (Dris وآخرون ٢٠٠١)



شكل (٢-٢): تخطيط نبات البابريكا بين نظام تفرعه وحمله للثمار.

هذا .. وتنخفض كفاءة الحصاد الآلي، وتزداد تكلفة الحصاد اليدوي بزيادة القوة التي يلزم بذلها لقطف الثمرة، وتزداد هذه المشكلة تعقيداً في الأصناف الحريفة ذات الثمار الصغيرة التي تشكل فيها عملية الحصاد أكبر نسبة من تكلفة الإنتاج، خاصة وأن مصانع "الصوص" sauce تتطلب عدم زيادة نسبة الثمار التي يبقى كأس الثمرة وعنقها متصلين بها عن ٥٪. ولحسن الحظ فإن الصنف تباباسكو التابع للنوع *C. frutescens* - والذي يعد أهم الأصناف المستعملة في صناعة الصوص على الإطلاق - تنفصل ثماره بسهولة عن الكأس أثناء الحصاد، تاركة وراءها الكأس الأخضر وعنق الثمرة متصلين بالنبات أما في باقي أصناف الفلفل - وهي تنتمي إلى *C. annuum* - فإن القوة التي تلزم لفصل الثمرة عند الحصاد - وهي صفة وراثية - تتناسب طردياً مع كل من طول الثمرة، وقطرها، وطول عنق الثمرة، وقطر ندبة (مكان) اتصال الثمرة بعنقها (عن Motsenbocker ١٩٩٦) وعلى النقيض من ذلك لم يجد Motsenbocker (١٩٩٦) أي

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

علاقة بين القوة التى تلزم لفصل الثمرة عند الحصاد وأى من صفات الثمرة فى سلاتين من الفلفل التباسكو

كذلك وجدت اختلافات وراثية بين أصناف الفلفل الكايين Cayenne فى القوة التى تلزم لفصل الثمار عند الحصاد، وقد تشابهت تلك الأصناف مع أصناف الفلفل الحلو فى وجود علاقة طردية بين القوة التى تلزم لفصل الثمار عند الحصاد وكل من طول الثمرة، وقطرها، ووزنها وتبين أن الأصناف التى تحتاج إلى قوة أكبر لفصل ثمارها تتميز بوجود عدة طبقات من الخلايا الدعامية الملجننة عند منطقة اتصال الثمرة بالعنق (Gersch وآخرون ١٩٩٨)

عمليات التداول والإعداد للتسويق

أصناف الاستهلاك الطازج

يعد الفلفل للتسويق بعمليات التبريد الأولى، والتنظيف، والتشميع بطبقة من الشمع لتقليل إلفاق فى الوزن قبل التسويق، ثم التعبئة فى عبوات مناسبة، وقد يُدرج الفلفل.

يمكن غمر ثمار الفلفل الأخضر لمدة ٢٠ دقيقة فى ماء مكثور بتركيز ٥٠-١٠٠ جزء فى المليون، إلا أن زيادة فترة الغمر أو التركيز المستخدم عن ذلك تؤثر سلباً على صفات جودة الثمار، والتى منها المحتوى الكلورفيلى الكلى، والمواد الصلبة الذائبة، وحامض الأسكوربيك (Nunes & Emond ١٩٩٩).

ويتعين إجراء جميع عمليات التداول بعد الحصاد بحرص شديد لتجنب إحداث أى خدوش، أو تشققات، أو تهتكات بالثمار، فيتم تفريغ الثمار بحرص، وتدور آلات التبريد (شكل ٢-٣، يوجد فى آخر الكتاب) بالسرعة المناسبة، وتبطن كل الآلات التى تمر عليها الثمار بلوسائد المناسبة، ولا تزيد مسافة سقوط الثمار من مكان لآخر عن ٨ سم إن لم يكن المكان الذى تنقل إليه مبطناً أو عن ٢٠ سم إن كان مبطناً (Marshall & Brook ١٩٩٩)

يناسب الفلفل تبريده أولاً بطريقة الدفع الجبرى للهواء، أما التبريد باستعمال الماء

الفصل الثاني: الفلفل

المثلج فإنه يؤدي إلى زيادة إصابة الثمار بالأعفان، حتى ولو أضيف الكلورين إلى ماء التبريد

ويؤدي تأخير التبريد الأولي إلى سوء مظهر الثمار وفقدانها للمعانة وصلابتها، مع ظهور أعراض الفقد الرطوبي وتباين الفترة التي يمكن السماح بها في تأخير التبريد الأولي، ويجب ألا تزيد عن ست ساعات في حرارة ٢٠-٢٥°م، وعن ثلاث ساعات في حرارة ٣٧°م (Perishable Handling Quarterly - M. Cantwell & A. Thangaiyah - جامعة كاليفورنيا - ديفز - العدد ١٠٧ لشهر أغسطس عام ٢٠٠١ - الإنترنت).

تعد ثمار الفلفل شديدة الحساسية لفقد الرطوبة منها، حيث تظهر عليها أعراض "الكرمشة" بمجرد فقدانها لنحو ٣٪ من محتواها الرطوبي.

ويمكن تشميع ثمار الفلفل على أن يكون ذلك بطبقة رقيقة من الشمع لأجل تقليل الفقد الرطوبي وأضرار الاحتكاكات بين الثمار أثناء الشحن، كما يمكن تقليل الفقد الرطوبي من الثمار بتبطين العبوات الكرتونية بالبلاستيك أو بتعبئة الثمار في أكياس بوليثلين مثقبة (Sargent ٢٠٠٦).

وقد أعطت معاملة تشميع ثمار الفلفل بأي من نوعي الشموع: بريما فرش Primafresh، أو برونونج Prolong (الأخير بتركيز ٥٠٪)، مع التخزين في حرارة صفر، أو ٥°م .. أعطت أفضل النتائج من حيث زيادة القدرة التخزينية للثمار (Manzano & Zambrano ١٩٩٥).

هذا .. وتزداد إصابة ثمار الفلفل بعفن أسود يظهر عند كأس الثمرة وعلى ساقها وتسببه البكتيريا *Erwinia carotovora subsp. carotovora* عند حصاد الثمار المصابة مع السليمة، حيث يزداد انتشار المرض أثناء التداول. وتزداد الإصابة في الحقل عند الإفراط في التسميد الآزوتي، كما تزداد بعد الحصاد عند التأخير في تبريد المنتج، وعندما تكون الثمار كبيرة جدًا، حيث تتسبب في غلق الفتحات التي توجد في جوانب الكراتين، وهي التي تسمح بتدفق تيار الهواء البارد أثناء التبريد الأولي، والتهوية أثناء التخزين والشحن (Suslow ٢٠٠٠).

أصناف التجفيف

تحصد ثمار أصناف الفلفل التي تستعمل جافة بعد تمام نضجها، ثم تجفف وتترك فى كومة مغطاة حتى يحدث توازن بين رطوبة الثمار والرطوبة النسبية فى الجو المحيط بها ويمكن حينئذ تخزينها فى مخازن غير مبردة لمدة ٦ أشهر طالما أن درجة الحرارة تتراوح بين ١٠ و ٢٧°م وقد تخزن الثمار المجففة فى حرارة صفر-١٠°م حتى يتم تصنيعها، ويغيد ذلك فى احتفاظ الثمار بلونها الأحمر بصورة جيدة

وأياً كانت طريقة التخزين فإن نسبة الرطوبة فى ثمار الفلفل المجففة يجب أن تبقى فى حدود ١٠٪-١٥٪، وذلك لأن نقصها عن ذلك يؤدى إلى تفتتها عند التداول، ويصاحب ذلك تناثر أجزاء دقيقة منها فى الهواء تحدث التهابات بالجلد، وبالجهاز التنفسى للعمال القائمين بالعمل كما أن زيادة رطوبة الثمار عن ١٥٪ تؤدى إلى تكوّن نموات فطرية عليها ويؤدى تخزين الثمار المجففة فى أكياس مبطنة بالبولىثيلين إلى إطالة أمد التخزين، وتقليل مشكلة الغبار، مع حفظ نسبة الرطوبة فى الثمار عند مستوى واحد أثناء التخزين أياً كانت الرطوبة فى الجو الخارجى (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨)

فسيولوجيا ما بعد الحصاد

الفقد الرطوبى

لا توجد ثغور على سطح ثمار الفلفل، التى يكون فقدها للرطوبة - بعد الحصاد - من خلال طبقة الأديم cuticle التى تغطى سطح الثمرة. ويتناسب معدل الفقد الرطوبى للثمار طردياً مع محتواها الرطوبى عند القطف، كما يتناسب عكسياً مع سمك الغطاء لطبقة لبشرة (Lownds وآخرون ١٩٩٣، و Blanke & Holthe ١٩٩٧).

التنفس، وإنتاج الإثيلين، وظاهرة الكلايمكتيريك

لا تعد ثمرة الفلفل من الثمار الكلايمكتيرية نظراً لأن التغيرات اللونية التى تصاحب نضجها لا يسبقها، أو يواكبها، أو يعقبها أى زيادة كلايمكتيرية فى تنفس الثمار أو

الفصل الثاني الفلفل

إنتاجها من الإثيلين، وإنما تكون تلك الزيادة بسيطة (Rylski ١٩٨٦). تأكدت تلك الخاصية في ثمار الفلفل الحلو بصورة عامة، وإن كانت قد لوحظت ظاهرة الكلايمكتريك في تنفس ثمار أحد أصناف الفلفل الحلو الكورية، وهو Choorachong (عن Biles وآخرين ١٩٩٣)

وفي الفلفل الشيلي Mexican chile peppers (صنف New Mexico 6-4) لم تلاحظ - كذلك - أى زيادة كلايمكتيرية في تنفس الثمار أثناء نضجها، ولكن لوحظت زيادة في معدل إنتاج الإثيلين مرتان: كانت أولاهما عند عمر ٦١ يوماً من تفتح الزهرة وصاحبت مرحلة الزيادة الكبيرة في نمو الثمرة، وكانت الثانية عند عمر ٦٩ يوماً من تفتح الزهرة وصاحبت مرحلة التغيرات اللونية في الثمرة (Biles وآخرون ١٩٩٣).

وعلى الرغم من أن إنتاج الإثيلين كان أعلى في الثمار الحمراء عما في مراحل النضج الأخرى، إلا أن هذا الإنتاج لم يكن كافياً لتحفيز الثمار ذاتياً لإنتاج مزيد من الغاز، كما لم تلاحظ أى زيادة في معدل تنفس الثمار عند بداية نضجها. وقد أوضحت دراسات Villavicencio وآخرون (١٩٩٩) اختلافات جوهرية بين ١٣ صنفاً من الفلفل (الأخضر والأحمر في درجات مختلفة من التلوين) في معدل تنفس الثمار وإنتاجها من الإثيلين. وبصورة عامة، ازداد إنتاج الإثيلين جوهرياً عند اكتمال التكوين - أو قبل اكتماله - في كل الأصناف فيما عدا صنفين، هما Cubanella و Hungarian Wax.

تنتج ثمار الفلفل القليل جداً من الإثيلين، وبما يتراوح بين ٠.١ و ٠.٢ ميكروليتر لكل كيلو جرام من الثمار في الساعة على ١٠-٢٠ م. ولا تستجيب ثمار الفلفل للمعاملة بالإثيلين سوى بدرجة قليلة جداً ولإسراع نضج أو تلون ثمار الفلفل المكتملة التكوين فإن وضعها في حرارة ٢٠-٢٥ م مع رطوبة تزيد عن ٩٥٪ أكثر فاعلية عن معاملتها بالإثيلين.

ويكون معدل تنفس ثمار الفلفل (بالمليجرام ثاني أكسيد كربون لكل كيلو جرام من الثمار في الساعة) ٣-٤ مجم على ٥ م، و ٥-٨ مجم على ١٠ م، و ١٨-٢٠ مجم على ٢٠ م (Cantwell ٢٠٠٧).

هذا وتعد البذور غير الناضجة والمشمية المصدرين الرئيسيين لغاز ثاني أكسيد

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضراوات الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الكربون الذى يتراكم فى تجويف الثمار الخضراء، بينما يكون تنفس الجذر الثمرية منخفضاً (Blanke & Holthe 1997)

التغيرات فى النشاط الإنزيمى المؤثر فى صلابة الثمار

لوحظ أن التغيرات فى نشاط الإنزيمات المسؤولة عن تحلل الجدر الخلوية لثمار الفلفل أثناء نضجها، كانت كما يلى:

١ - ازداد نشاط إنزيم polygalacturonase، وصاحب ذلك تدهور فى بنية الثمرة (texture)

٢ - نقص نشاط إنزيم pectinesterase (أو methyl esterase).

٣ - لم تفقد الثمار التى خزنت فى حرارة ٨°م (لدة ٢٠ يوماً) بنيتها بسرعة كتلك التى حدثت فى الثمار التى كان تخزينها فى حرارة الغرفة

٤ - كذلك تغير نشاط إنزيمات الـ glycanases، وهى cellulase، و xylan endo-، و 1,3-β-xylanase (أو xylanase)، و mannase، و α-D-mannosidase (أو glucanase)، و β-D-galactosidase (أو galactanase) تغير نشاطها أثناء النضج، وكان أقل تغير فى النشاط الإنزيمى فى الثمار التى خزنت فى الحرارة المنخفضة، مقارنة بما كان عليه الحال فى الثمار الطازجة. وقد ازداد نشاط معظم تلك الإنزيمات، وكذلك نشاط إنزيم laminarase، و hemicellulase مع النضج، بينما قل نشاط إنزيم xylanase (Sethu وآخرون ١٩٩٦، و Prabha وآخرون ١٩٩٨)

معاملات خاصة تعطيها ثمار الفلفل قبل التخزين والشحن

تعطى ثمار الفلفل بعض المعاملات الخاصة التى تكون بهدف إما المحافظة على صفات الجودة، وإما زيادة فترة الصلاحية للتخزين، وإما الحد من الإصابات المرضية، وإما أى من تلك الأهداف مجتمعة. وبينما تطبق بعض من تلك المعاملات على انطاق انتجارى، فإن غالبيتها ما زالت قاصرة على النطاق البحثى

المعاملة بالماء الساخن قبل التخزين

أمكن الحد من ظهور أضرار البرودة في ثمار الفلفل الحلو الخضراء المحزنة على ٤°م لمدة يومين، وذلك بمعاملتها قبل التخزين بالغمر في الماء الدافئ على حرارة ٤٠ أو ٤٥°م لمدة ٤٥ دقيقة، أو بالتدفئة على حرارة ٤٠°م لمدة ٢٠ ساعة. وصاحب تلك المعاملات نقص جوهرى في التسرب الأيونى من الثمار التى تعرضت للبرودة مقارنة بنظيراتها التى لم تعط المعاملة الحرارية. هذا إلا أن غمر الثمار فى الماء على حرارة ٥٠°م لمدة ٤٥ دقيقة أحدث تلفاً كبيراً فى الأغشية الخلوية (Mencarelli وآخرون ١٩٩٣).

وأدت معاملة ثمار الفلفل بالماء الساخن على حرارة ٥٠°م لمدة ٣ دقائق إلى مكافحة كلا من العفن الرمادى grey mould الذى يسببه الفطر *Botrytis cinerea*، والعفن الأسود black mould الذى يسببه الفطر *Alternaria alternata*، حيث أمكن مكافحتهما بصورة تامة أو خفض الإصابة بهما بصورة معنوية حتى مع تعريض الثمار للعدوى الصناعية بأى من الفطرين قبل معاملتهما بالماء الساخن. ولم تظهر أضرار على ثمار الفلفل من جراء معاملة الماء الساخن إلا إذا استمر التعريض لحرارة ٥٠°م لمدة ٥ دقائق أو كان التعريض لحرارة ٥٥°م لمدة دقيقة واحدة أو أكثر، وكانت الأضرار على صورة شقوق ونقر على سطح الثمار (Fallik وآخرون ١٩٩٦).

وقد قام Fallik وآخرون (١٩٩٩) بغسيل ثمار عدة أصناف من الفلفل الحلو ببناء العادى أولاً، ثم بالماء الساخن على حرارة ٥٤-٥٦°م لمدة ١٠-١٤ ثانية أثناء مرورها على فرش التنظيف، ثم تجفيفها - قبل تعبئتها - وتخزينها على ٧°م لمدة ١٥ يوماً، ثم على ١٦-١٨°م لمدة ٤ أيام إضافية كانت الثمار المعاملة بهذه الطريقة - التى تناسب التصدير بطريق البحر إلى الأسواق الأوروبية والخليجية - أكثر صلابة ونظافة عن نظيراتها التى نظقت فقط بالفرش الجافة، كما كانت خالية تماماً تقريباً من الأعفان، وتبين أن المعاملة أدت إلى التخلص من الأتربة الدقيقة والجراثيم الفطرية التى تتواجد فى كأس الثمرة وجلدتها.

ولقد كانت أفضل المعاملات الحرارية لثمار الفلفل لأجل خفض الأعفان والتخلص من

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الحشرات وإطالة فترة الصلاحية للتخزين، هي ترك الثمار في هواء ساخن على 38°C لمدة ٤٨-٧٢ ساعة، أو في الماء الساخن على 50°C أو 53°C لمدة ٢-٣ دقائق أفادت تلك المعاملة في منع ظهور الأعفان الفطرية، وفي إمكان تخزين الثمار في حرارة منخفضة دون تعرضها للإصابة بأضرار البرودة، كما منعت الحرارة الجافة تطور بعض الحشرات، مثل *Ceratitits capitata* (Lurie وآخرون ١٩٩٨).

كما أدت معاملة الثمار بالماء الساخن على حرارة 53°C لمدة أربع دقائق إلى تجنب أضرار البرودة وتقليل التحللات بعد ١٤، و ٢٨ يوماً من التخزين على 8°C ، بينما لم تعط المعاملة بالماء على 45°C لمدة ١٥ دقيقة نتيجة مُرضية. كذلك أدت التعبئة في غشاء بوليثلين ذي كثافة منخفضة إلى تقليل الفقد في الوزن وأضرار البرودة جوهرياً، وذلك عندما كان التخزين على حرارة منخفضة، وكان تركيز الأكسجين أكثر انخفاضاً وثاني أكسيد الكربون أكثر ارتفاعاً داخل تلك العبوات عندما عوملت الثمار بالحرارة قبل تعبئتها عما حدث في ثمار الكنترول وبالإضافة إلى ذلك فإن الإثيلين لم يلاحظ في هواء عبوات الثمار التي عوملت بالحرارة، بينما أمكن ملاحظته في عبوات ثمار الكنترول. ولقد ازدادت مستويات البولي أمينات polyamines بعد المعاملة الحرارية مباشرة، وازداد تركيز البوترسين putrescine أثناء التخزين على 8°C ، وخاصة في الثمار التي أعطيت المعاملة الحرارية والتي عبئت في أغشية البوليثلين، وكانت الزيادة جوهرياً في الثمار التي عوملت بحرارة 53°C لمدة ٤ دقائق، ثم عبئت في الأغشية، وذلك بعد ١٤ يوماً من التخزين وبينما انخفض تركيز الاسبرمين spermine في ثمار الكنترول أثناء التخزين، فإنه لم يتأثر في الثمار التي أعطيت المعاملة الحرارية وعبئت في أغشية البوليثلين (González-Aguilar وآخرون ٢٠٠٠).

التدفئة المتقطعة أثناء التخزين

تبدأ التغيرات الأيضية المصاحبة لأضرار البرودة قبل ظهور أية أعراض مرئية لتلك الأضرار، وتتمثل في حدوث زيادة في معدل التنفس، ومعدل إنتاج الإثيلين، ونفاذية

الفصل الثاني. الفلفل

الأغشية الخلوية هذا إلا أن تبادل تعريض الثمار لحرارة عالية مع الحرارة المنخفضة (صفر إلى ١ م°) أثناء تخزينها أبطل التأثير الضار للحرارة المنخفضة، وأدى إلى ضعف تراكم الكحول، والأسيتالدهيد، والأسيتون، وزيادة نشاط إنزيمات الـ peroxidase، والـ catalase، وتثبيط نشاط إنزيم phenylamine ammonia-lyase، ونقص التسرب الأيوني، وتقليل أضرار البرودة (Chen وآخرون ١٩٩٤). وعلى الرغم من أن تدفئة ثمار الفلفل المخزنة على ٥ م°، و ٩٠-٩٥٪ رطوبة نسبية (برفع حرارة الثمار إلى ٢٤-٢٥ م° مع ٧٠-٧٥٪ رطوبة نسبية لمدة ٢٤ ساعة كل ٢-٥ أيام) أدى إلى تقليل أضرار البرودة، إلا أن ذلك كان مُصاحِباً بزيادة في الفقد في الوزن، ونقص في الصلاحية للتسويق (Kluge وآخرون ١٩٩٨).

المعاملة ببكربونات البوتاسيوم

كانت معاملة ثمار الفلفل ببكربونات البوتاسيوم أكثر تأثيراً في مكافحة الفطر *Alternaria alternata* - مسبب مرض العفن الأسود - عن استعمال أى من الـ penconazole، أو الزيوت، أو المواد الناشرة (Ziv وآخرون ١٩٩٤). وفي دراسة أخرى (Fallik وآخرون ١٩٩٧) أدى غمس ثمار الفلفل في محلول من بيكربونات البوتاسيوم بتركيز ١٪ أو ٢٪ إلى إحداث نقص معنوي في إصابات الثمار بكل من العفن الرمادي (*Botrytis cinerea*)، والعفن الأسود (*Alternaria alternata*)، مقارنة بالكنترول، بينما أدى النقع في بيكربونات البوتاسيوم بتركيز ٣٪ إلى التأثير سلبياً على نوعية الثمار. وقد تبين من الدراسات المختبرية أن تأثير بيكربونات البوتاسيوم على كل من الفطرين كان مثبطاً (وليس قاتلاً)، وذلك من خلال تثبيطه لنمو الغزل الفطري، وإنبات الجراثيم، واستطالة الأنابيب الجرثومية. ومن المعلوم أن أملاح البيكربونات تستعمل في الأغذية بتركيزات قد تصل إلى ٢٪.

المعاملة بمضادات الأكسدة

أدى غمس ثمار الفلفل في محلول من السانوسل Sanosil-25 (وهو يحتوى على

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

H_2O_2 - أى فوق أكسيد الأيدروجين (hydrogen peroxide - بنسبة ٤.٨٪) بتركيز ٥.٠٪ أدى إلى خفض إصابات الثمار بكل من العفن الرمادى والعفن الأسود إلى المستويات المقبولة تجارياً، وذلك مقارنة بالكنترول (Fallik وآخرون ١٩٩٤)

ويفيد غمر ثمار الفلفل الأخضر الحلو فى محلول من مضاد الأكسدة diphenylamine بتركيز ١٢ مللى مولار لمدة دقيقتين فى حمايتها من الإصابة بأضرار البرودة لدى تخزينها على ١°م لمدة ٨ أيام بعد ذلك؛ حيث يقل ظهور النقر السطحية وتحلل الكلورفيل (Purvis ٢٠٠٢)

المعاملة بالمثيل جاسمونيت

أمكن الحد من أضرار البرودة فى ثمار الفلفل المخزنة على ٢°م لمدة ٤-١٠ أسابيع بغمرها - قبل التخزين - لمدة ٣٠ ثانية فى محلول المثيل جاسمونيت methyl jasmonate بتركيز ٢٥ مللى مول كما أعطت المعاملة بالمركب فى صورة غازية لمدة ساعة نتيجة مماثلة لمعاملة الغمر (Meir وآخرون ١٩٩٦).

تغليف الثمار بغشاء رقيق من مواد صالحة للأكل

استعملت فى تغليف coating ثمار الفلفل تحضيرات تجارية صالحة للأكل edible أساسها زيت معدنى (مثل PacRite)، أو السيليلوز (مثل Nature Seal)، أو بروتين الحليب (مصل اللبن Whey البروتينى الذى ينفصل عند صناعة الجبن مع الجليسرول) وبينما لم تؤثر أى من المغلفات coatings على معدل تنفس الثمار أو تلونها، فإن التحضير PacRite كان هو الوحيد الذى قلل الفقد الرطوبى من الثمار وأدى إلى إطالة فترة صلاحيتها للتخزين (Lerdthanangkul & Krochta ١٩٩٦)

وأدت معاملة ثمار الفلفل بالشيتوسان chitosan إلى خفض إنتاج الفطر *Botrytis cinerea* لإنزيمات الـ polygalacturonases (ومى التى تقوم بتحليل البكتين فى الجدر الخلوية للثمار المصابة)، والإضرار البيولوجى الشديد بهيفات الفطر ذاته؛ الأمر الذى أضعف كثيراً من قدرة الفطر على إصابة الثمار (Ghaouth وآخرون ١٩٩٧)

الفصل الثاني الفلفل

كذلك أدى تغليف ثمار الفلفل والخيار بالثيتوسان بتركيز ١٪ أو ٥٪ ثم تخزينها على ١٣ أو ٢٠°م إلى خفض الفقد في الوزن في كل منهما في كلتا الدرجتين. كما أدت زيادة تركيز الثيتوسان من ١٪ إلى ١٠.٥٪ (وزن/حجم) إلى إحداث نقص جوهري في الفقد في الوزن، ومعدل التنفس، والفقد في اللون، والذبول، والإصابة الفطرية (El Ghaouth وآخرون ٢٠٠٧).

المعاملة بثاني أكسيد الكلورين

أدت معاملة ثمار الفلفل بثاني أكسيد الكلورين بأى تركيز بين ٥، و ٥٠ مجم/لتر إلى خفض أعفان الثمار بمقدار ٥٠٪ بعد ٤٠ يوماً من التخزين، وكانت أفضل معاملة هى تركيز ٥٠ مجم/لتر، وهى التى لم يبدأ فيها ظهور الأعفان إلا بعد شهرين من التخزين، بينما كان العفن فيها - بعد ٤٠ يوماً من بدء التخزين - ٢٥٪ مما كان فى ثمار الكنترول التى لم تُعامل بالغاز (Du وآخرون ٢٠٠٧).

المعاملة بأشعة جاما

أحدثت معاملة ثمار الفلفل (صنف ماجده Magda) بأشعة جاما بجرعات تراوحت بين ٢٠٠، و ٨٠٠ Gy (بمعدل ١.٤٦ Gy/ساعة) .. أحدثت زيادة كبيرة فى قدرة ثمار الفلفل على التخزين، حيث بلغت ٤٩-٥٨ يوماً عندما كان تخزين الثمار المعاملة بالإشعاع على حرارة ٧-٩°م، مع ٥٠-٥٥٪ رطوبة نسبية (Wiendl وآخرون ١٩٩٦).

المعاملة بالمبيدات الفطرية

أدى غمس ثمار الفلفل الحلو فى محلول من الثيابندازول thiabendazole (اختصاراً: TBZ) بتركيز ١٠٠ جزء فى المليون على حرارة ٥٠°م، ثم تخزينها فى ٤°م . أدى ذلك إلى تقليل إصابتها بأضرار البرودة مما فى الثمار التى تم غمسها فى الـ TBZ على حرارة ٢٥°م أدت بمعاملة الـ TBZ إلى خفض الإصابة بالأعفان جوهرياً وكانت أفضل

المعاملات هي غمس الثمار في الـ TBZ على 50°م تم التخزين في جو متحكم في مكوناته CA على حرارة 4°م ، وذلك من حيث احتفاظ الثمار بجودتها، وعدم تعرضها للإصابة بالأعفان، وبأضرار البرودة (Yang & Lee 1998).

التخزين

التخزين البارد

يناسب الفلفل نفس ظروف التخزين التي تناسب كلا من الفاصوليا الخضراء، والبامية، والكوسة، والطماطم (الوردية اللون)، والبطيخ؛ لذا فإنه يمكن شحنها وتخزينها معًا ولا يجب - أبدًا - جعل الثلج يلامس أى من تلك المنتجات (Sargent 2006).

يجب تبريد ثمار الفلفل بأسرع ما يمكن لخفض الفقد في الوزن، علمًا بأن الثمار التي تخزن في حرارة تزيد عن 7.5°م تتعرض لفقد أكبر في الوزن ويمكن تخزين الفلفل على 7.5°م لمدة 3-5 أسابيع وعلى الرغم من إمكان تخزين الفلفل على 5°م لمدة أسبوعين مع تعرضه لفقد أقل في الوزن، فإن بقاءه في تلك الدرجة لفترة أطول من ذلك تعرضه للإصابة بأضرار البرودة، والتي تتضمن التנקير، والعفن وخاصة بالآلترناريا، والتغيرات اللونية لمساكن البذور، والطراوة دون فقد للماء وتكون الإصابة بأضرار البرودة في خلال أيام قليلة على صفرة وتعد الثمار الناضجة أو الملونة أقل حساسية للبرودة عن الثمار الخضراء، أما الرطوبة النسبية فيجب أن تزيد عن 95٪ للمحافظة على صلابة الثمار، وهي الخاصية التي ترتبط مباشرة بالفقد الرطوبي.

تخزن ثمار الفلفل في مجال حرارى يتراوح بين 7°م و 9°م ، مع رطوبة نسبية تتراوح بين 90٪ و 95٪ ويمكن لثمار الفلفل أن تحتفظ بجودتها في هذه الظروف لمدة 3 أسابيع إن كان التخزين في أوعية منفذة للرطوبة، ولمدة 4 أسابيع إن كان التخزين في أكياس من البولييثيلين المثقب

وتتعرض ثمار الفلفل للإصابة بأضرار البرودة، إذا خزنت في حرارة تقل عن 7°م ، وأهم أعراضها تكون نقر سطحية على الثمار (تظهر هذه النقر في خلال أيام قليلة من

الفصل الثاني الفلفل

تخزين الثمار في حرارة ٢°م، ويتغير لون الثمار قريباً من الكأس، وتصبح الثمار أكثر عرضه للإصابة بفطر الألترناريا *Alternaria* لدى إخراجها من المخازن.

ويؤدى تخزين الثمار في حرارة تزيد عن ١٠°م إلى سرعة نضجها، وزيادة فقدها للرطوبة، وذبولها.

وقد ازدادت إصابة ثمار الفلفل بالأعفان — عندما تركت معروضة لمدة ٧ أيام على حرارة ٢٠°م ورطوبة نسبية ٧٠٪ - وذلك كلما ازدادت الرطوبة النسبية خلال فترة التخزين التى سبقت العرض، والتى دامت لمدة ١٥ يوماً على حرارة ٨°م، علماً بأن معاملات الرطوبة النسبية خلال فترة التخزين البارد تراوحت بين ٨٥٪، و ١٠٠٪ وعلى العكس من ذلك ازداد الفقد فى الوزن وازدادت طراوة الثمار كلما انخفضت الرطوبة النسبية خلال فترة التخزين البارد (Polderdijk وآخرون ١٩٩٣).

إن من أهم أعفان الفلفل التى تظهر أثناء تخزين: عفن ألترناريا، والعفن الطرى البكتيرى، والبقع البكتيرية، وعفن فيتوفثورا، وعفن رايزوبس (Sargent ٢٠٠٦).

أضرار البرودة

من أهم مظاهر أضرار البرودة chilling injury تكون نقر سطحية على الثمار، واكتساب البذور لوناً بنيّاً، وتغير لون كأس الثمرة وتحلله، وظهور لون بني ضارب إلى الرمادى على سطح الثمرة فى الحالات الشديدة. تظهر الأعراض على الثمار بعد نقلها إلى الحرارة العالية وليس أثناء تخزينها فى الحرارة المنخفضة. وتزداد الفترة التى تكفى لظهور أضرار البرودة من يوم واحد على حرارة ١°م إلى نحو ١٤ يوماً على حرارة ٦°م. ويزداد التنقيير السطحى مع انخفاض الرطوبة النسبية. هذا .. إلا أن الفلفل الأحمر لا يصاب بالتنقيير السطحى (Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

ولم تظهر أعراض أضرار البرودة (متمثلة فى النقر السطحية) فى ثمار الفلفل الخضراء، والناضجة الحمراء، والصفراء عندما خزنت فى حرارة ١٣°م لمدة أسبوعين،

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

كما لم تظهر أضرار البرودة على الثمار الناضجة التي خزنت على حرارة 1°C لمدة أسبوعين، ولكنها ظهرت على الثمار الخضراء التي خزنت لمدة ثلاثة أيام على 1°C وقد حفزت حرارة التخزين المنخفضة (1°C) زيادة إنتاج الثمار من الإثيلين، إلا أن تلك الزيادة لا ترتبط بالإصابة بأضرار البرودة، حيث أنها تحدث في كل من الثمار الحمراء والخضراء - التي تخزن على 1°C - على حد سواء (Lin وآخرون ١٩٩٣، و ١٩٩٣ب) هذا مع العلم بأن أضرار البرودة تظهر بعد يوم واحد من نقل الثمار من الحرارة المنخفضة إلى حرارة الغرفة.

كذلك ظهرت أضرار البرودة على ثمار الفلفل الخضراء المكتملة التكوين المخزنة على 2°C ، بينما لم تظهر تلك الأعراض على الثمار الحمراء من الصنف ذاته (صنف لامويو Lamuyo) وقد صاحب ظهور أضرار البرودة على الثمار الخضراء المكتملة التكوين زيادة جوهريّة في معدل إنتاج الثمار من الإثيلين، وفي مستويات كل من الـ ACC، والبوترسين putrescine، وحامض الأبسيسيك ABA، بينما لم تحدث أي من تلك التغيرات في الثمار الخضراء المكتملة التكوين التي خزنت على 10°C ، أو في الثمار الحمراء الناضجة التي خزنت على 2°C أو 10°C . هذا بينما ظل محتوى الثمار من الاسبرميدين spermidine ثابتاً في كل الحالات (Serrano وآخرون ١٩٩٧)

وتكون ثمار الفلفل أكثر حساسية للإصابة بأضرار البرودة (عند تخزينها في حرارة 1°C لمدة أسبوع ثم تعريضها لحرارة 20°C لمدة يومين) وهي في طور التحول اللوني، حيث تظهر عليها نقر سطحية كثيفة وعميقة، بينما تكون تلك الأعراض أقل شدة في الثمار الخضراء المكتملة التكوين، ولا تظهر أي أضرار على الثمار الحمراء. وتصاحب الزيادة في أعراض البرودة زيادة في كل من الفقد الرطوبي، ومعدل التنفس، وإنتاج الإثيلين، والتسرب الأيوني، مع عدم حدوث أي تغيرات لونية. هذا ولا تظهر نقر سطحية على ثمار الفلفل المخزنة (وهي في أي درجة من درجات النضج) على $5-10^{\circ}\text{C}$ لمدة ٤ أسابيع (Lim وآخرون ٢٠٠٧)

تتباين أصناف الفلفل في حساسيتها للإصابة بأضرار البرودة، ومن الأصناف المتحملة

الفصل الثاني الفلفل

كلا من Wanda ، و Super Datil Pepper (وهما من الفلفل الحار) اللذان أمكن تخزينهما لمدة ١٤ يوماً على ٥°م دون أن تظهر على ثمارها أضرار برودة مرئية (Kan وآخرون ٢٠٠٧).

ومع تباين أصناف الفلفل في حساسية ثمارها للإصابة بأضرار البرودة، بدا أن صفة التحمل في الصنف Buchon ربما يكون مردها إلى أن نظام تضادية الأكسدة فيه أكثر كفاءة عما في غيره (Lim وآخرون ٢٠٠٩).

هذا .. ويحدث فقد بسيط إلى متوسط في الجلسريدات اليبيدية glycerolipids أثناء التخزين البارد على حرارة ٢°م، ولكن يزداد هذا الفقد بشدة وتزداد الأضرار التي تحدث للأغشية الخلوية بعد تدفئة الثمار التي سبق تعريضها للحرارة المنخفضة، وتعد البلاستيدات الخضراء - بصورة خاصة - شديدة الحساسية لأضرار البرودة (Whitaker ١٩٩٥).

ووجد أن مستوى الـ ACC، وكذلك الإثيلين ازداد في الثمار الخضراء التي خزنت على ٢°م بعد نقلها إلى حرارة الغرفة، بينما لم تحدث تلك الزيادة في الثمار الخضراء التي خزنت على ١٠°م، أو في الثمار التي خزنت على ٢°م أو ١٠°م. كذلك ظل مستوى البوترسين putrescine ثابتاً في كل الحالات فيما عدا في الثمار الخضراء التي خزنت على ٢°م، والتي ازداد فيها مستوى البوترسين إلى الضعف بعد أسبوع واحد، وإلى عشرة أضعاف مستواه الابتدائي بعد خمسة أسابيع من التخزين. أما الاسبرميدين spermidine فلم يتغير مستواه في كل من الثمار الخضراء والحمراء الناضجة سواء أكان تخزينها على ١٢°م أم ١٠°م (Serrano وآخرون ١٩٩٥).

التخزين في الهواء المتحكم في مكوناته

كان لتخزين الثمار لمدة ٢٤ ساعة في هواء تنخفض فيه نسبة الأكسجين إلى ١,٥٪ تأثير بالغ في خفض معدل تنفس تلك الثمار لمدة ٢٤ ساعة أخرى بعد نقلها إلى الهواء العادي، وأدت زيادة فترة التخزين حتى ٧٢ ساعة في ١,٥٪ أكسجين إلى زيادة الفترة التي استمر فيها الانخفاض في معدل تنفس الثمار - بعد نقلها إلى الهواء العادي - إلى

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

٤٨ ساعة وكان التخزين في هواء يحتوى على ٥٪ أكسجين أقل تأثيراً في هذا الشأن، بينما لم يكن للتخزين في ١٠٪ أكسجين أى تأثير، وذلك مقارنة بالكنترول (Rahman وآخرون ١٩٩٣).

وأدى تخزين الفلفل في ٣٪ ثانى أكسيد كربون، و ٣٪ أكسجين لمدة ١٥ يوماً على حرارة ٨°م أدى إلى تقليل أغطان الثمار عندما وضعت بعد ذلك على حرارة ٢٠°م لمدة سبعة أيام، وذلك مقارنة بالتخزين في صفر٪ ثانى أكسيد كربون و ٢١٪ أكسجين (Polderdijk وآخرون ١٩٩٣).

وقد أمكن شحن الفلفل من هولندا إلى الولايات المتحدة بطريق البحر في رحلة استغرقت ١٠ أيام على حرارة ٨°م، ورطوبة نسبية ٩٢٪، مع ٤٪ أكسجين + ٣٪ ثانى أكسيد كربون، كان الفقد في الوزن خلالها ٣٪ فقط، وبعد ٧ أيام إضافية من العرض على حرارة ١٧°م ورطوبة نسبية ٧٥٪ بلغ الفقد في الوزن ٥٪ (Janssens ١٩٩٤).

وعلى الرغم من أن ثمار الفلفل لم تصب بأضرار البرودة عندما خزنت على حرارة ٥°م أو ١٠°م لمدة ١٨ يوماً في الهواء العادى، إلا أن أضرار البرودة ظهرت بعد ٦ أيام فقط من التخزين على ٥°م عندما احتوى هواء المخزن على ١٠٪ ثانى أكسيد الكربون (+ هواء أو ٣٪ أكسجين)، ولكن هذه النسبة العالية من ثانى أكسيد الكربون لم تؤثر في نوعية الثمار عندما كان التخزين على ١٠°م. وقد كانت معدلات التنفس وإنتاج الإثيلين (بعد إخراج الثمار من المخزن وحفظها لمدة ٣ أيام على حرارة ١٥°م) أعلى في الثمار التى كان تخزينها على حرارة ٥°م مع ١٠٪ ثانى أكسيد كربون عما فى تلك التى كان تخزينها على ١٠°م وقد كانت نوعية الثمار أفضل ما يمكن عندما كان التخزين فى ٥٪ ثانى أكسيد كربون (Mercado وآخرون ١٩٩٥).

وقد احتفظت ثمار الفلفل من صنف كاليفورنيا وندر بأفضل نوعية لها لمدة ٤ أسابيع على حرارة ١٠°م عندما كان تخزينها فى ١٪ أكسجين، وذلك مقارنة بالتخزين فى ٣، ٥، ٧، أو ٢١٪ أكسجين؛ فبعد أسبوعين فقط من التخزين

كانت نسبة الثمار التي أصيبت بالأعفان ٣٣٪ عندما كان التخزين في ٢١٪ أكسجين، بينما كانت الأعفان ٩٪ فقط في ١٠٪ أكسجين. وبينما انخفضت نسبة الإصابة بالأعفان قليلاً خلال الأيام الأولى من التخزين في ٣٪ أو ٥٪ أكسجين، فإن التخزين في ٧٪ أكسجين لم يختلف عن التخزين في الهواء العادي (٢١٪ أكسجين) فيما يتعلق بالإصابة بالإعفان. وقد استمرت فاعلية التخزين في ١٪ أكسجين في خفض الإصابة بالأعفان طوال فترة التخزين التي استمرت لمدة ٤ أسابيع، وكان معدل تنفس هذه الثمار وإنتاجها من الإيثيلين أقل مما في الثمار التي خزنت في نسب أعلى من الأكسجين (Luo & Mikitzel ١٩٩٦).

ويبين من دراستهم Tang & Lee (١٩٩٧) بخصوص تأثير التخزين في الهواء المتحكم في مكوناته على إصابة الثمار بأضرار البرودة، ما يلي:

- ١ - أصيبت الثمار بأضرار البرودة، ولم تكن صالحة للتسويق عندما خزنت لمدة ٧ أيام على حرارة ١°م، أو لمدة ١٥ يوماً على ٤°م.
- ٢ - لم تظهر أعراض أضرار البرودة عندما كان التخزين على ١٠°م، ولكن الثمار التي خزنت على هذه الدرجة لمدة ٣٠ يوماً لم تكن صالحة للتسويق كذلك لشدة تدهورها.
- ٣ - كانت أكثر معاملات الهواء المتحكم في مكوناته فاعلية في خفض أضرار البرودة على ٤°م هي: ١٪ ثاني أكسيد كربون + ١٪ أكسجين، أو ٣٪ ثاني أكسيد كربون + ١٪ أكسجين.
- ٤ - لم تكن الثمار صالحة للتسويق بعد تخزينها لمدة ١٥ يوماً في ١٠٪ ثاني أكسيد كربون + ٣٪ أكسجين، على ٤°م.
- ٥ - ازدادت إصابة الثمار بالأعفان، وازداد إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون والإيثيلين مع زيادة إصابتها بأضرار البرودة، وزيادة فترة تخزينها.
- ٦ - كانت أفضل ظروف التخزين على ٤°م - مع احتفاظ الثمار بجودتها لأطول فترة ممكنة - هي: ١٪ ثاني أكسيد كربون + ١٪ أكسجين، و ٣٪ ثاني أكسيد كربون + ١٪ أكسجين.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

كذلك وجد أن خفض نسبة الأكسجين في هواء المخزن إلى ٢٪ أو ٥٪ أدى إلى تقليل إصابة ثمار الفلفل بأضرار البرودة عندما خزنت في حرارة ٥°م لمدة ٢١ يوماً ثم نقلت إلى ١٥°م لمدة ٥ أيام (عن Loughheed ١٩٨٧).

وعموماً . فإن الفلفل لا يستجيب للتخزين في الجو المتحكم في مكوناته إلا قليلاً؛ فتركيز الأكسجين (٢٪-٥٪) وحدة ليس له تأثير يذكر على الجودة، بينما يمكن أن يضر التركيز المرتفع (<٥٪) من ثاني أكسيد الكربون بالجودة بظهور نقر سطحية وتغيرات لونية وفقد للصلابة، خاصة إذا كان التخزين على حرارة تقل عن ١٠°م ويعد جو تركيبيه ٣٪ أكسجين + ٥٪ ثاني أكسيد كربون مع التخزين على ٥-١٠°م لمدة ٣-٤ أسابيع أفضل للفلفل الأحمر منه للفلفل الأخضر (Cantwell ٢٠٠٧).

التعبئة والتخزين في الأغشية غير المنفذة للرطوبة والمعدلة للجو (MAP)

تعبأ ثمار الفلفل في أكياس غير منفذة للرطوبة (شكل ٢-٤، يوجد في آخر الكتاب) بهدف تقليل الفقد الرطوبي منها. وقد أدى وضع ثمار الفلفل في عبوات من البوليثلين المثقب على ٧-١٠°م إلى نقص الفقد الرطوبي إلى نحو ٥٪ فقط من الفقد الرطوبي في حالة عدم التغليف، وصاحب ذلك نقص في معدل طراوة الثمار وتلونها عندما كان التخزين في حرارة ١٤ أو ٢٠°م هذا إلا أن الثمار المغلفة في الأكياس كانت - في الحرارة العالية - أكثر تعرضاً للإصابة بالأعفان، الأمر الذي قلل من قدرتها التخزينية (Lownds وآخرون ١٩٩٣)

كما أمكن إطالة فترة احتفاظ ثمار الفلفل بجودتها بعد الحصاد حتى ٤٠ يوماً بتشميع الثمار ثم تغليفها في أغشية منخفضة الكثافة من البوليثلين بسبك ٤٢ أو ٦٥ ميكرونًا، وتخزينها على ١٠°م، مع ٧٥٪ رطوبة نسبية. وقد أدت عمليتا التشميع والتغليف إلى زيادة فترة الصلاحية للتخزين على ١٠°م بمقدار ٢٠ يوماً وأبطأتا جوهرياً كلا من وصول الثمار إلى مرحلة الشيخوخة ومن التغيرات اللونية فيها، كما أحدثتا نقصاً في معدلات

الفصل الثاني. الفلفل

فقد الثمار لوزنها، وإصابتها بالأعفان، مقارنة بالتغيرات في ثمار الكنترول ولم تظهر أى تغيرات غير طبيعية في طعم الثمار التى عوملت بهذه الطريقة وخزنت حتى ٤٠ يوماً (Gonzalez & Tiznado ١٩٩٣).

هذا إلا أن تعبئة ثمار الفلفل فى أغشية من البوليثلين المنخفض الكثافة يؤدى إلى رفع الرطوبة النسبية داخل العبوة إلى درجة قريبة من التشبع، وتتكثف الرطوبة على الثمار والأسطح الداخلية للأغشية وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة بوضع مادة ماصة للرطوبة - مثل كلوريد الصوديوم - داخل العبوة بمعدل ١٠ جم لكل عبوة تحتوى على أربع ثمار (٥٠٠-٦٠٠ جم) من الفلفل الأحمر. وعلى الرغم من أن إضافة كلوريد الصوديوم إلى العبوة أدت إلى زيادة الفقد فى الوزن قليلاً مقارنة بالفقد فى الوزن فى ثمار الكنترول، إلا أن هذه المعاملة حافظت على الرطوبة النسبية فى حدود ٩٢٪-٩٥٪، وجعلت من الممكن تخزين الثمار على ٨ م لمدة ثلاثة أسابيع دون أن تتعرض للإصابة بالأعفان (Rodov وآخرون ١٩٩٥).

وقد أمكن - كذلك - خفض الرطوبة النسبية داخل العبوات - دون التأثير على الفقد فى الوزن - باستعمال بوليثلين مثقب بدلاً من البوليثلين العادى، وكانت الثمار المعبأة فى البوليثلين المثقب أقل تعرضاً للإصابة بالأعفان (عفن بوتريتس *Botrytis*) من نظيرتها غير المعبأة فى البوليثلين غير المثقب، كما كانت أقل فقداً فى الوزن من نظيرتها غير المعبأة فى أغشية البوليثلين (Ben-Yehoshua وآخرون ١٩٩٦).

وأوضحت الدراسات أن تثقيب الغشاء يؤثر كثيراً على تركيز الأكسجين وثنائى أكسيد الكربون، ويقلل التكتيف المائى داخل العبوات، ويؤدى إلى تعديل الهواء المحيط بالثمار بما يتناسب واحتفاظها بجودتها لفترة طويلة أثناء التخزين (Ben-Yehoshua وآخرون ١٩٩٨).

وأوضحت دراسات Meir وآخرون (١٩٩٥) بخصوص تأثير تعبئة ثمار الفلفل الأحمر الحلو فى أكياس من البوليثلين المثقب بدرجات مختلفة (تراوحت بين ٠.٠٦٤٪،

و ٠.٤٢٪) أوضحت وجود عدة مزايا لذلك، كما يلي
١ - أنقصت التعبئة في أكياس البوليثلين المثقب الفقد الرطوبى بنسبة ٤٠٪-٥٠٪
فى الثمار التى خزنت فى حرارة ٧,٥°م لمدة أسبوعين، ثم فى حرارة ١٧°م لمدة ٣ أيام
إضافية

٢ - لم تحدث التعبئة فى أكياس البوليثلين المثقبة زيادة جوهرية فى نسبة إصابة
الثمار بالأعفان خلال فترتى التخزين (١٤ يوماً على حرارة ٧,٥°م) والعرض (٣ أيام على
حرارة ١٧°م)

٣ - أمكن مع التعبئة فى أكياس البوليثلين المثقبة تخزين ثمار الفلفل الحلو الأحمر
فى حرارة ٣°م دون أن تظهر عليها أضرار البرودة

٤ - أدى وضع ثمار الفلفل الأحمر فى تلك الأكياس لمدة يومين على حرارة ٢٥°م إلى
اكتمال تلوينها بشكل جيد فى نهاية فترة التخزين التى استمرت لمدة ١٢ يوماً، وذلك
دون أن تفقد الثمار صلابتها أو جودتها.

كما أمكن إطالة فترة تخزين ثمار الفلفل الحلو - مع الاحتفاظ بجودته - بغمس
الثمار فى محلول هيبوكلوريت بتركيز ١٪، ثم وضعها - بعد جفافها - فى صوان
ألومنيومية، وتغطيتها بغشاء من البولى فينيل كلورايد PVC بسبك ١٦,٥ ميكرونًا،
وتخزينها على ٨°م وبهذه الطريقة . لم يتعد الفقد الرطوبى من الثمار ١١,٦٪ بعد ٣٠
يوماً من التخزين (Barros وآخرون ١٩٩٤).

كذلك أدت تعبئة ثمار الفلفل الأخضر المكتملة التكوين من صنف لامويو فى أغشية
من البولى بروبيلين التى تتفاوت فى درجة نفاذيتها (نفاذية قدرها ١٠ أو ٨٠ لتر/م^٢/يوم
لكل من الأكسجين، وثانى أكسيد الكربون) . أدت إلى تقليل تعرضها لأضرار البرودة
عند تخزينها على ٢°م، وخاصة فى الغشاء الأقل نفاذية. وقد كانت الزيادة فى إنتاج
كل من ال ACC، واليوترسين، وال ABA فى الثمار المعبئة فى هذه الأغشية أقل مما
فى نظيراتها من الثمار المخزنة فى الحرارة المنخفضة دون تغليف (Serrano وآخرون
١٩٩٧)

الفصل الثاني: الفلفل

وعموماً .. فإن غمر ثمار الفلفل لمدة ٤ دقائق في ماء ساخن على ٥٣°م ثم تعبئتها في أغشية بوليثلين ذات كثافة منخفضة بسمك ٦٥ ميكرونًا يحافظ على جودتها بشكل جيد عند تخزينها في حرارة ٨°م. وقد أدت المعاملة الحرارية إلى خفض معدل التنفس والإصابة بالأعفان، والمحافظة على امتلاء ونضارة الثمار ولونها الأخضر، وذلك لمدة ٢٨ يومًا (González-Aguilar وآخرون ١٩٩٩، و Raffo وآخرون ٢٠٠٧). وحتى بدون المعاملة الحرارية فإن التخزين في الظروف المشار إليها ساعد على احتفاظ ثمار الفلفل الحار بجودتها لمدة أربعة أسابيع (Wall & Berghage ٢٠٠٧).

التصدير

يصدر الفلفل الأخضر إلى بعض دول أوروبا الغربية خلال الفترة من يناير إلى منتصف أبريل. تفرز وتستبعد الثمار غير المطابقة للصفة، وغير المنتظمة الشكل، والمصابة بجروح أو خدوش أو أمراض، والمصابة بلفحة الشمس، وعديمة العنق. ويجب أن تكون الثمار المصدرة كاملة وسليمة وطازجة، وفي درجة مناسبة من النضج، وذات لون طبيعي، وخالية من آثار المبيدات، وآثار الإصابات المرضية والحشرية.

تعبأ الثمار في كراتين سعة ٣ كجم، ترص فيها الثمار يدويًا في صفوف. وتبقى الثمار بحالة جيدة لمدة ٣٠ يومًا عند تداولها جيدًا.

الفلفل المجهز للمستهلك

يجهز الفلفل الطازج للمستهلك fresh-cut على صورة قطع ١×١ سم (diced) أو شرائح (sliced).

يجب ألا يكون الفلفل المجهز متغير اللون أو مائي المظهر يجب استقبال الفلفل الخام وهو في حرارة ٧°م وأن يخزن على ٧-١٠°م حتى التشغيل، ثم على ١-٤°م بعده ومن بين المشاكل التي تؤثر في المظهر العام كثرة لون الجدر الثمرية، والتلون البني للأسطح المقطعة والتحلل ويجب غسل ثمار الفلفل بالرش بالماء قبل تجهيزها،

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ثم بعد استئصال العنق والمشيمة بما تحمله من بذور (Coring) لتقليل أعداد الميكروبات

وعلى الرغم من أن ثمار الفلفل الكاملة تعد حساسة للبرودة فإنه من الضروري تخزين الفلفل المجهز على حرارة صفر-5°م، علمًا بأن الثمار التامة النضج أقل حساسية للبرودة من الثمار الخضراء المتكاملة التكوين من نفس الصنف (González-Aguilar 2004)

أما الجو المتحكم فيه الموصى به فهو 3٪ أكسجين + 5٪ إلى 10٪ ثاني أكسيد كربون ويمكن أن تؤدي زيادة ثاني أكسيد الكربون عن 10٪ إلى دكنة لون الأنسجة وطراوتها وتباین الأصناف كثيرًا في قدرتها التخزينية وفي حساسيتها لأضرار ثاني أكسيد الكربون، كما تزداد القدرة التخزينية في الفلفل المكتمل النضج عما في الفلفل الأخضر المكتمل التكوين، ويزداد التحلل - الذي يسببه الفطرين *Alternaria*، و *Botrytis* وبكتيريا العفن الطرى البكتيري - في الفلفل المقطع إلى أجزاء صغيرة عما في الفلفل المقطع إلى شرائح

وقد احتفظ الفلفل الـ jalapeno المجهز للمستهلك fresh-cut بخصائص الجودة (فيما يتعلق بالقوام واللون والمحتوى الرطوبي) وكذلك محتواه من مضادات الأكسدة (الألفاكاروتين وحامض الأسكوربيك) بصورة أفضل عند تعبئته في جو معدل MAP (5٪ أكسجين + 4٪ ثاني أكسيد كربون) على 4.4°م لمدة 12 يومًا عما كان عليه الحال عندما كان التخزين في الهواء على نفس الدرجة، علمًا بأنه بعد 3 أيام إضافية من التخزين على 13°م كان احتفاظ الثمار بمحتواها من الألفاكاروتين 87٪، مقارنة بـ 68٪ في ثمار الكنترول، واحتفاظها بمحتواها من حامض الأسكوربيك 83٪ مقارنة بـ 56٪ في الهواء (Howard & Hernandez-Brenes 1998).

وأدى تكرار غسيل قطع الفلفل الحلو المجهز للمستهلك بالماء المقطر حتى ثلاث مرات قبل تخزينه في MAP على 7°م إلى المحافظة على نضارة الشرائح بصورة واضحة عما في معاملة الكنترول. وبالمقارنة بمعاملة الكنترول التي لم تغسل فيها الشرائح

الفصل الثاني الفلفل

قبل تعبئتها، فإن هواء الـ MAP احتوى على تركيزات أعلى من الأسيتالدهيد والإيثيل أسيتيت عما فى هواء تلك التى غسلت فيها الشرائح وقد تبين من تحليل ماء الغسيل احتواءه على تركيزات واضحة من الأسيتالدهيد والفينولات الذائبة التى غسلت مع الماء من الأسطح المقطوعة للأنسجة، وهى المركبات التى تتكون فى الأنسجة استجابة لحالة الشد التى تنشأ فيها عند تعرضها للتقطيع، وربما تواجدت مركبات أخرى فى ماء الغسيل لم يتم تحليلها (Toivonen & Stan ٢٠٠٣).

وبينما يحتفظ الفلفل المجهز للمستهلك fresh-cut بكامل صفاته الأكلية الجيدة لمدة ٧ أيام على حرارة $8 \pm 1^\circ \text{C}$ ، فإن العدّ الميكروبي يزداد كثيرًا فيه بعد ذلك حيث يصل إلى أكثر من $10^6 - 10^8$ وحدة مكونة لمستعمرة CFU/جم (Senesi وآخرون ٢٠٠٠).

ويتباين معدل تنفس الفلفل المجهز للمستهلك (بالمليجرام ثانى أكسيد كربون لكل كيلوجرام فى الساعة) حسب طريقة التجهيز ودرجة الحرارة، كما يلى:

الحرارة (°م)	شرائح بسك ٥ سم	قطع ١×١ سم
صفر	٦-٢	٩-٢
٥	٧-٤	١٢-٦
١٠	١٣-٦	١٨-١١

الفصل الثالث

الكنتالوب (القاوون) والشمام

تنضج ثمار الشمام والقاوون بعد نحو ٣ إلى ٤ شهور من الزراعة، وتستغرق الثمار نحو ٤٠-٤٥ يوماً من العقد حتى النضج.

التغيرات العامة المصاحبة لنضج الثمار

تحدث التغيرات التالية في ثمار الشمام والقاوون مع تقدمها في النضج:

- ١- تزداد نسبة السكر والمواد الصلبة الذائبة الكلية (ولكن لا تحدث أى زيادة بعد وصول الثمار لمرحلة الانفصال الكامل)، وتنخفض تدريجياً نسبة النشا في البذور.
- ٢- تقل نسبة السكريات المختزلة
- ٣- تزداد نسبة المواد البكتينية الذائبة.
- ٤- تقل صلابة الثمار.
- ٥- قد تتحسن النكهة والقوام بعد الحصاد، ولكن لا تزيد نسبة السكريات.
- ٦- إذا تركت الثمار بدون حصاد بعد اكتمال نضجها، فإنها تفقد صلابتها، وينخفض محتواها من السكريات تدريجياً (Whitaker & Davis ١٩٦٢).

يرتبط تراكم السكروز في ثمار الكنتالوب بطول المدة التى تبقى فيها الثمرة متصلة بالنبات، مع انخفاض فى مستوى نشاط الإنزيم soluble acid invertase عن حد معين (فى الواقع لا يبدأ السكر فى التراكم إلا عند حدوث ذلك الانخفاض فى نشاط الإنزيم)، وزيادة فى نشاط ثلاثة إنزيمات أخرى عن حد معين، وهى: phosphate synthase، و sucrose synthase، و neutral invertase. ويلاحظ أن مستوى نشاط تلك الإنزيمات الثلاثة الأخيرة يكون منخفضاً فى التراكيب الوراثية التى ينخفض محتوى ثمارها من السكروز (Burger & Schaffer ٢٠٠٧).

علامات النضج، ومرحلة النضج المناسبة للحصاد

تختلف علامات النضج باختلاف الطراز الصنفى؛ ولذا فإننا نتناول ذلك الأمر فى كل طراز أو مجموعة من الطرز المتشابهة معاً.

وتتوزع مرحلة النضج المناسبة للحصاد على العوامل التالية،

- ١- مدة الشحن والتسويق.
- ٢- الصنف
- ٣- معاملات ما بعد الحصاد
- ٤- درجة الحرارة عند الحصاد، وأثناء الشحن والتسويق
- ٥- طريقة الشحن
- ٦- طريقة التخزين.

ويلاحظ فى جميع أصناف الشام والقاوون أن مرحلة النضج النباتى تسبق مرحلة النضج الاستهلاكى الذى تظهر فيه الرائحة المميزة للثمار، وتحدث أثناء التغيرات المرغوبة فى اللون والصلابة والقوام.

ومن الطبيعى أنه يمكن - كقاعدة عامة - حصاد الثمار فى مرحلة أقل تقدماً من النضج - بعد اكتمال تكوينها - كلما قصرت مدة الشحن، وكلما تحسنت ظروف التداول والتخزين بعد الحصاد، وكلما ازداد الاهتمام بالمحافظة على سلسلة التبريد، علماً بأن الأمر كله يختلف باختلاف الطراز الصنفى والصنف ذاته.

وتكمل ثمار القاوون المكتملة التكوين mature نضجها ripening بعد الحصاد، ولكن لا يزيد محتواها من السكر عما يكون عليه عند الحصاد، لعدم احتوائها على مخزون من النشا. وتمثل السكريات حوالى ٩٦٪ من محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة الكلية وتقتصر التغيرات التى تحدث فى الثمار بعد الحصاد على كثافة تكوين المركبات المتطايرة المسئولة عن النكهة المميزة، وليونة الثمرة

ومن أهم علامات النضج في مختلف المجموعات الصنفية، ما يلي،

الشمام والشهبر

يعرف نضج الشمام والشهد بالعلامات التالية:

١- يتغير لون جلد الثمرة من اللون الأخضر إلى الأصفر

٢- بدء ليونة الثمرة، خاصة من الطرف الزهري.

٣- تكتسب الثمرة رائحة عطرية مميزة.

وتحصد ثمار الشمام والشهد — عادة — عند اكتمال نضجها، ولكن يفضل حصادها في مرحلة سابقة لذلك، مع مراعاة أن تكون قد وصلت إلى مرحلة اكتمال التكوين.

القاوون (الشبكي)

نتناول تحت القاوون الشبكي علامات النضج في طرز الأناناس، والجاليا، والكنتالوب الأمريكي، والإيطالي.

يوجد طرازان من الكنتالوب الأمريكي الشبكي (المuskmelon): الغربي Western shipper (الذي يُنتج أساساً في أريزونا، وكاليفورنيا، وتكساس)، والشرقي Eastern shipper (الذي يُنتج في شرق الولايات المتحدة)، وكلاهما Cucumius melo var cantalupensis، على الرغم من أن كليهما ليس بكنتالوب حقيقي true cantaloupe كالذي ينمو في Cantaluppi بإيطاليا ويتميز بثماره غير الشبكية. وكلا الطرازان الأمريكيان متماثلين في صفاتهما باستثناء أن الشرقي بثماره تضليع واضح عميق، بينما لا يوجد ذلك التضليع في الطراز الغربي (Shellie & Lester ٢٠٠٤).

ويعد طراز الجاليا هو أكثر طرز الكنتالوب (القاوون) الشبكي في مصر حالياً.

ويعرف نضج القاوون الشبكي — بمختلف طرزه — بالعلامات التالية:

١- يكتمل تكوين الشبك بجلد الثمرة ويتحول من شبك مسطح ذي زوايا حادة إلى

شبك ناعم ومحدب.

٢- يبدأ لون جلد الثمرة بين الشبك في التحول من اللون الأخضر الداكن أو الأخضر الرمادى إلى الأخضر المائل إلى الصفرة

٣- يتكون غطاء شمعى على سطح الثمرة، يمكن معرفة مدى صلابته بمحاولة خدشه.

٤- يبدأ ظهور شق حول عنق الثمرة عند موضع اتصاله بها، وتعرف هذه المرحلة من النضج باسم نصف الانفصال Half Slip. ومع استمرار نضج الثمرة ... يحيط الشق إحاطة تامة بمنطقة اتصال الثمرة بالعنق، وتعرف هذه المرحلة باسم اكتمال الانفصال Full Slip وعلى الرغم من هذه التسمية فإن الثمرة لا تنفصل تمامًا عن العنق، بل تبقى متصلة به من المركز (شكل ٣-١؛ يوجد فى آخر الكتاب)، وتكون هذه المرحلة سهلة الانفصال تمامًا عن العنق وجاهزة للتسويق المحلى، بينما تتطلب الثمار فى مرحلة نصف الانفصال قوة أكبر للحصاد. وتكون أقل نضجًا وفى كلتا الحالتين . يكون الشبك قد اكتمل تكوينه، وتغير لون جلد الثمرة بين الشبك إلى اللون الأصفر، واكتمل تراكم معظم السكر بالثمار

وعند تسويق الثمار محليًا . فإنها تقطف عند تمام نضجها (أى فى مرحلة الانفصال الكامل بالنسبة للقاوون الشبكي) . ولكن قبل أن تفقد صلابتها وتصل ثمار القاوون الشبكي لأفضل نوعية للأكل عادة بعد الحصاد بنحو ١-٣ أيام فى حرارة ٢١°م. أما فى حالة الشحن فإن الثمار تحصد قبل تمام نضجها، مع مراعاة ألا تكون غير مكتملة التكوين immature إلى درجة لا تنضج معها جيدًا بعد الحصاد.

تكون ثمار الكنتالوب الأمريكى فى أفضل مراحل صفاتها الأكلية عندما لا تقل نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بها عن ١٠٪ وحتى ١٢٪، مع تراوح قراءة جهاز قياس الصلابة بالاختراق penetrometer reading فيها بين كيلوجرام واحد وكيلوجرامين على الستيمتر الربع من سطح الثمرة (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤)

ويجب فى جميع الحالات التى تحصد فيها الثمار قبل ظهور علامات النضج

الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والشمام

الخارجية عليها - وهي الحالات التي يلزم فيها تخزين الثمار لفترات طويلة، كما في حالة الشحن البحري - أن يتم الربط بين المظهر الخارجى للثمار ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية، ليتمكن حصاد الثمار - عندما يصل محتواها إلى ١٠٪ على الأقل. ويلزم تحديد هذه العلاقة لكل صنف على حدة، وفي كل موسم زراعة، ولكل منطقة؛ ذلك لأن مظهر الثمار الخارجى - حينئذٍ - يتحكم فيه العوامل الوراثية الخاصة بالصنف، والعوامل البيئية السائدة أثناء الحصاد.

أما الثمار التي تحصد لأجل الشحن الجوى فإن قطفها يكون فى مرحلة واضحة من النضج يكون فيها جلد الثمرة أصفر اللون أو أصفر ضارب إلى الخضرة قليلاً.

وعند حصاد الثمار لأجل شحنها بطريق البحر، فإنه يتعين أن يظهر بجلد الثمرة - بين الشبك - أى درجة من درجات التلوين (أخضر مصفر، أو أصفر مخضر)، على ألا يقل محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية عن ١٠٪.

وفى دراسة أجريت على ثمار صنفين من طراز الجاليا - هما جاليا ٥ Galia 5، ودورال Doral - لتقييم مدى تحملها للشحن البحرى عند حصادها فى درجات مختلفة من التكوين، حصدت ثمار الجاليا ٥ عندما ظهر عليها اللون الأصفر بنسبة أقل من ١٠٪، وبنسبة ١٠-٢٠٪، وبنسبة ٥٠-٧٠٪، وخزنت على حرارة ١٢°م لمدة ٢٦ يوماً، بينما قطفنت ثمار دورال بعد ٣١ يوماً أو ٣٥ يوماً من تفتح الزهرة، وخزنت على حرارة ١٢°م لمدة ٣٣ يوماً. وقد وجد أن ثمار الجاليا التى حصدت فى طورى التلوين الأول والثانى لم يظهر بها انهيار بالأنسجة، ولكنها فشلت فى التلوين بدرجة مقبولة، بينما تلك التى حصدت فى طور التلوين الثالث (٥٠-٧٠٪ اصفران) ظهر انهيار فسيولوجى بأنسجتها خلال فترة التخزين. أما ثمار الصنف دورال التى قطفنت بعد ٣١ يوماً من تفتح الزهرة فقد احتفظت بصفاتها الداخلية الجيدة لمدة التخزين، بينما أظهرت تلك التى قطفنت بعد ٣٥ يوماً من تفتح الزهرة انهيار فسيولوجى بأنسجتها بعد ٢٨ يوماً من التخزين على ١٢°م (Moelich وآخرون ١٩٩٦)

ثمار البتية

يُعد الشارنتيه كنتالوب حقيقي، وتتوفر منه طرزاً ملساء وأخرى شبكية لا يبدو على ثمار الشارنتيه تغيرات خارجية قاطعة عند وصولها إلى مرحلة التكوين والنضج المناسبين للحصاد ويتم تحديد المرحلة المناسبة للقطف عندما يصبح اللون الأساسي للثمرة فاتحاً

ومن أهم ملامحه النضج هي ثمار الشارنتيه ما يلي،

- ١- اصفرار أقرب ورقة للثمرة، وإذا ما جفت فإن الثمرة تكون زائدة النضج
- ٢- تلون الثمار باللون الأبيض الذهبي وليس البرتقالي (شكل ٣-٢، يوجد في آخر الكتاب)
- ٣- تصبح الأضلاع خضراء رمادية (شكل ٣-٢، يوجد في آخر الكتاب)، وإذا أصبحت خضراء أو صفراء فإن الثمار تكون زائدة النضج (شكل ٣-٣، يوجد في آخر الكتاب)

وإذا تركت الثمار لتكمل نضجها على النبات قبل قطفها فإنها تفقد صلابتها بسرعة شديدة، ويصبح لبها مائي المظهر، وتتكون فيها تركيزات عالية من المركبات المتطايرة والكحولية التي تجعلها غير مستساغة الطعم، وهي الظاهرة التي تعرف باسم Vitrosity وتقطف الثمار قبل وصولها إلى تلك المرحلة بعدة أيام، ولكن بعد اكتمال تكوينها، والصعوبة هي في تحديد مرحلة اكتمال التكوين

الكنتالوب الحقيقي

تنتمي أصناف الكنتالوب الحقيقي للصنف النباتي *Cucumis melo var. cantalupensis*، وتضم طرز الكرينشو Crenshaw، والكاسابا Casaba، والفارسي Persian، وجميعها لا تنفصل فيها الثمار انفصلاً طبيعياً عن العنق عند النضج، ويعرف فيها النضج بعلامات مميزة لكل طراز

فتكون ثمار الكاسابا جاهزة للحصاد عندما تصبح قشرتها المضلعة أو المجعدة كثيراً

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

صفراء اللون، وطرفها الزهري لين مرن. يجب أن يكون اللب طرياً، وبلون أبيض تقريباً، ولكن مع مسحة قرنفلية حول تجويف البذور، وأن يكون حلو المذاق. لا توجد رائحة للثمار باستثناء آثار من رائحة الخيار

أما ثمار الكرنشو Crenshaw (وهي ناتجة من التهجين بين الكاسابا والفارسي) فإنها تكون جاهزة للأكل عندما يتحول حوالى ٥٠٪ من سطح جلد الثمرة الأخضر الداكن إلى اللون الأصفر، وعندما يصبح الطرف الزهري لين مرن، مع ظهور رائحة تابلية (من التوابل) لطيفة في حرارة الغرفة. أما اللب فإنه يكون شديد الحلاوة وعصيري وبلون قرنفلى وطرى. أما الثمار التي تكون تامة الاصفرار من الخارج، فإنها تكون زائدة النضج ولا تصلح للاستهلاك.

(الهنى ديو) (شهر العسل)

يتبع الهنى ديو Honey Dew (أو شهد العسل) الصنف النباتى *C. melo var inodorus*، وباستثناء القليل من أصناف تلك المجموعة التى تنفصل ثمارها انفصلاً طبيعياً عند النضج، فإن غالبية أصنافها لا تنفصل فيها الثمار انفصلاً طبيعياً عن العنق عند النضج.

ويعرضه فيما النضج بالعلامات التالية،

- ١- اصفرار جلد الثمرة أو جزء منه.
 - ٢- طراوة الطرف الزهري للثمرة قليلاً، ويظهر ذلك عند الضغط عليه.
 - ٣- يتغير لون جلد الثمرة عند موضع رقادها على التربة إلى الأصفر قليلاً.
- وتُصنّف ثمار شهد العسل عند حصادها إلى ثلاث درجات من اكتمال التكوين والنضج، كما يلي:

١- ثمار مكتملة التكوين *mature*، ولكنها غير ناضجة *uripe*:

يكون لون الجزء الملامس للتربة فى هذه الثمار أبيض مخضر قليلاً، ولا يكون لها طعماً مميزاً، كما يكون جلد الثمرة عليه شعيرات وغير شمعى ويجب عدم حصاد الثمار

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

فى هذا الطور من التكوين قبل أن يصل محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية إلى ١٠٪، ويفضل أن يكون ١١٪.

٢- ثمار مكتملة التكوين mature وأخذة فى النضج ripening.

يكون فيها لون الجزء الملامس للتربة أبيض باخضرار خفيف، ويكون الجلد شمعى قليلاً، والطرف الزهرى صلب، ولا يكون لها طعم مميز إلا قليلاً وتلك هى مرحلة التكوين المناسبة للحصاد، ويمكن أن تصل فيها نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية إلى ١٢,٥٪.

٣- ثمار ناضجة ripe.

يكون لون الجزء الملامس للتربة فى هذه الثمار أبيض كريمى مصفر قليلاً، والجلد شمعى بوضوح، وتظهر لها نكهة مميزة، كما يكون الطرف الزهرى أقل صلابة من ذى قبل، ويمكن أن يصل محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية إلى ١٤٪ (Suslow وآخرون ١٩٩٧ ب).

يكون من الصعب – غالباً – تحديد مرحلة النضج المناسبة للحصاد فى ثمار الهنى ديو، ويبين جدول (٣-١) فئات مراحل النضج المختلفة (متضمنة المراحل الثلاث التى أسلفنا بيانها) وخصائصها.

وبصفة عامة يُحصد شهد العسل باكتمال التكوين وليس بالحجم، علماً بأن اكتمال التكوين يصعب تقديره لعدم وجود انفصال طبيعى للثمرة عن العنق ويعتمد تقسيم مراحل اكتمال التكوين – غالباً – على التغيرات فى لون الجزء من جلد الثمرة الذى يلامس التربة من اللون المخضر إلى اللون الكريمى مع بعض الاصفرار.

ومن أهم علامات الجودة الخارجية لثمار الهنى ديو الشكل المتناسق الكروى تقريباً مع التجانس فى المظهر، والخلو من الندب والعيوب السطحية، والخدوش، وتبدو الثمار ثقيلة بالنسبة لحجمها، ويكون جلد لها شمعى وليس زغبياً (Suslow وآخرون ٢٠٠٧).

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

جدول (١-٣). ثبات مراحل نضج ثمار المني ديو وخصائصها (عن Cantwell ١٩٩٦)

الفئة	الصفات	(جزء في المليون)	(كجم)	المواد الصلبة الذائبة (%)
غير مكتملة التكوين	لون خارجي مخضر - زغبية - لا توجد رائحة - قد تحصد بطريق الخطأ	—	—	—
مكتملة التكوين - غير ناضجة	اللون الخارجى أبيض مشوب بالخرقة - الجلد زغبى قليلاً - لا توجد رائحة - تتفلق الثمرة حين قطعها - اللب قصم - أقل درجة من النضج يسمح بها تجارياً - الحد الأدنى للمواد الصلبة الذائبة ١٠٪	٠,٨	٣,١٠	١١-١٠
مكتملة التكوين - نضج	اللون الخارجى أبيض بآثار من الأخضر - الجلد ليس زغبياً - الجلد شمعى قليلاً - الرائحة قليلة إلى ملحوظة - تتعلق الثمرة حين قطعها - اللب قصم - تصلح للتسويق لفترة طويلة	٥,٢	٢,١	١٢-١١
ناضجة	اللون الخارجى أبيض كريمى إلى أصفر فاتح - الجلد شمعى - الرائحة ملحوظة - قد يبدأ العسق فى الانفصال عن الثمرة - اللب صلب - لا تتعلق الثمرة حين قطعها - الأنسب للأكل - تحصد للتسويق المحلى	٢٧,١	١,٥	١٤-١٢
رائدة النضج	اللون الخارجى أصفر - طرية عند الطرف الزهرى - الرائحة قوية جداً - انفصال الثمرة عن العسق - اللب طرى ومائى المظهر جريئاً	٢٩,٤	١,١	١٥-١٤

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتتطلب ثمار شهد العسل (الهني ديو) المعاملة بالإثيلين حتى تنضج، حيث تلبين قليلاً عند الطرف الزهري، وتظهر بها الرائحة المميزة

هذا ويكون لب الثمرة في الهني ديو بلون أخضر، إلا أن بعض الأصناف يكون لبها بلون ذهبي، أو برتقالي، أو وردي

ويعتقد بأن أصنافه خمس العمل طاه اللب البرتقالي بعد بديلاً جيداً لأصنافه الكتالوب (الم muskmelon الأمريكى) طاه اللب البرتقالي والجلد الهيكى لصبيح، صم.

١- نعمة جلد ثمار شهد العسل؛ فلا توجد مخاطر لعدم التخلص التام من الحمل الميكروبي كما فى الكتالوب الشبكي.

٢- تميز ثمار شهد العسل البرتقالية بصفات جودة عالية (Hodges & Lester ٢٠٠٦، و Lester وآخرون ٢٠٠٧)، وبارتفاع محتواها من مضادات الأكسدة وإن تباينت الأصناف فى هذا الشأن (Lester & Hodges ٢٠٠٨)

البيل دى سابو

تنفصل ثمار البيل دى سابو طبيعياً عن العنق عند نضجها، ولكنها تقطف قبل وصولها إلى تلك المرحلة بيومين إلى عدة أيام، حسب درجة الحرارة السائدة أثناء موسم الحصاد، والفترة التى تمر على الثمار من الحصاد حتى وصولها إلى المستهلك ولما كان طراز البيل دى سابو لا يستهلك محلياً ولا يزرع إلا لأجل التصدير، لذا يتعين حصاد الثمار بمجرد اكتمال تكوينها وقبل عدة أيام من نضجها. ويعرف اكتمال النمو بتغير لون جلد الثمرة فى الجزء الملامس للتربة إلى اللون الأصفر، مع ظهور اصفرار خفيف بين التمرقات الخضراء على باقى جلد الثمرة.

(الكنارى)

تكون ثمار الكنارى جاهزة للأكل عندما يصبح الجلد المضلع أحياناً ناعماً، وبلون أصفر كنارى لامع، وعندما يكون طرفها الزهري لين مرناً أما اللب فيجب أن يكون

قَصما crisp وأبيض اللون مع مسحة من اللون الوردي حول تجويف البذور، كما تنبعث منه رائحة عطرية في حرارة الغرفة (Lester & Shellie ٢٠٠٤)

تأثير المعاملات السابقة للحصاد على نوعية الثمار بعد الحصاد المعاملة بأملاح الكالسيوم

عوملت نباتات القاوون (الكنتالوب والهنى ديو) رشاً بالكالسيوم الخلوب على الأحماض الأمينية مع المانيتول بمعدل ٢٣ لتر/هكتار (لتر واحد للفدان)، وكانت المعاملات إما (أ) عند ظهور الأزهار المؤنثة، وإما (ب) بعد ١٥ يوماً من الإزهار في الكنتالوب، أو ٢٠ يوماً في الهنى ديو، وإما (ج) بعد ٣٠ يوماً من الإزهار في الكنتالوب، أو ٣٠ يوماً في شهد العسل، وإما (د) قبل انفصال الثمار بنحو ٣-٥ أيام، وذلك رشاً مرة واحدة في أحد المواعدين (أ)، أو (د)، أو مرتان في المواعدين (أ) + (ب)، أو (ج) + (د)، أو أربع مرات في المواعيد (أ) + (ب) + (ج) + (د). لم يكن لتلك المعاملات أى تأثير على ثمار الكنتالوب بعد الحصاد، إلا أن نباتات الهنى الديو التى تلقت أربع معاملات رش بالكالسيوم كانت ثمارها أكثر صلابة وصلاحية للتسويق وازداد محتواها من الكالسيوم عن ثمار النباتات التى لم تعامل بالكالسيوم أو عوملت لرة واحدة أو مرتين فقط، هذا بينما لم يتأثر محتوى الثمار من السكريات أو طعمها بتلك المعاملات (Lester & Grusak ٢٠٠٤).

المعاملة بمشط تمثيل الإثيلين: AVG

أدى رش نباتات الكنتالوب بالـ aminoethoxyvinylglycine (اختصاراً: AVG) بتركيز ٠.٦، أو ١.٣، أو ٢.٦ جزءاً فى المليون قبل الحصاد بثمانية عشر أو إثني عشر يوماً قبل الحصاد إلى انخفاض معدل إنتاج الثمار من الإثيلين عند الحصاد وبعد التخزين البارد عما فى الثمار التى حصدت من معاملة الكنترول. وقد تناسب إنتاج الثمار للإثيلين بعد التخزين عكسياً مع التركيز الذى استخدم من الـ AVG، وكان أقوى تأثير فى خفض إنتاج الإثيلين عندما كانت المعاملة بالـ AVG بعد أسبوع من وصول الثمار لمرحلة

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الشبك الكامل (إثنى عشر يوماً قبل الحصاد) عما لو كانت المعاملة عندما كانت غالبية الثمار في الوحدة التخزينية قد وصلت لمرحلة الشبك الكامل (ثمانية عشر يوماً قبل الحصاد). هذا إلا أن المعاملة بتركيز ٢٦٠ جزءاً في المليون أدت إلى تأخير بداية تكوين طبقة الانفصال كذلك أظهرت المعاملة بالتركيزين ١٣٠ و ٢٦٠ جزءاً في المليون اصفراراً بالأوراق كان ظاهراً بعد أربعة أيام من الرش وتناسبت شدته مع التركيز، إلا أن ذلك لم يؤثر في قوة النمو النباتي (Shellie ١٩٩٩)

المعاملة بمستحضرات المقاومة الطبيعية للأمراض

أدى رش نباتات الكنتالوب قبل الإزهار بمنشط الدفاع النباتي *acibenzolar-S-methyl* بتركيز ٥٠ جزءاً في المليون، مع غمر الثمار - بعد الحصاد - في المبيد الفطري *guazatine* بتركيز ٥٠٠ جزءاً في المليون عند الحصاد إلى الحد - كثيراً - من إصابة الثمار بالأعفان التي تسببها فطريات *Fusarium spp.* و *Alternaria spp.* و *Rhizopus spp.* و *Trichothecium sp.* ولقد كانت المعاملة بالـ *acibenzolar-S-methyl* - منفردة - فعالة جوهرياً في خفض شدة الإصابة في عديد من الحالات، ولكن ليس في جميعها وكان المبيد *guazatine* - منفرداً - فعالاً جوهرياً في خفض إصابة الثمار بالفئوزاريوم، ولكن تأثيره كان ضعيفاً على كل من الألترناريا والريزوبس (Huang وآخرون ٢٠٠٠).

كما أدت معاملة نباتات الكنتالوب بأى من الـ *benzothiadiazole* (اختصاراً: BTH)، أو *2,6-dichloroisonicotinic acid* (اختصاراً: INA) أثناء نموها إلى حماية الثمار بعد حصادها من الإصابة بالأعفان التي تسببها فطريات *Fusarium* و *Alternaria* و *Rhizopus*، فضلاً عن حماية النباتات من الإصابة بكل من البياض الدقيقي والبياض الزغبى (Bokshi وآخرون ٢٠٠٦).

الحصاد

يراعى عند حصاد الثمار والقاوون بأنواعه المختلفة، ما يلي :

الفصل الثالث. الكنتالوب (القاوون) والشمام

- ١- يُجرى الحصاد مرة كل يوم إلى ثلاثة أيام حسب درجة الحرارة السائدة حتى لا تصبح بعض الثمار زائدة النضج إذا طالت الفترة بين القطفات.
- ٢- يكون الحصاد عند بداية اصفرار الثمار، وليس قبل ذلك وهي خضراء (لأن الثمار الخضراء لا تتلون بعد القطف)، أو بعد بداية اصفرارها (لأنها سوف تصبح زائدة النضج). ولذا .. يجب إجراء الحصاد يومياً في الجو الحار حتى يكون الحصاد - دائماً - في بداية الاصفرار.
- ٣- يجرى الحصاد في الصباح الباكر، وينتهي قبل العاشرة أو الحادية عشرة صباحاً للاستفادة من انخفاض درجة الحرارة ليلاً في خفض تكلفة عملية التبريد الأولى.
- ٤- لا تجذب الثمار من النباتات، وإنما تُقص من أعناقها باستعمال مقصات القطف، وبحيث يتبقى نحو ٥,٠-٢,٠ سم من عنق الثمرة متصلاً بها، ويتوقف ذلك على الطراز الصنفى، حيث يبلغ الطول المناسب للجزء المتروك من العنق حوالى ٢ سم فى طراز الشارانتية، بينما يبلغ حوالى ٥,٠-١,٠ سم فى الطرز الأخرى.
- ٥- لا تحصد ثمار لأجل التصدير إلا من النباتات السليمة أما الثمار التى تحمل على نباتات ذابلة أو ميتة فإنها يجب أن تحصد مستقلة.
- ٦- تدريب العمال القائمين بعملية الحصاد، مع عدم تغييرهم أثناء الموسم.
- ٧- يقوم العمال المدربون على عملية الحصاد بالمرور على خطوط الزراعة مع تخصيص خط واحد لكل عامل منهم، ويقوم عمال آخرون باستلام الثمار منهم لتجميعها على الخطوط كل خامس خط، ثم تقوم مجموعة ثالثة من العمال بنقل الثمار سريعاً تحت مظلة فى الحقل.
- ٨- تجنب حماية الثمار من أشعة الشمس بعد الحصاد حتى نقلها من الحقل إلى محطة التعبئة.

نقل الثمار من الحقل إلى محطة التعبئة

من أهم الأمور التى يجب مراعاتها بين عملية الحصاد ونقل الثمار إلى محطة التعبئة، ما يلى.

تكنولوجيا وتهيئة لوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

- ١- تجمع الثمار وتترك عند كل خامس أو سادس خط من خطوط الزراعة
- ٢- تستعمل عبوات بلاستيكية كبيرة نسبياً في نقل الثمار من مكان تجميعها في الحقل إلى محطة التعبئة، ويجب ألا تزيد محتويات العبوة الواحدة عن ٢٠ كجم من الثمار
- ٣- عدم ترك الثمار معرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وهي على هذا الوضع ولا أثناء نقلها إلى محطة التعبئة، مع ضرورة وصول الثمار إلى محطة التعبئة في خلال ساعتين من حصادها على أكثر تقدير
- ٤- معاملة الثمار برفق أثناء وضعها في عبوات النقل البلاستيكية وأثناء تفريغها منها، لأن أي خدوش تتسبب فيها المعاملة الخشنة للثمار تؤدي حتماً إلى تقصير فترة صلاحيتها للتخزين
- ٥- يجب عدم نقل المحصول سائلاً في عربات الشحن، وإنما في صناديق بلاستيكية تحتوي على طبقتين فقط من الثمار، ويستثنى من ذلك ثمار طراز شهد العمل (الهنى ديون) نظراً لمتانة وصلابة قشرتها.

عمليات التداول

- إن مُجمل عمليات التداول لثمار الكنتالوب المعد للتصدير من طراز الجاليا، كما يلي
- ١- فرز جميع الثمار المشوهة والمتشققة، والمصابة بالأمراض، وغير المكتملة النمو، والزائدة النضج، والمجروحة إلخ، واستمرار عمليات التداول على الثمار المتبقية فقط.
 - ٢- الغسيل في ماء يحتوى على كلور بتركيز ١٥٠-٢٠٠ جزءاً في المليون
 - ٣- المعاملة باناء الساخن لمدة ١٥-٢٠ ثانية على حرارة ٥٦°م
 - ٤- التشميع بشمع يحتوى على مطهر فطري، أو على أقل تقدير معاملة عنق الثمرة بهذا الشمع
 - ٥- التجفيف قبل التعبئة
 - ٦- تعبئة الثمار حسب الحجم، علماً بأن الأحجام في الجاليا هي ٤، ٥، ٦، و ٨، ٩ ثمرات، و ١١ ثمرة بالكرتونة ومن الأهمية بمكان المحافظة على تجانس الحجم

الفصل الثالث - الكنتالوب (القاوون) والشمام

٧- التبريد الأولى - قبل التعبئة - بطريقة الدفع الجبرى للهواء إلى أن تنخفض حرارة الثمار إلى ٨-٦°م.

٨- تطهير الحاويات المبردة بالماء المضاف إليه الكلور بتركيز ١٠٠-١٥٠ جزءاً فى المليون.

٩- التعبئة فى الحاويات المبردة على حرارة ٦°م

إن الخدوش والجروح التى تنشأ من سوء معاملة ثمار الكنتالوب، أو إسقاطها من على ارتفاع، أو احتكاكها ببعضها البعض أثناء الشحن لا تُرى عند حدوثها، ولكنها تمثل منفذاً هاماً للفقد الرطوبى، كما يقابل المناطق المضارة بجلد الثمرة - والتى تصبح غائرة - مناطق مائية المظهر، سريعاً ما تتحلل، وتؤدى درجة الثمار واهتزازها أثناء النقل إلى انفصال البذور عن اللحم (Cantwell ١٩٩٦).

ومن بين الأمور التى يجب مراعاتها بشأن جوانب الصحة العامة فيما يتعلق - خاصة - بالصنوبر - ما يلى،

١- عدم الحصاد من الحقول التى تكثر فيها الحيوانات البرية ومخلفاتها.

٢- إعطاء أهمية خاصة لأجل تجنب تلوث الثمار ذات الجلد الشبكي، مع الاعتناء بتنظيفها جيداً.

٣- مراعاة عدم تلوث لب الثمرة من خلال الجزء المنفصل - جزئياً أو كلياً - من عنق الثمرة.

٤- مراعاة جوانب النظافة والصحة العامة من جانب العمال الزراعيين ووسائل التعبئة الحقلية، مع تجنب تجريح الثمار قدر الإمكان.

٥- إذا استخدم الماء البارد فى تبريد ثمار الكنتالوب، فإنه يجب أن يكون عالى الجودة من حيث خلوه من الميكروبات

٦- إذا ما أعيد استخدام ماء التبريد فإنه يجب أن يحتوى على مطهر بتركيز كافٍ لتقليل مخاطر التلوث الميكروبى

٧- يراعى عدم ترك الثمار فى الماء البارد والمحتوى على المطهر لفترة طويلة لأن ذلك

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

يزيد من فرصة وصول الماء الملوث إلى لب الثمرة من خلال ندبة العنق والجروح، خاصة وأن انخفاض حرارة الثمار - أثناء تبريدها أولياً - يؤدي إلى تقلص حجم الفراغات الموجودة فيها، مما يؤدي إلى اندفاع الماء بداخلها

٨- إذا أجرى التبريد الأولى بطريقة الدفع الجبرى للهواء يتعين تطهير الأجهزة المستعملة بصورة دورية، لتجنب تلوث الثمار (Produce Marketing Association and United Fresh Fruit and Vegetable Association - الإنترنت - ٢٠٠٥)

الفقد الأولي

تفرز الثمار بعد وصولها إلى محطة التعبئة، حيث تستبعد نهائياً الثمار المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك تفرز الثمار زائدة النضج، والمصابة بلفحة الشمس، والمتشققة، وغيرها من الثمار التى لا تتوافر فيها مواصفات التصدير القياسية، حيث توجه إلى التسويق المحلى

الغسيل والتطهير

يتم غسيل الثمار المفروزة أولياً بالماء العادى للتخلص مما يوجد عليها من أتربة، ومما قد يكون ملتصقاً بها من تربة، أو ماء جير، أو أى مواد أخرى. ويجرى الغسيل فى أحواض كبيرة، مع تغييره كلما ازدادت الشوائب.

ويلى ذلك مباشرة تطهير الثمار سطحياً من البكتيريا بغمرها فى ماء يحتوى على الكلور بتركيز ١٥٠-٢٠٠ جزء فى المليون. وتستعمل محاليل التبييض التجارية (مثل الكلوراكس) - التى تحتوى على هيبوكلوريت صوديوم، أو هيبوكلوريت كالسيوم بنسبة ٢ ٥٪ - كمصدر للكلور

وإذا كانت الثمار نظيفة ابتداء فإنه يمكن ضم عمليتا الغسيل والتطهير بالكلور معاً فى عملية واحدة بإضافة الكلور إلى ماء الغسيل ويراعى فى كلتا الحالتين تجديد الماء المضاف إليه الكلور على فترات

الفرز والتدريج

إلى جانب الثمار التي تستبعد في عملية الفرز الأولى، فإن الثمار تفرز مرة أخرى لاستبعاد ما قد يكون متبقياً في اللوط من ثمار غير صالحة للتسويق، ولفصل الثمار التي توجه للتسويق المحلي عن تلك التي توجه للتصدير، ولتدريج الثمار حسب الحجم، وتصنيفها حسب درجة التلوين، حيث لا يجب أن تعبأ في الكرتونة الواحدة ثمار تتفاوت كثيراً في الحجم، أو في درجة التلوين. ويوضح شكل (٣-٤)؛ يوجد في آخر الكتاب) عملية فرز، وتدريج، وتعبئة ثمار الكنتالوب الأمريكي في إحدى محطات التعبئة.

ومن أهم أسس عملية التدريج أن تتساوى أحجام (أوزان وأقطار) الثمار المعبأة في الكرتونة الواحدة، حيث يجب ألا يزيد المدى بين أصغر الثمار وأكبرها حجماً في الكرتونة الواحدة عن حد معين، علماً بأن عدد الثمار في كرتونة الجاليا يمكن أن يكون ٤، أو ٥، أو ٦، أو ٨، أو ٩ ثمرات، أو ١١ ثمرة (العدد المفضل هو الخمسات والستات)، وأن الوزن الصافي للكرتونة عند الوصول يجب أن يكون خمسة كيلوجرامات أو أكثر قليلاً عن ذلك (جدول ٣-٢)

جدول (٣-٢): مدى أوزان وأقطار ثمار الجاليا التي يجب تعبئتها في الكرتونة الواحدة، على اعتبار أن الوزن الصافي للكرتونة عند الوصول ٥ كيلو جرامات، وأن الوزن عند التعبئة يجب أن يكون حوالي ٥,٤ كجم لعمل حساب الفقد المتوقع في وزن الثمار أثناء الشحن.

المدى المسموح به في الكرتونة الواحدة

عدد الثمار بالكرتونة	متوسط وزن الثمرة (كجم)	لأقطار الثمار (مم)	لأوزان الثمار (كجم)
٤	١,٣٥٠	١٣٦-١٥٠	١,٢١٠-١,٤٥٠
٥	١,٠٨٠	١٢٤-١٣٦	١,٠٩٥-١,٢٠٠
٦	٠,٩٠٠	١١١-١٢٤	٠,٧٣٠-٠,٩٤٠
٨	٠,٦٧٥	١٠٥-١١١	٠,٦٣٠-٠,٧٢١
٩	٠,٦٠٠	٩٨-١٠٥	٠,٥٥٠-٠,٦٢٠
١١	٠,٤٩٠	٩٢-٩٨	٠,٤٠٠-٠,٥٤٠

تكنولوجيا وقسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

كذلك يمكن أن تفرز الثمار أو تدرج حسب محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية

و لضمان احتواء ثمار القاوون على حد أدنى من المواد الصلبة الذائبة الكلية، قامت إحدى الشركات (S A Scalime بفرنسا) بتصميم آلة يمكنها تقدير محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة الكلية آلياً - بطريقة الرفراكتوميتر - قبل تعبئتها تقوم هذه الآلة - التي تعرف باسم توب 84 ٨٤ Top بفحص ٢٣٠٠ ثمرة (أى حوالى طن ونصف الطن إلى طنين من الثمار) فى الساعة تقوم الآلة بأخذ عينة دقيقة يبلغ قطرها ١.٧٥ مم من كل ثمرة، تقدر فيها نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية آلياً، ثم تعيد العينة إلى مكانها فى الثمرة بطريقة لا يمكن معها ملاحظة مكانها وفى كل مرة تقوم الآلة بأخذ عينة من إحدى الثمار فإن جميع أجزاء الآلة التى تلامس تلك العينة يتم تنظيفها، وتطهيرها، وتجفيفها آلياً، بحيث يحافظ دائماً على الثمار من أى تلوث محتمل من ثمار أخرى فى اللوط

وبمجرد تقدير الآلة لنسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية فى الثمرة فإنها توجهها إلى واحدة من ثلاث درجات، هى:

١- ثمار لا تصلح للتسويق، وهى التى تقل فيها نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية عن ٨٪.

٢- ثمار تصلح للتسويق العادى، وهى التى تتراوح فيها نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين ٨٪ و ١٠٪.

٣- ثمار تصلح للتصدير، وهى التى تزيد فيها نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية عن ١٠٪ ويمكن زيادة مستوى المواد الصلبة الذائبة الكلية الذى تقوم الآلة بفصل هذه الدرجة من الثمار عنده إلى ١١٪ أو ١٢٪.

وتوضح - عادة - على ثمار الدرجة الأخيرة ملصقات خاصة تدل على ضمان جودتها؛ الأمر الذى يمكن معه عرضها للبيع بأسعار أعلى عن أسعار بيع الثمار التى لم تخضع لهذا الاختبار

ويمكن لهذه الآلة - فضلاً عن تقدير محتوى كل ثمرة من المواد الصلبة الذائبة الكلية - حساب متوسط المحتوى في لوط من الثمار، ومتوسط المحتوى في كل الثمار في كل يوم من أيام التشغيل.

التعبئة والعبوات

تستعمل في تعبئة ثمار طراز الجاليا كراتين تبلغ أبعادها $40 \times 30 \times 15$ سم وتتسع لنحو 4-9 ثمار حسب حجمها، ويتراوح محتواها الصافي من الثمار بين 4 و 5 كيلوجرامات لكل كرتونة. ويفضل أن يكون الوزن الصافي لكل كرتونة 5 كجم، وأن تحتوى على 5 أو 6 ثمرات

أما ثمار شهد العسل فتستعمل - غالباً - في تعبئتها كراتين تبلغ أبعادها $60 \times 40 \times 15$ سم، وتتسع لـ 5 ثمرات إلى 14 ثمرة حسب أحجامها، ويتراوح محتواها الصافي من الثمار بين 9 كيلوجرامات و 11 كيلوجراماً لكل كرتونة، ويفضل أن يكون الوزن الصافي لكل كرتونة 14 كيلوجراماً، وأن يحتوى على 5 أو 6 ثمرات.

ويجب أن تحتوى الكراتين على فتحات كثيرة من جوانبها تبلغ حوالى 70%-100% من مسطحها الخارجى لتسمح بسرعة إجراء عملية التبريد الأولى وسهولة تبادل الغازات بين داخل الكرتونة وخارجها. ويجب أن تكون فتحات التهوية بعيدة عن أركان الكرتونة وحوافها، لكى لا تؤدى إلى فقد الكرتونة لمئاتها.

كما يجب أن تكون الكراتين قوية لكى لا تنهار قبل وصولها إلى المستورد، علماً بأن الكراتين المعبأة تفقد خلال فترة شحنها وتخزينها فى رطوبة نسبية 90% حوالى ثلث متانتها. وتفضل الكراتين ذات الدعامات فى جوانبها. ويجب أن تكون بعمق كافٍ لمنع استناد الكراتين العليا على الثمار التى توجد فى الكراتين الأسفل منها.

ولحماية الثمار من الاحتكاك مع بعضها البعض توضع فواصل كرتونية بينها، تعمل على الحد من حركتها واهتزازها، وتمنع تلامسها معاً. ويجب وضع هذه الفواصل بطريقة لا تمنع انسياب حركة الهواء البارد داخل الكرتونة

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

يجب أن تحتوى الكراتين على فتحات متقابلة فى قاعدتها وقمتها لزيادة كفاءة عملية التبريد التى تستمر فى الحاويات (ال Containers)، وهى التى يكون مسار الهواء فيها من أسفل إلى أعلى bottom cold air delivery

وتفضل الأسواق المستوردة أن تكون الكراتين مفتوحة جزئياً ليتمكن رؤية الثمار من خلال الفتحات

يراعى عند التعبئة أن تكون ثمار كل كرتونة متجانسة فى الحجم، وفى درجة تلويثها، حتى لا يصبح بعضها زائد النضج فى محطة الوصول

يوضح على الجانب الصغير للكرتونة المعلومات الخاصة بالشحنة، مثل الصنف، والوزن، وعدد الثمار، وحجمها، واسم الدولة المصدرة، واسم المنتج أو المصدر، والظروف المناسبة التى يوصى بها لتخزين المنتج أما الجانب الكبير للكرتونة فيخصص للإعلان على المنتج المصدر

يجب رص الصناديق الكرتونية فى بالتات لحمايتها من التلف، ولكى تكون مستقرة فى موضعها أثناء الشحن وتثبت فى أركان كل بالتة زوايا معدنية، أو خشبية، ثم تربط الزوايا مع البالتة بالأشرطة البلاستيكية المقواة. ويجب عدم تغليف البالتة بالبلاستيك أو بالشباك البلاستيكية لأن بعض الدول تفرض رسوماً على هذه الشحنات بغرض التخلص من البلاستيك ومنع تلويثه للبيئة.

التبريد الأولي

تجرى عملية التبريد الأولي إما بالماء المثلج hydrocooling، وإما بطريقة الدفع الجبرى للهواء Forced Air Cooling وفى كلتا الطريقتين يجب أن تنخفض حرارة لب الثمار إلى ١٠°م، والأفضل وصولها فى القاوون الشبكى إلى ٥°م ويراعى الانتهاء من تبريد الثمار إلى ١٤°م فى خلال ٤ ساعات - على الأكثر - من حصادها، مع الاستمرار فى عملية التبريد الأولى - بعد ذلك - حتى وصول الثمار إلى الدرجة المطلوبة

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

يضاف إلى الماء الثلج المستعمل فى التبريد الكلور على صورة هيبوكلوريت صوديوم أو هيبوكلوريت كالسيوم بتركيز ١٥٠ جزءاً فى المليون من الكلور للتخلص من البكتيريا السطحية التى تلوث الثمار، ولتجنب انتقال تلك البكتيريا من الثمار المصابة بها إلى الثمار السليمة. ويستعمل كمصدر للكلور محاليل التبييض التجارية (مثل الكلوراكس)، وهى تحتوى على هيبوكلوريت صوديوم أو كالسيوم بنسبة ٥,٢٪.

يستعمل الماء الثلج فى تبريد الثمار المتقدمة فى النضج بالفعل، وخاصة من القاوون الشبكي، أما فى شهد العسل فإن التبريد بطريقة الدفع الجبرى للهواء يكفى فى جميع الحالات. وتستغرق عملية التبريد الأولى - عادة - حوالى ساعة عند التبريد بالماء الثلج، وحوالى ٤ ساعات عند التبريد بطريقة الدفع الجبرى للهواء، وبالمقارنة .. فإنه يلزم - عادة - ٢٤ ساعة لخفض حرارة الثمار - إلى الدرجة المرغوب فيها عند تركها فى الغرف المبردة.

وإذا كانت ثمار الكنتالوب فى مرحلة النضج الكامل عند حصادها فإنها يجب أن تبرد سريعاً بأى من طريقتى الدفع الجبرى للهواء أو الماء الثلج. ويكون التبريد سريعاً باستعمال الماء الثلج حيث لا يستغرق أكثر من ٢٠ دقيقة لخفض حرارة مركز الثمرة من ٣٥°م إلى ١٥°م، علماً بأن الفترة تزداد مع الثمار الكبيرة الحجم (Lester & Shellie ٢٠٠٤).

وإذا كانت ثمار الهنئ الديو غير ناضجة فإنها تبرد أولاً بطريقة الدفع الجبرى للهواء، أو تترك لتبرد فى المخازن المبردة، لكن سرعة التبريد ليست أمراً حتمياً فى حالة تلك الثمار. وفى كل الأحوال .. يجب أن تكون الثمار باردة قبل تحميلها فى الحاويات هذا .. إلا أن التبريد يجب ألا يصل إلى حدود معينة، وإلا أصيبت الثمار بأضرار البرودة، كما سيأتى بيانه تحت موضوع التخزين.

ويلزم تجفيف الثمار جيداً عند إجراء التبريد الأولى بطريقة الماء الثلج، وخاصة فى الأصناف الشبكية التى تحتفظ أنسجتها الشبكية الفلينية بالرطوبة عند غمرها فى الماء.

تكنولوجيا وتسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتفقد الثمار أثناء تبريدها أولاً بطريقة الدفع الجبرى للهواء جزءاً صغيراً من وزنها خلال عملية التبريد

ويعطى Tator & Elansari (١٩٩٨) جداول مفصلة توضح سعة التبريد Refrigeration Capacity التى تلزم لخفض حرارة القاوون إلى ٢، أو ٥، أو ١٠ م بواسطة الهواء البارد المدفوع جبرياً، خلال فترة تبريد تتراوح بين ساعتين، وأربع ساعات، عندما تتراوح درجة حرارة الثمار الابتدائية بين ٢٠، و ٣٥ م، وكذلك سعة التبريد التى تلزم لخفض حرارة الثمار إلى نصف حرارتها الابتدائية باستعمال الماء المثلج خلال فترة تبريد قدرها ٢٠، أو ٣٠ دقيقة

تسيولوجيا القاوون بعد الحصاد

النتفس وإنتاج الإثيلين

يزداد معدل نتفس ثمار القاوون بارتفاع درجة حرارة التخزين، كما يلي:

معدل النتفس (مجم CO ₂ /كجم/ساعة) فى طراز		
الحرارة (م)	القاوون الشبكي	شهد السمل
صفر (لا يوصى بها)	٣-٢	—
٥	٥-٤	٥-٣
١٠	٨-٧	٩-٧
١٥	٢٠-١٧	١٦-١٢
٢٠	٣٣-٢٣	٢٧-٢٠
٢٥	٧١-٦٥	٣٥-٢٠

ولحساب كمية الحرارة المنطلقة من الثمار بالنتفس يضرب معدل إنتاج CO₂/كجم فى الساعة فى ٤٤٠ للحصول على كمية الطاقة بالوحدات الحرارية البريطانية (Bru/طن/يوم، أو فى ١٢٢ للحصول على كمية الطاقة بالكيلو كالورى/طن مترى فى اليوم (Suslow وآخرون ١٩٩٨، و ١٩٩٨ب)

الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والشمام

ويتراوح إنتاج ثمار القاوون الشبكي من الإثيلين بين ٧ و ١٠ ميكروليتر/كجم في الساعة في حرارة ٢٠°م، وما بين ٤٠ و ٨٠ ميكروليتر/كجم في الساعة في حرارة ٢٠°م. أما شهد العسل فيكون إنتاج ثماره من الإثيلين في حرارة ٢٠°م ٨،٠ و ٥،٢ و ٢٧،١ و ٢٩،٤ ميكروليتر/كجم في الساعة في مراحل اكتمال التكوين، وبداية النضج، والنضج، وزيادة النضج، على التوالي.

ويؤدي تعرض ثمار القاوون الشبكي إلى مصدر خارجي للإثيلين إلى سرعة نضجها وطراوة أنسجتها.

ويتباين إنتاج ثمار الهني ديو من الإثيلين (بالميكروليتر/كجم في الساعة) حسبما إذا كانت الثمار كاملة، أم مجهزة للمستهلك، وحسب فئة اكتمال التكوين، كما يلي (عن Suslow وآخرين ٢٠٠٧).

الثمار	فئة اكتمال التكوين	معدل إنتاج الإثيلين	الحرارة (°م)
الكاملة	مكتمة التكوين وغير ناضجة	١٠-١٠,٥	٢٠
	مكتمة التكوين وتنضج	٧,٥-١٠	٢٠
	ناضجة	١٠-٧,٥	٢٠
المجهزة للمستهلك	مكتمة التكوين وتنضج	١٧-١٤	٥
	ناضجة	٢٥-٢١	٥

الكلايمكترك والتغيرات المصاحبة للشيخوخة

يحدث كلايمكترك تنفسى فى ثمار القاوون الشبكي عند بلوغها مرحلة النضج، أو قبل ذلك بقليل، بينما قد يستمر الكلايمكترك لعدة أيام فى ثمار القاوون الأملس، أو قد لا يحدث فيها أى كلايمكترك. ويرتبط الكلايمكترك التنفسى بتمثيل الإثيلين.

وقد أظهرت ثمار الصنف Galia 5 ارتفاعاً فى مستوى الإثيلين بين اليوم الثامن والثلاثين واليوم الأربعين من تفتح الزهرة، وتوافق ذلك مع ظهور اصفرار سريع فى جلد الثمرة وقد تناقصت صلابة الثمرة أثناء تكوينها ووصل محتوى الثمار من المواد الصلبة

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر النمرية - التداول والتخزين والتصدير

الدائبة الكلية في الصنف 5 Galia إلى ٨٪ بعد ٣٢ يوماً من تفتح الزهرة، وإلى ١٠٪ بعد ٣٧-٣٩ يوماً من تفتح الزهرة، بينما حدث ذلك في الصنف دورال Doral - وهو من طراز جاليا كذلك - بعد ٣٠-٣٢ يوماً، و ٣٦-٣٧ يوماً على التوالي (Moelich وآخرون ١٩٩٦)

وتنتج ثمار الكنتالوب الشبكي - وهي كلايمكتيرية - حوالى ١٠ إلى ١٠٠ ميكروليتر من الإثيلين لكل كيلوجرام في الساعة من اليوم الرابع السابق لبدء انفصال العنق إلى اليوم العاشر بعد الحصاد ويؤدى تعرض الثمار للإثيلين بعد الحصاد من مصادر خارجية إلى تقصير فترة الصلاحية للتخزين، وقد تصبح زائدة النضج، ويجب تجنب حدوث ذلك هذا علماً بأن معاملة الثمار غير المكتملة التكوين - بعد حصادها - بالإثيلين لا يؤثر فى نضجها، ولا فى تدهور خصائصها بعد الحصاد (Shelie & Lester ٢٠٠٤، و Suslow وآخرون ٢٠٠٧)

ويبدأ الكلايمكتريك فى طراز الشارانتية والأوجن قبل اكتمال النضج المناسب للحصاد بوقت طويل؛ الأمر الذى يفسر السبب فى ضعف القدرة التخزينية لهذه الثمار فى درجات الحرارة العادية

وبينما يظهر الكلايمكتريك التنفسى وكلايمكتريك إنتاج الإثيلين بوضوح فى ثمار الكنتالوب التى تكمل نضجها بعد الحصاد، فإن معدل تنفسها يبقى ثابتاً تقريباً إذا ما تركت لتنضج وهى متصلة بالنبات وبينما يرتفع معدل إنتاج الثمار للإثيلين حال نضجها وهى متصلة بالنبات، فإن الزيادة فى معدل تنفسها تكون أقل من نظيراتها التى تنضج بعد الحصاد ويبدو أن بقاء الثمرة متصلة بالنبات يشبط تأثيرات الإثيلين على تنفسها (Bower وآخرون ٢٠٠٢)

ويستدل من الدراسات التى أجريت على كل من أصناف الكنتالوب الكلايمكتريك وغير الكلايمكتريك أن كثيراً من مسارات النضج ينظمها الإثيلين (مثل تمثيل المركبات المتطايرة المسؤولة عن النكهة، والكلايمكتريك التنفسى، وفقد جلد الثمرة للونه

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

الأخضر)، بينما لا يتحكم الإثيلين فى مسارات أخرى (مثل بدء الكلايمكتيريك، وتراكم السكر، وفقد الحموضة، وتلون لب الثمرة) أما فقدان اللب لصلابته فإنه يتضمن خطوات تتأثر بالإثيلين وأخرى مستقلة عنه، وهو يرتبط بالجينات التى تتحكم فى تحلل الجدر الخلوية (Peach وآخرون ٢٠٠٨)

ويبدو مما يتجمع سنوياً من دراسات عديدة ومتنوعة على خطوات ومسارات النضج فى ثمار الكنتالوب أنه ربما يصبح - عما قريب - "موديل" نباتى - مثله فى ذلك مثل Arabidopsis والظماطم - وذلك فيما يتعلق بنضج الثمار (Ezura & Owino ٢٠٠٨)

وتتباين ثمار أصناف القاوون كثيراً فى مدى تبكيرها فى زيادة نشاط إنزيم ACC oxidase الذى يلزم لتمثيل الإثيلين، وقد وجد - على سبيل المثال - أن الصنف سيريو Sino كان أكثرها تأخراً فى ظهور نشاط هذا الإنزيم، مقارنة بستة أصناف أخرى، ووجد ارتباط بين التأخر فى ظهور نشاط الإنزيم والتأخر فى فقد الثمار لصلابتها أثناء نضجها (Aggelis وآخرون ١٩٩٧).

وتتميز بعض أصناف الكنتالوب (مثل Nicolás) بأن ثمارها غير كلايمكتيرية، وتلك تختلف اختلافاً كبيراً فى بروفيل المركبات العطرية التى تنتجها مقارنة ببروفيل المركبات العطرية التى تنتجها ثمار الأصناف الكلايمكتيرية (Obando-Ulloa وآخرون ٢٠٠٨).

وترجع الرائحة القوية لثمار الشارانتية إلى ما تنتجه من إسترات أليفاتية ومتفرعة (عن Flores وآخرين ٢٠٠٢).

هذا وتحدث أكثر التغيرات فى ثمار شهد العسل قبل اليوم الأربعين من تفتح الزهرة. وقد عُرِف اكتمال تكوين الثمار بحدوث تغيرات رئيسية فى مكونات الثمرة المسئولة عن الجودة، وهى الجلوكوز، والفراكتوز، والمكروز، والمحتوى الرطوبى، والصلابة، والكتلة، والحجم، ونشاط إنزيم ATPase - H^+ الخاص بالغشاء البلازمى فى نسيج تحت البشرة والميزوكارب (وهو لب الثمرة). ويحدث النضج قبل اليوم الخمسين من تفتح الزهرة، ويتحدد بحدوث تغيرات إضافية فى الصفات التى أسلفنا بيانها،

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وبانفصال الثمرة في اليوم الخمسين من تفتح الزهرة وتبدأ شيخوخة الثمرة بنقص في كل مكونات الجودة تقريباً، ونشاط الإنزيم $H^+ - ATPase$ ، والمحتوى البروتيني، وزيادة كبيرة في نسبة الاستيروولات الحرة الكلية إلى الفسفوليبيدات، وفي نشاط إنزيم lipoxxygenase في نسيج تحت البشرة والميزوكارب (Lester ١٩٩٨)

التغيرات الأيضية في الكنتالوب المحول وراثياً بهدف زيادة قدرة الثمار التخزينية

تُحصد ثمار الشارنتيه الملساء قبل نضجها، ولكنها تصبح زائدة النضج في خلال أيام قليلة، ويظهر ذلك على صورة طراوة زائدة واكتساب القشرة للون برتقالي ضارب للصفرة، وتدهور في الطعم، وانخفاض في محتوى السكر، وزيادة في قابلية الإصابة بالأعفان وقد أنتجت أصناف من هذا الطراز - محولة وراثياً - ذات قدرة عالية على التخزين، ولكنها غير مرغوب فيها تسويقياً لافتقادها إلى نكهة الشارنتيه. وعلى الرغم من ذلك فإن صفة القدرة التخزينية العالية تعد ضرورية لأن ثمار الشارنتيه لا تخزن أو تشحن في حرارة تقل كثيراً عن $10-12^\circ C$ (الحرارة التي تسود في حالات الشحن الجوي)؛ بسبب حساسيتها الشديدة لأضرار البرودة؛ وبذا لا يمكن اللجوء إلى الشحن البحري دون توفر صفة القدرة التخزينية العالية (عن Rodov وآخرين ٢٠٠٢).

وقد أمكن تحقيق ذلك، وإنتاج كنتالوب ذات ثمار غير حساسة لأضرار البرودة بعد أن تمكن Ayub وآخرون (١٩٩٦) من إنتاج نباتات شارنتيه محولة وراثياً تحتوي على المضاد الكودي antisense للجين ACC oxidase، وهو الجين المسئول عن تكوين المركب ACC (وهو 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid)، الذي يتحول إنزيمياً - مباشرة - إلى إيثيلين وقد كان إنتاج ثمار هذه النباتات المحولة وراثياً - من الإثيلين - أقل من ١٪ من إنتاج النباتات العادية، وتوقف نضجها سواء أكانت على النبات، أم بعد قطفها، ولكن أمكن إلغاء تأثير هذا التحول الوراثي بمعاملة الثمار بمصدر خارجي من غاز الإثيلين بتركيز ٥٠ جزءاً في المليون وقد أمكن تخزين الثمار المحولة وراثياً

الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والنشام

لفترة طويلة، ثم معاملتها بالإثيلين - لإنضاجها - قبل عرضها للاستهلاك بفترة وجيزة.

ولا تحدث في الثمار المحولة وراثياً تغيرات جوهريّة - مقارنة بالثمار العادية - فيما يتعلق باللونين الخارجى والداخلى وتتراكم المواد الصلبة الذائبة الكلية بمعدل واحد فى كل من الثمار المحولة وراثياً والثمار غير المحولة حتى اليوم الثامن والثلاثين بعد التلقيح، حينما تنفصل الثمار غير المحولة وراثياً عن أعناقها وبالمقارنة فإن الثمار المحولة وراثياً - التى لا تنتج الإثيلين - لا يتكون طبقة انفصال فى أعناقها، وتبقى متصلة بالنبات؛ ومن ثم يتراكم فيها كميات أكبر من السكريات، وخاصة السكروز ولكن يؤدى تأخير حصاد الثمار المحولة وراثياً إلى إنتاجها لكميات صغيرة - ولكن جوهريّة - من الإثيلين، ويكون ذلك مُصاحباً بليوننة فى لب الثمرة (Guis) وآخرون (١٩٩٧).

وتحدث فى هذه الثمار المحولة وراثياً عدة تغيرات أيضية أخرى، حيث يُثبّط تحلل الكلوروفيل فى قشرة الثمرة كلياً، ويتأخر كثيراً تدهور الأغشية الخلوية بها، ويبقى مستوى البولى أمينات وحامض الأبسيسيك فيها أعلى مما فى الثمار غير المحولة وراثياً (Flores وآخرون ١٩٩٨).

معاملات خاصة يعطاها الكنتالوب قبل التخزين والشحن

المعاملة بالماء الساخن

تعامل ثمار الكنتالوب بالماء الساخن؛ بهدف قتل الفطريات السطحية التى يمكن أن تؤدى إلى تعفن الثمار أثناء التخزين والشحن. وأفضل حرارة للمعاملة هى ٥٤°م لمدة دقيقتين، أو ٥٥°م لمدة ٣٠-٦٠ ثانية، أو ٥٦°م لمدة ٢٠ ثانية، أو ٦٠°م لمدة ١٢ ثانية فقط. وتعد ٦٠°م هى الحد الأقصى الحرارى الذى يمكن أن تتحملة ثمار القاوون الشبكي - مثل الجاليا والكنتالوب الأمريكى - عند معاملة الثمار بالماء الساخن غمرًا، أو رشًا

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وإلى جانب التأثير المباشر للماء الساخن على قتل الفطريات التى تلوث السطح الخارجى للثمار والتى تسرع بتعفنها أثناء الشحن والتخزين، فإن المعاملة تتضمن غالباً - كذلك - أحد المطهرات الفطرية التى تضاف إلى الماء الساخن يزيد الماء من فاعلية المبيد لأن الحرارة العالية تؤدي إلى تفتح المسام فى جلد الثمرة الخارجى، وبذا يزداد امتصاصه للمبيد

ويمكن أن تجرى المعاملة بغمر الثمار فى أحواض ممتلئة بالماء الساخن أو بمرور الثمار على رذاذ من الماء الساخن، مثلما يحدث عند إجراء التبريد الأوّى بالرش بالماء البارد

ومن الأهمية بمكان سرعة تبريد الثمار أولياً بمجرد انتهاء معاملتها بالماء الساخن

وقد أدى غمر ثمار الجاليسا فى الماء الساخن على حرارة ٥٢°م لمدة دقيقتين إلى حمايتها من الإصابة بالأعفان لمدة ٨ أيام على حرارة ٢٠°م ولم يحقق تسخين الثمار فى الأفران إلى حين بلوغ حرارتها السطحية ٥٢°م حماية مماثلة ضد الأعفان

وأدى تغليف الثمار بأغشية البولي فينيل كلوريد PVC بسك ١٢ ميكرون إلى منع فقد الثمار لرطوبتها، ولكنها أدت إلى زيادة الأعفان فى الثمار غير المعاملة بالماء الساخن

ولم تكن لمعاملة الغمر فى الماء الساخن أية تأثيرات على محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة الكلية، أو صلابتها، أو على إنتاجها من غاز الإثيلين وثانى أكسيد الكربون (Tettel وآخرون ١٩٨٩)

وقد تجرى المعاملة بتمرير الثمار وهى فى صناديق بلاستيكية (عبوات الحقل) على ماء ساخن تبلغ حرارته ٥٦°م لمدة ٢٠ ثانية، مع إضافة أحد المبيدات الفطرية المسموح باستعمالها ليزيد من كفاءة عملية التخلص من الفطريات المسببة للتعفن ويمكن أن يُستعمل لأجل ذلك المبيد ثيابندازول Thiabendazole (اختصاراً TBZ)، وهو يتوفر تجارياً كمبيد سائل تحت اسم تكتو Tecto، ويستعمل بتركيز ١٥ ٪، مع إضافة مادة ناشرة بمعدل ٣٠ جم/١٠٠ لتر ماء

الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والشمام

وتفيد إضافة شمع الكارنوبا Carnuba في محلول التطهير بمعدل ٦٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء، حيث يُحسن ذلك من مظهر الثمار، ويقلل فقدها للماء (Protrade ١٩٩٥).

كذلك يفيد غسيل ثمار الجاليا بالماء الساخن على $59 \pm 1^\circ\text{C}$ لمدة ١٥ ثانية، مع نغريشها في آن واحد في المحافظة على جودتها طوال فترة شحنها بحرياً، مقارنة بالثمار التي لا تعطى هذه المعاملة وقد أظهرت الدراسة أن تلك المعاملة أحدثت خفضاً قدره ٣ لو $\log 3$ في أعداد عشائر الكائنات الدقيقة التي تلوث الجلد سطحياً، وكان ذلك مصاحباً بإزالة للأتربة والجراثيم الفطرية من على سطح الثمرة، مع غلق جزئي أو كلي للفتحات الطبيعية بطبقة البشرة هذا وتجري هذه المعاملة آلياً بمعدل ٣ أطنان من الثمار في الساعة (Fallik وآخرون ٢٠٠٠).

وقد دُرس تأثير شطف وتغريش ثمار الكنتالوب بالماء الحار مع المعاملة بالكلورين على العدّ الميكروبي خارجياً على قشرة الثمرة وداخلياً باللب عند تجهيزها -fresh-cut لاستعمال المستهلك. غسلت الثمار وفرشت على 20°C أو 58°C (المعاملات التجارية)، أو 75°C لمدة ٢٠ ثانية، أو نقعت في محلول كلورين بتركيز ١٥٠ جزء في المليون لمدة خمس دقائق مع تغريشها يدوياً بعد ذلك وأعقب ذلك إما ترك الثمار كما هي، وإما تقشيرها وتقطيعها إلى أجزاء وتخزينها على 8°C أو 17°C لمدة أربعة أيام، أو على 5°C لمدة ١٣ يوماً وجد بعد أربعة أيام على 8°C أن أعداد *E. coli* على الكنتالوب المقطع المحضر من الثمار غير المعاملة كان 4×10^2 وحدة مكونة للمستعمرات لكل ملليمتر من قطع الثمار، بينما لم يمكن العثور على أي *E. coli* على القطع التي جهزت من ثمار غسلت وفرشت على 75°C لمدة ٢٠ ثانية، أما تلك التي جهزت من ثمار عوملت بالغسيل والتغريش على 20°C أو 58°C فكانت 6 ، و $3 >$ وحدة مكونة للمستعمرات لكل ملليمتر من قطع الثمار، على التوالي. كما لم يعثر على أي *E. coli* من قطع الثمار التي عوملت بالكلورين بتركيز ١٥٠ جزء في المليون لمدة خمس دقائق مع التغريش وبينما أُلغيت معاملة الماء الساخن على 75°C لمدة ٢٠ ثانية قشرة ثمار الكنتالوب التي خزنت دونما تقطيع، فإن تلك المعاملة لم يكن لها تأثير على

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

طعم ونكهة ولون وصلابة لب الثمار التي جهزت منها كمنتج (Fallik) fresh-cut وآخرون (٢٠٠٧)

وبينما تقضى المعاملة بالماء الساخن (على ٨٥°م لمدة ٣ دقائق) على الأطوار الخضرية من مسببات الأمراض (سواء أكانت تلك التي يمكن أن تسبب أعفاناً في المخازن، أم تلك التي يمكن أن تصيب الإنسان)، فإن تلك المعاملة ليست كافية بالقضاء على الأطوار الساكنة (الجرثومية) من البكتيريا التي يمكن أن تتواجد على أسطح ثمار الكنتالوب الشبكي، مثل جراثيم البكتيريا *Bacillus atrophaeus* هذا ولم تكن لمعاملة الكنتالوب الشبكي بالماء الساخن على ٨٥°م لمدة ٣ دقائق أية أضرار للحرارة خلال فترة أسبوعين من التخزين على ٥°م بعد المعاملة (Mahovic وآخرون ٢٠٠٨).

المعاملة بالمبيدات الفطرية والتشميع

أدت معاملة ثمار الكنتالوب الأمريكي بأى من المبيدات الفطرية فينابانيل Denapanil، أو إيمازاليل Imazalil أو بروكلوراز Prochloraz إلى مكافحة أعفان الثمار عفن فيوزاريوم، وعفن رايزوبس الطرى، وعفن جيوتريكم *Geotrichum Rot* (Wade & Morris ١٩٨٣).

كذلك أفاد غمر ثمار الكنتالوب الأمريكي فى محلول من sodiumdimethyldithiocarbamate (SDDC) بتركيز ٤٠٠٠ جزء، فى المليون لمدة ٣٠ ثانية فى تقليل أعفان الثمرة والجلد (التي يسببها فطرى الفيوزاريم والداياپورثى Diaporthe، وفطريات أخرى لم تُعرف) جوهرياً، وازدادت فاعلية المعاملة عندما كانت حرارة معلق المبيد الذى غمرت فيه الثمار ٥٧°م. كما كان للمبيد تأثير معاكس على طراز الجاليا عندما أضيف إلى الشمع تاج ١٦ Tag 16 الذى عوملت به الثمار (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

كما وجد Aharoni وآخرون (١٩٩٢) أن غمس ثمار الجاليا أو رشها بالإيمازاليل (allyl-1,2,4-chlorophenyl-2-imidazol-1-ylethylether) بتركيز ٢٥٠ جزءاً فى

الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والشمام

المليون من المادة الفعالة، ثم تشميعها كان له نفس كفاءة التشميع بالشموع المخلوطة بالإيمازاليل بتركيز ٢٠٠٠ جزء، في المليون في مكافحة الأعفان وتقليل الفقد الرطوبي. ولكنها لم تترك سوى ٠,٥ جزء في المليون من متبقيات المبيد على الثمار، مقارنة بنحو ٣-٥ أجزاء في المليون عن المعاملة بالمبيد في الشمع. كذلك وجد أن الجرعات المؤثرة في مكافحة أعفان الثمار من المبيدين اسبورتاك Sportak (يحتوى على بروكلوراز prochloraz)، و Opp (يحتوى على orthophenyl phenol) تقل كثيراً عند استعمالها في الماء بدلاً من خلطهما بالشمع.

كما أدت معاملة ثمار شهد العسل بالشمع ستروسيل Citrusel المخفف بالماء بنسبة ٥٠٪ حجماً بحجم إلى تقليل الفقد في الوزن بعد ٦ أسابيع من التخزين على حرارة ٣ أو ٦ م°، كما قللت المعاملة أضرار البرودة على حرارة ٣ م°، مقارنة بعدم التشميع. هذا إلا أن المعاملة لم تؤثر على إصابة الثمار بالأعفان، والتي كانت غالبيتها بسبب الإصابة بفطرى الألترناريا، والفيوزاريوم (Edwards & Blennerhassett ١٩٩٤).

كذلك أدى تشميع ثمار الجاليا بشمع يحتوى على ٢٠٠ جزء في المليون من الإيمازاليل Imazalil إلى حمايتها من الإصابة بالأعفان، وخاصة تلك التى يسببها الفطرين *Alternaria alternata*، و *Fusarium spp.*، كما يعمل الشمع ذاته على تقليل الفقد الرطوبي من الثمار وتكون متبقيات المبيد في الثمار المعاملة بهذه الطريقة حوالى ٣-٥ أجزاء في المليون من الإيمازاليل، بينما يزيد الحد المسموح به في بعض الدول الأوروبية عن ٠,٥ جزءاً في المليون.

وكبدل للمعاملة السابقة وجد Aharoni & Copel (١٩٩٥) أن استعمال مخلوط من الروفرال Rovral (يحتوى على إبروديون iprodione)، و TBZ (يحتوى على ثيابندازول thiabendazole) - كل بتركيز ١٠٠٠ جزء في المليون - في الشمع - كان أكثر كفاءة من الإيمازاليل

وأدى تشميع ثمار الجاليا بشمع يحتوى على بيكربونات الصوديوم بتركيز ٢٪ إلى

خفض الإصابة بالأعفان (بعد التخزين على حرارة 3°C لمدة ١٤ يوماً ثم على حرارة 20°C لمدة ٤ أيام) إلى النسبة المقبولة تجارياً وهي ٦٪-٧٪، مقارنة بالثمار غير المعاملة التي زادت فيها نسبة الأعفان بمقدار ٤-٧ أمثال كذلك حافظت المعاملة على مظهر الثمار الجيد هذا بينما أدت زيادة تركيز بيكربونات الصوديوم إلى ٣٪ إلى الإضرار بمظهر الثمار وقد اقترح أن تكون هذه المعاملة بديلاً عن معاملة استعمال الإيمازليل مع الشمع التي تترك متبقيات غير مسموح بها من المبيد

وتجدر الإشارة إلى أن تركيز بيكربونات الصوديوم الذي يشبط نمو الفطريات المسببة للأعفان في البيئات الصناعية كان ٠.٣٪ بالنسبة للفطر *Alternaria alternata*، و ٨٥٪ للفطر *Fusarium spp*، و ١,٣٥ للفطر *Rhizopus stolonifer* (Aharoni وآخرون ١٩٩٧)

ويمكن المحافظة على جودة ثمار الكنتالوب الجاليا بتشميعها بشموع لا تحتوي على shellac (مثل شمع نحل العسل) أو تحتوي على كميات قليلة منه (مثل الشمع البوليثليني Tag). علماً بأن شمع نحل العسل يحافظ على أفضل نكهة، ولكن الثمار المعاملة تفقد صلابتها وتكون أكثر عرضة للإصابة بالأعفان، بينما تحتفظ الثمار المعاملة بال Tag بكل مظاهر الجودة (Fallik وآخرون ٢٠٠٥).

المعاملة بمألاح الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكون

تمت معاملة ثمار الكنتالوب (الأمريكي الشبكي muskmelon، وشهد العسل الأملس) النامة النضج لمدة ٢٠ دقيقة على $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ في محاليل تحتوي على كالسيوم مخليبي أو مغنيسيوم مخليبي أو مخلوط منهما قبل تخزينها لمدة ١٠ أو ٢٤ يوماً على 4°C للكنتالوب الشبكي، و 10°C لشهد العسل أدت معاملة ثمار شهد العسل في أي من محلول الكالسيوم المخليبي أو الكالسيوم + المغنيسيوم المخليبي، وثمار الكنتالوب الشبكي التي عوملت بمحلول الكالسيوم + المغنيسيوم المخليبي قبل تخزينها لمدة ١٠ أيام إلى زيادة تركيز الكالسيوم في خلايا النسيج الوسطى تحت البشرة بما لا يقل عن ٦ بجم/بجم (وزن جاف) من الكالسيوم وقد ساعد ذلك في المحافظة على سلامة الأغشية الخلوية،

الفصل الثالث: الكنتالوب (القاوون) والشمام

وصلابة الثمار، وإلى زيادة فترة صلاحية الثمار للتخزين ٢.٤ ضعفاً (أى حتى ٢٤ يوماً). ولقد كانت النتائج مع شهد العسل أكثر وضوحاً بما كان عليه الحال مع الكنتالوب الشبكي، والتي بدا أن الشبك السطحى فيها يعوق نفاذ الكالسيوم إلى نسيج الميزوفيل (Lester & Grusak ١٩٩٩).

ووجد أن معاملة الكنتالوب بسيليكات الصوديوم بتركيز ١٠٠ مللى مول قبل عدوى الثمار بالفطر *Thichothecium roseum* أكسبتها مقاومة ضد الإصابة بالفطر، وكان ذلك مرتبطاً بزيادة فى نشاط عائلتين من الإنزيمات جراء المعاملة، هما البيروكسيديز، والشيتينيز (B1 وآخرون ٢٠٠٦).

المعاملة بمستحضات المقاومة الطبيعية

أحدثت معاملة ثمار الكنتالوب - بعد الحصاد - بالفمر فى محلول للمركب Harpin بتركيز قدره ٩٠ جزءاً فى المليون خفضاً جوهرياً فى الإصابة بالأعفان التى تسببها فطريات *Alternaria alternata*، و *Fusarium semitectum*، و *Thichothecium roseum*. وقد وجد أن المركب لم يكن له تأثير على تلك الفطريات فى البيئات الصناعية؛ بما يفيد حثه للمقاومة فى أنسجة الثمار (Yang وآخرون ٢٠٠٧).

المعاملة بالـ 1-MCP

كانت المعاملة المثلئ بالـ 1-methylcyclopropene (اختصاراً: 1-MCP) لتثبيط نضج ثمار الجاليا (صنف Trooper) هى بتركيز ٣٠٠ نانوليتراً/لتر لمدة ٢٤ ساعة على ٢٠°م، حيث أدت إلى تأخير التلون، والمحافظة على الصلابة، وتقليل الفقد فى الوزن. كذلك قللت هذه المعاملة جوهرياً من أضرار البرودة (على ٥°م)، والإصابة بالأعفان مقارنة بما حدث فى الثمار التى لم تُعامل وتلك التى عوملت بتركيز ١٥٠ نانوليتراً/لتر. هذا إلا أن معاملة الـ 1-MCP لم تثبط تقدم الشيخوخة فى الثمار التى قطفت فى مرحلة اللون الأصفر. وعندما كان حصاد الثمار المكتملة التكوين وهى مازالت خضراء فإن المعاملة بتركيز ٤٥٠ نانوليتراً/لتر أبطأت معدل النضج بعد الحصاد جوهرياً، مما جعل الثمار غير

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

مقبولة من حيث اللون والصلابة وقد أدت معاملة الـ 1-MCP للثمار التي حصدت في مرحلة اكتمال التكوين وهي بلون أخضر ضارب إلى الصفرة إلى تأخير بداية الكلايمكتيرك التنفسي وإنتاج الإثيلين بمقدار 8-9 أيام (Gal وآخرون 2006).

وقد دُرس تأثير معاملة ثمار الكنتالوب الأمريكي (المـ muskmelon) بالـ 1-MCP بتركيز ميكروليتر واحد/لتر لمدة 18 ساعة على 20°م، وذلك وهي في مراحل مختلفة من النضج عند الحصاد أدت معاملة الثمار قبل بدء نضجها - وقبل تخزينها على 15°م - إلى تثبيط ليونة الثمار مقارنة بما حدث في ثمار الكنتالوب التي لم تعامل بالركب وحتى 21 يوماً من التخزين كانت صلابة الثمار المعاملة ما زالت عند الحد الأعلى للمدى المقبول للصلابة؛ إذا كانت 70 نيوتن N، بينما المدى المقبول يتراوح بين 50، و 75 نيوتن وقد أظهرت الثمار التي عوملت بالـ 1-MCP انخفاضاً معنوياً في كل من إنتاج الإثيلين، ومعدل التنفس، والتسرب الأيوني طوال فترة التخزين وقد أحدثت المعاملة والثمار في مرحلتها نصف الانفصال والانفصال الكامل تأثيرات معادلة؛ حيث ثبتت ليونة الثمار خلال فترة تخزين استمرت عشرة أيام على 15°م (Jeong وآخرون 2007).

كذلك دُرس تأثير معاملة ثمار الكنتالوب بالـ 1-MCP بتركيز حجم واحد في المليون لمدة 24 ساعة على 20°م قبل تخزينها على 5°م، ثم جهزت من الثمار المعاملة مكعبات للمستهلك fresh-cut وخزنت لمدة 12 يوماً على 5°م. وقد أدت معاملة الثمار الكاملة بالـ 1-MCP إلى محافظتها على صلابتها أثناء التخزين وعدم تطويرها لأنسجة مائية المظهر كما حدث في ثمار الكنتالوب، والتي ظهرت بها تلك المناطق - وخاصة عند الطرف الزهري - حال تخزينها على 5°م هذا إلا أن تلك التأثيرات الإيجابية للمعاملة لم تكن ثابتة في كل الأصناف المختبرة، كما لم تؤثر المعاملة لا على لون اللحم أو محتواه من المواد الصلبة في أي من الثمار الكاملة أو في المكعبات المجهزة للمستهلك منها (Jeong وآخرون 2008).

معاملة ثمار الكنتالوب الأمريكي بمنظم النمو CPTA

يؤدي غمس ثمار القاوون الشبكي - وهي في مرحلة نصف الانفصال، أو الانفصال

الفصل الثالث. الكنتالوب (القاوون) والشمام

الكامل فى محلول CPTA (أو 2-4-chlorophylthiotriethylamide hydroxide) بتركيز ٥٠٠ أو ١٠٠٠ جزء فى المليون - إلى زيادة اللون الوردى بالثمار ويعتقد أن ذلك يرتبط بزيادة تكوين صبغة الليكوبين (عن Edmond وآخرين ١٩٧٥).

معاملات الحجر الزراعى

على الرغم من أن المعاملة بالماء الساخن تفيد كثيراً فى مكافحة أعفان ثمار القاوون أثناء الشحن والتخزين المبردين بعد ذلك، إلا أنها لا تفيد فيما يتعلق بمتطلبات الحجر الزراعى، ذلك لأن المعاملة تؤدى إلى التخلص من المسببات المرضية السطحية، بينما يتطلب الحجر الزراعى التخلص من الإصابات الثمرية الداخلية كذلك؛ الأمر الذى لا يمكن تحقيقه بمعاملة الماء الساخن، لأن إطالة فترة المعاملة لعدة دقائق على هذه الدرجة لكى ترتفع حرارة قلب الثمرة إلى ٦٠°م يؤدى حتماً إلى تلف الثمرة.

وقد كانت ثمار القاوون تعامل - لأغراض الحجر الزراعى - بثانى بروميد الميثايل، ولكن منع استعمال هذا المركب فى الولايات المتحدة، وحظر استعماله فى معاملة الثمار المنصورة إليها. وعلى الرغم من أن المعاملة بغاز بروميد الميثايل تفيد لأغراض الحجر الزراعى، إلا أنه يحدث تغيرات غير مرغوبة فى لون ثمار طراز شهد العسل (عن Lalaguna ١٩٩٨).

وقد وجد Lalaguna (١٩٩٨) أن معاملة ثمار الجاليا بأشعة جاما بجرعات وصلت إلى 1 kGy منعت تماماً أعفان الثمار لمدة ١٤ يوماً على حرارة ٢٣°م، وكانت المعاملة كافية لأغراض الحجر الزراعى. ولم تكن للمعاملة أية تأثيرات على محتوى الثمار من حامض الأسكوربيك، أو الحموضة المعايرة، أو المواد الصلبة الذائبة الكلية، أو الرطوبة كذلك لم تكن لمعاملة الثمار بالماء الساخن على حرارة ٥٣°م لمدة دقيقة فائدة فى زيادة فاعلية المعاملة بالإشعاع.

معاملة ثمار شهد العسل بالإيثيلين

تؤدى معاملة ثمار شهد العسل المكتملة التكوين Mature (الناضجة نباتياً) بالإيثيلين

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

بتركيز ١٠٠-١٥٠ جزء في المليون، لمدة ١٨-٢٤ ساعة في حرارة ٢٠°م، ورطوبة نسبية ٨٥٪ إلى سرعة وصولها إلى مرحلة النضج الاستهلاكي مع تجانس نضجها خلال ١٦-١٩ يوماً من التخزين على ٢٠.٥-٢٥°م، ويصاحب ذلك تحول السكريات المختزلة إلى سكروز، وتغير اللون الخارجى من الأخضر إلى الأصفر، وليونة جلد الثمرة وظهور النكهة المميزة وتجدر ملاحظة أن هذه المعاملة لا تفيد إذا جمعت الثمار قبل وصولها إلى مرحلة اكتمال النمو، كما أنها لا تلزم في حالة بدء وصول الثمار إلى مرحلة النضج (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨، و Protrade ١٩٩٥، و Suslow وآخرون ٢٠٠٧)

هذا ولم تعد المعاملة بالإيثيلين تجرى بصورة تجارية على ثمار شهد العسل في كاليفورنيا

التخزين

التخزين البارد العادى

(العوامل المؤثرة في القدرة التخزينية)

تتطلب زيادة القدرة التخزينية لثمار القاوون أن تراعى أثناء النمو النباتى الأمور التالية

- ١- تقليل الرى إلى أدنى مستوى له
 - ٢- خفض مستوى التسميد الآزوتى أثناء نمو ونضج الثمار، مع زيادة مستوى التسميد البوتاسى خلال المرحلة ذاتها
 - ٣- إعطاء اهتمام خاص للتسميد بالكالسيوم خلال الثلاثة أسابيع السابقة للحصاد، لأنه يفيد في تحسين تكوين الشبك وزيادة صلابة الثمار.
- كذلك تتطلب القدرة التخزينية للثمار مراعاة كل ما أسلفنا بيانه ابتداء من الحصاد حتى التعبئة

الظروف المناسبة للتخزين (ثمار القاوون)

نتناول بالشرح تحت موضوع التخزين الظروف المناسبة للمحافظة على جودة الثمار ونضارتها في كل طراز من الطرز التي أسلفنا بيانها وغنى عن البيان أنه يتعين المحافظة على سلسلة التبريد بداية من عملية التبريد الأولى - وهي التي يجب أن تجرى في خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات من الحصاد - حتى وصول الثمار إلى المستهلك.

وعلى الرغم من أن نضج ثمار القاوون يكون أفضل ما يمكن في حرارة ٢٠-٢٢°م، إلا أن احتفاظها بجودتها لأطول فترة ممكنة يتطلب تخزينها على حرارة أقل من ذلك بكثير.

وتخزن وتهجن ثمار القاوون في درجات الحرارة والرطوبة البسيطة التالية:

فترة التخزين

الطراز	الحرارة (°م)	الرطوبة النسبية (%)	(أسبوع)
الكنتالوب الأمريكي	٥-٢٥	٩٥-٩٠	٣-٢
الجاليا	٧-٥	٩٥-٩٠	٣-٢
شهد العمل	١٠-٧	٩٠-٨٥	٣-٢
الشارانتيه	١٠	٩٥-٩٠	٢
الكرانشو والفارسي	١٠-٧	٩٥-٩٠	٢
الكاسابا، والكناري، وسانفاكلوز	١٠	٩٥-٩٠	٣-٢

ويمكن تخزين الثمار الناضجة في درجات حرارة أقل من تلك المبينة أعلاه، حيث تعد الثمار الناضجة أقل تعرضاً لأضرار البرودة من الثمار الأقل نضجاً.

ويؤدي تخزين الثمار في درجات حرارة أقل من المبينة أعلاه لمدة ٧ أيام أو أكثر إلى تعرضها للإصابة بأضرار البرودة

وتعد الرطوبة النسبية العالية ضرورية لتجنب فقد الثمار لرطوبتها، ومن ثم ليونتها وفقدانها لصلابتها ولمعانها ويزداد فقد الماء من الجلد المجروح والشبك الذي تعرض

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

للاحتكاكات الشديدة وتشجع الرطوبة النسبية الأعلى من الحدود الموصى بها على تعرض الثمار للإصابة بالأعفان السطحية في كل طرز القاوون.

ولا تحتاج ثمار الهني ديو إلى عملية التبريد الأولى

وتتوقف درجة حرارة التخزين المناسبة للثمار الصليبي حيو على مرحلة نضج الثمار كما يلي،

١- الثمار الناضجة نباتيًا، والتي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الاستهلاكى، تتميز هذه الثمار بلونها الأبيض المائل إلى الأخضر الفاتح، ويوجد زغب رفيع على سطحها وبخلوها من أى رائحة وتعامل هذه الثمار أولاً بالإيثيلين فى حرارة ٢١°م على الأقل، ثم تبرد ببطء على مدى يومين أو ثلاثة أيام إلى ١٦°م، ثم على مدى ٣ إلى ٤ أيام أخرى إلى درجة ٧ إلى ١٠°م

٢- الثمار الناضجة نباتيًا، والتي بدأت الوصول إلى مرحلة النضج الاستهلاكى تتميز هذه الثمار بلونها الأبيض وسطحها الشمعى، وبدء ليونة أنسجتها فى الطرف الزهرى، وكذلك بدء ظهور رائحتها المميزة ولا تعتبر معاملة هذه الثمار بالإيثيلين ضرورية، ولكنها مفيدة فى التعجيل بالنضج توضع الثمار بعد المعاملة مباشرة فى حرارة ٧-١٠°م، ورطوبة نسبية تتراوح بين ٨٥٪ و ٩٥٪، حيث تبقى بحالة جيدة لمدة ٢-٣ أسابيع

٣- الثمار التى وصلت إلى مرحلة النضج الاستهلاكى : تتميز هذه الثمار بلونها الأبيض الكريمى، وسطحها الشمعى، وليونة طرفها الزهرى، وظهور رائحتها الجيدة المميزة. لا تعامل هذه الثمار بالإيثيلين، وإنما تخزن مباشرة فى ٧ إلى ١٠°م، ورطوبة نسبية تتراوح بين ٨٥٪ و ٩٥٪.

ويؤدى تخزين ثمار الهني ديو فى حرارة منخفضة لمدة طويلة إلى ظهور أعراض البرودة عليها، فتتعرض للتلف سريعاً بعد إخراجها من المخزن للتسويق، وتفقد صلابتها، وتحلل أنسجتها ويظهر بها طعم ونكهة غير مرغوبين، وتزداد سرعة ظهور أضرار البرودة بتخزين الثمار فى حرارة ٥°م أو أقل

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

وتتشابه ثمار الكرينشو، والكاسابا، والفارسي في سرعة تعرضها للإصابة بأضرار البرودة، وهي لا تُعامل بالإثيلين. وتخزن ثمارها الناضجة نباتياً - والتي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الاستهلاكي (المكتمة التكوين mature) في حرارة ١٠°م حتى تستكمل نضجها، ثم تخزن بعد ذلك في ٧° إلى ١٠°م مع رطوبة نسبية ٨٥٪ إلى ٩٥٪ (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨، و Yamaguchi ١٩٨٣، و Lester & Shellie ٢٠٠٤، و Suslow وآخرون ٢٠٠ و ٢٠٠٧).

يصاحب تخزين ثمار الكنتالوب الشبكي الأمريكي نقصاً في محتواها من مضادات الأكسدة الكاروتينات الكلية، والفينولات الكلية، وحامض الأسكوربيك (Ferrante وآخرون ٢٠٠٨).

وقد صاحب تخزين ثمار الصنف النباتي *C. melo var. inodorus* (شهد العسل، والكاسابا، والكناري) - التي تحصد في مرحلة اكتمال النمو البستاني - أثناء تخزينها لمدة ٣ أسابيع على حرارة ٧°، و ١٢°، و ١٥°م، ثم لمدة ٣ أيام على حرارة ٢٠°م، ما يلي.

- ١- لم تحدث تغيرات جوهرية في محتوى الثمار من المواد الصلبة الذائبة الكلية.
- ٢- انخفضت صلابة لب الثمرة دون أن يتأثر ذلك بدرجة حرارة التخزين.
- ٣- انخفض تنفس الثمار في جميع الأصناف خلال فترة التخزين.
- ٤- ازداد إنتاج الثمار للإثيلين أثناء التخزين، ولكن بدرجات متفاوتة حسب الصنف.

٥- فقدت الثمار أقل من ٣٪ من أوزانها بعد ثلاثة أسابيع من التخزين على حرارة ٧° أو ١٢°م، وحوالي ٤٪ عندما كان التخزين على ١٥°م.

٦- لم يتأثر المظهر الخارجى لثمار شهد العسل والكاسابا بدرجة حرارة التخزين، بينما أظهرت ثمار الأصناف الأخرى أعراضاً لأضرار البرودة أثناء التخزين البارد، وكذلك بعد نقل الثمار لحرارة ٢٠°م، وبدأ ظهور الأعراض في الثمار التي خزنت على ٧°م، ثم في تلك التي خزنت على ١٢°م، ثم في التي خزنت على ١٥°م (Miccolis & Saltveit ١٩٩٥).

أضرار البرودة

إن أهم أعراض أضرار البرودة في القاوون بطرزه المختلفة ظهور نقر سطحية ومناطق بلون أسمر ضارب إلى الحمرة، وأخرى غائبة في جلد الثمرة، وتكون طعم غير مرغوب فيه، وفشل الثمار غير الناضجة في إكمال نضجها، وظهور أعقان سطحية عليها

هذا وتباين أصناف الكنتالوب كثيراً في حساسيتها لأضرار البرودة (Yang وآخرون ٢٠٠٣)

وقد تراكمت كميات كبيرة من مركب ACC (وهو البادئ الذي يتكون منه الإثيلين) في ثمار شهد العسل خلال فترة أسبوعين ونصف الأسبوع من التخزين على حرارة ٢٠°م (وهي حرارة تحدث معها أضرار البرودة) وكان التركيز النهائي للمركب في جلد الثمار المخزنة في ٢٠.٥°م هو ١٥ نانو مولاً/جم، وهو تركيز بلغ ٧٠ ضعف التركيز الذي وجد في جلد الثمار التي لم تتعرض للبرودة كذلك ازداد تركيز المركب في أنسجة لب الثمرة التي تقع تحت الجلد في الثمار التي تعرضت للبرودة، ولكن ليس بالقدر ذاته مثل الزيادة التي حدثت في الجلد. وقد انخفض تركيز المركب تدريجياً بمجرد نقل الثمار إلى ٢٠°م، إلى أن عاد التركيز إلى مستواه عند الحصاد - وهو أقل من نانو مول واحد/جم - في خلال ٢٤ ساعة وبالمقارنة كان إنتاج الإثيلين وثاني أكسيد الكربون منخفضين على ٢٠°م، ولكنهما ازدادا سريعاً على حرارة ٢٠°م.

وقد أدت معاملة الثمار بالإثيلين بتركيز ١٠٠٠ جزء في المليون (١٠٠٠ ميكروليتر/لتر) لمدة ١٨ ساعة على حرارة ٢٠°م إلى انخفاض أضرار البرودة وانخفاض تراكم الـ ACC لدى تعريض الثمار لحرارة ٢٠.٥°م.

وكان تراكم الـ ACC في جلد ثمار شهد العسل مرتبطاً سلبياً بالاصفرار الشمسي Solar Yellowing للثمار (Lipton & Wang ١٩٨٧).

وقد تأكد وجود ارتباط عكسي بين شدة تعرض ثمار شهد العسل للإشعاع الشمسي أثناء تكوينها وبين قابليتها للإصابة بأضرار البرودة لدى تخزينها على حرارة ٢٠°م لمدة

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

١٧ يومًا، وتبين أن مستوى يادئ الإثيلين ACC كان منخفضًا عند الحصاد ولم يتأثر بشدة التعرض للإشعاع الشمسي، ولكن تقليل شدة التعرض للإشعاع الشمسي بنسبة ٥٠٪ أدى إلى مضاعفة تركيز الـ ACC خلال فترة التعرض للحرارة المنخفضة، ولم يؤدِ انتظليل الكامل إلى إحداث زيادة إضافية في مستوى الـ ACC بعد الحصاد والتخزين البارد. كذلك وجد أن مستوى الـ ACC في الجزء السفلي للملمس للأرض من جلد الثمرة كان أعلى دائمًا بعد الحصاد والتخزين البارد عما في جلد الجزء العلوي من الثمرة (Lipton وآخرون ١٩٨٧).

هذا ولم تصب ثمار الشارانتية المحولة وراثيًا بالـ antisense ACC oxidase - والتي تنتج أقل من ٥ ٪ إثيلين - لم تصب بأضرار البرودة (والتي تتمثل في النقر السطحية وتلون قشرة الثمرة rind باللون البني) أثناء تخزينها على حرارة ٢°م لمدة ٣-٤ أسابيع، مقارنة بالثمار غير المحولة وراثيًا. كذلك أدى تثبيط إنتاج الإثيلين في الثمار غير المحولة وراثيًا - قبل الكلايمكتيك - بمعاملتها بمركب 1-methylcyclopropene إلى عدم تعرضها لأضرار البرودة وكانت المقاومة لأضرار البرودة في الثمار التي تُبَطِّف فيها إنتاج الإثيلين مرتبطة بعدم قدرة الثمار على إنتاج الكحول الإيثيلي والأسيتالدهيد بمعدلات تؤدي إلى تراكمها في أنسجة الثمرة، وبعد تدهور خصائص الأغشية الخلوية خلال فترة التخزين البارد وتأكيدًا لذلك أدت معاملة الثمار المحولة وراثيًا بالإثيلين قبل تعريضها للحرارة المنخفضة إلى أصابتها بأضرار البرودة (Ben Amor وآخرون ١٩٩٨).

التخزين والشحن في الهواء المتحكم في مكوناته

يؤدي تخزين ثمار القاوون الشبكي في ٢-٥ ٪ أكسجين، و ١٠-٢٠ ٪ ثاني أكسيد الكربون إلى إبطاء نضجها وتقليل إصابتها بالأعفان، ويفضل الحد الأدنى لكل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، مع تخزين الثمار في حرارة ٣°م.

وعملياً . ترفع نسبة ثاني أكسيد الكربون بإطلاق ٢٠ كجم من الغاز في كل حاوية

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

(كونتينر) بطول ٤٠ قدم بعد غلقها ويراعى تفريغ الحاوية سريعاً بعد وصولها إلى محطة الوصول، حتى لا يحدث ضرر للثمار من الإيثيلين المتراكم فيها

و لا تستفيد ثمار شهد العسل كثيراً من التخزين في الجو العادل، ولكن إذا دعت الضرورة لتخزين الثمار لفترات طويلة تصل إلى أربعة أسابيع فإن التخزين يجب أن يكون في ٣٪ أكسجين، و ١٠-٢٠٪ ثاني أكسيد الكربون على حرارة ٧°م، حيث تؤدي هذه الظروف إلى إبطاء النضج، وانخفاض معدل التنفس، ومنع تكوين الأعفان على الثمار

ويؤدي تخزين ثمار القاوون الشبكي أو شهد العسل في نسبة أكسجين أقل من ١٪، أو نسبة ثاني أكسيد كربون أعلى من ٢٠٪ إلى تكوين روائح غير مقبولة، وطعم غير مرغوب فيه في الثمار، وعدم اكتمال نضج الثمار بصورة طبيعية وعلى الرغم من أن نسبة ثاني أكسيد الكربون الموصى بها تتراوح بين ١٠٪ و ٢٠٪ إلا أنه يصاحبها تكوين فقاعات كربونية في الثمار تختفى بمجرد نقل الثمار إلى الجو العادي (عن Loughheed ١٩٨٧، و Suslow وآخرين ٢٠٠٤).

كانت نوعية ثمار الجاليا التي خزنت في ١٠٪ ثاني أكسيد كربون، و ١٠٪ أكسجين - مع مادة ماصة للإيثيلين - لمدة ١٤ يوماً على حرارة ٦°م، ثم لمدة ٦ أيام أخرى على حرارة ٢٠°م كانت نوعيتها أفضل جوهرياً عن ثمار المقارنة، والثمار التي خزنت في الهواء المتحكم في مكوناته فقط. كذلك كانت الثمار التي خزنت في الهواء المتحكم في مكوناته مع المادة الماصة أكثر صلابة وأقل إصابة بالأعفان من ثمار المعاملتين الأخريتين (Aharoni وآخرون ١٩٩٣).

التخزين والنشحن في الهواء المعدل

تغليف (الثمار) المفرودة

يؤدي تغليف الثمار - كل على انفراد - إلى تعديل الهواء المحيط بها، حيث يؤدي تنفس الثمار إلى سرعة خفض تركيز الأكسجين، وزيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

الفصل الثالث الكنتالوب (القاوون) والشمام

كذلك يؤدي التغليف إلى خفض الفقد الرطوبي من الثمار، ولكنه يزيد من احتمالات إصابتها بالأعفان.

وقد وجد Mayberry & Hartz (١٩٩٢) أن غمر ثمار الكنتالوب الأمريكي في الماء الساخن على حرارة ٦٠°م لمدة ٣ دقائق مع تغليف الثمار - كل على حدة - في أكياس بلاستيكية، أو تبطين الكراتين سعة ١٨ كجم بكيس بلاستيكي كبير حافظ على الثمار من الإصابة بالأعفان وقلل فقد الرطوبة منها، وأبقى على مظهرها الجيد لمدة ٢٨ يومًا من التخزين على ٣°م، ولم تكن للمعاملة بالإيمازاليل - بالإضافة إلى الماء الساخن - فائدة إضافية جوهرية في منع الإصابة بالأعفان.

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد تخزين ثمار الكنتالوب الأمريكي على حرارة ٤°م ورطوبة نسبية ٨٥٪-٩٥٪ لمدة ٢٠ يومًا يفقدها ٥,٧٪ من وزنها نتيجة لفقد الماء منها، ويكون ذلك مصاحبًا بنقص مماثل في صلابة الثمار، بينما لا تفقد الثمار المغلفة بالأغشية التي تلتصق بها shrink film-wrapped - والمخزنة تحت نفس الظروف - سوى ٠,٦٪ من وزنها بعد ٣٠ يومًا من التخزين.

وقد أدى تغليف ثمار الشارانتية - كل على انفراد - في الأغشية البلاستيكية إكستند Xtend (وهي أغشية منفذة بدرجة عالية لبخار الماء، ويمكن التحكم في نفاذيتها لغازي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون باختيار الغشاء المنفذ بالدرجة المطلوبة) . أدى تغليفها إلى تأخير وصولها إلى مرحلة زيادة النضج، وما يصاحب ذلك من تغيرات غير مرغوب فيها، مثل فقد الثمار لصلابتها والتغيرات الشديدة التي تحدث فيها في لون الجلد، ولتدهور الطعم، وظهور الأعفان وحُصِّلَ على أفضل النتائج عندما خزنت الثمار المغلفة في حرارة تتراوح بين ٧ و ١١°م (Rodov وآخرون ١٩٩٨)

تغليف كل ثمار (الكرتونة معًا)

يمكن زيادة القدرة التخزينية للثمار بتعبئتها - وهي مبردة إلى ٥°م - في أكياس بلاستيكية يُفْرَغ منها الهواء بشطفه بواسطة مكنسة كهربائية وتستعمل أكياس تسع كل

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ثمار الكرتونة (٥-٦ ثمار) معاً تجرى عمليتا التعبئة فى الأكياس وتفرغ الهواء فى حجرات مبردة إلى ١٠°م، ويعقب ذلك مباشرة وضع الكراتين فى حرارة ٥°م أثناء التخزين والشحن، يفيد ذلك فى تعديل الهواء المحيط بالثمار، حيث يؤدى تنفسها إلى سرعة خفض تركيز الأكسجين، وزيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون.

وتتبع هذه الطريقة مع ثمار طراز الجاليا على نطاق تجارى واسع فى أمريكا الوسطى، حيث تصل الثمار إلى أوروبا فى خلال ١٥ يوماً وهى بحالة جيدة وبعد وصول الشحنة تُزال الأكياس البلاستيكية وتعاد تعبئة الثمار فى الكراتين مع وضع حواجز كرتونية بينها.

كذلك يمكن تبطين العبوات بأغشية الفينيل vinyl liner قبل تعبئتها بالثمار المبردة إلى ٥°م، ثم سحب الهواء منها.

وأدت تعبئة ثمار الشارانتية الأملس فى أكياس الـ Xtend المعدلة للجو (توضع عبوة الكرتونة كلها داخل كيس واحد فيبدو مبطناً للجدار الداخلى للكرتونة) إلى زيادة فترة احتفاظ الثمار بجودتها بتأخير وصولها إلى مرحلة النضج الزائد وقد تحققت أفضل النتائج (أطول تأخير فى الوصول إلى مرحلة النضج الزائد) عندما تكون الهواء المحيط بالثمار من ١٣٪-١٤٪ ثانى أكسيد الكربون، مع ٧٪ إلى ١٠٪ أكسجين، على الرغم من ارتفاع تركيز الإثيلين إلى ١٢٠ ميكروليتر/لتر. ولقد احتفظت ثمار الشارانتية التى عُبئت بهذه الطريقة على ٦-٧°م بجودتها لمدة ١٢ يوماً بالإضافة إلى ثلاثة أيام أخرى على ٢٠°م وبالمقارنة بالشحن الجوى التجارى فإنه لا تزيد فيه فترة صلاحية الثمار للاستعمال عن ٣-٥ أيام على ١٠-١١°م + ٣ أيام على ٢٠°م. وقد تحقق الجو المعدل المذكور أعلاه باستعمال أغشية Xtend بها تثقيب خفيف (تثقيب كلى قدره ٢٥ × ١٠٪ من سطح الغشاء)، ومع وضع ٨-٩ ثمار ذات وزن كلى حوالى ٥ كجم بكل كرتونة ويسمح ذلك بشحن الشارانتية بطريق البحر (Rodov وآخرون ٢٠٠٢).

التصدير

أسواق التصدير والطرز المطلوبة

تمثل أسواق غرب أوروبا أكبر الأسواق المستوردة للقاوون في العالم، يليها بفارق كبير في حجم الأسواق، كلا من منطقة الخليج العربية واليابان. ويزداد الطلب على الجاليا في أوروبا خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس.

يعتبر طراز الجاليا هو الطراز المفضل لدى غالبية المستهلكين الأوروبيين، وخاصة في ألمانيا، وإنجلترا، وهولندا، وتفضل منه الأصناف التي يمكن تخزينها لفترة طويلة Long Shelf Life أما فرنسا فإنها تفضل طراز الشاراتيه وبالمقارنة تفضل أسواق إسبانيا والبرتغال طراز البيل دي سابو.

وفي الفترات التي لا تتوافر فيها الطرز المحببة للمستهلكين فإن الأوروبيون يقبلون على القاوون الأمريكي، وشهد العسل الأصفر، والتي ترد إليهم من البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية خلال شهور الشتاء كذلك دخلت فنزويلا والبرازيل بقوة في المنافسة على تصدير الجاليا إلى أوروبا خلال فصل الشتاء وغمرت الأسواق الأوروبية منذ عام ١٩٩٨ بكميات هائلة من المحصول.

مقاييس الجودة

بداية .. يتعين التعرف على العيوب الهامة للثمار؛ ليتمكن فرزها واستبعادها قبل التصدير.

ومن أهم عيوب الكنتالوب الهيكلي (الأمريضي والجاليا)، ما يلي،

- ١- عدم نضج الثمرة (حصاد الثمار وهي ما زالت خضراء اللون خارجياً).
- ٢- زيادة نضج الثمرة (اللون برتقالي وطرية).
- ٣- وجود بقع غائرة على سطح الثمرة نتيجة حدوث أضرار بالجلد وفقد الماء من الأماكن المضارة.
- ٤- تغير لون أجزاء من جلد الثمرة بسبب لسعة الشمس أو حدوث خدوش بها.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضراوات الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

- ٥- التلون البنى بين الشبك vein track browning، الأمر الذى يحدث بفعل التعرض للحرارة العالية عند الحصاد.
- ٦- طراوة جزء الثمرة الذى كان ملاصقاً للأرض قبل الحصاد، مع احتفاظه بلون أخضر وضعف تكوين الشبك فيه، مع زيادة مساحته
- ٧- الخدوش والجروح التى تحدث جراء سوء التداول وإسقاط الثمار من مسافة تزيد عن ٦٠ سنتيمتراً
- ٨- وجود أعقان عند طرف العنق أو أعلى سطح الثمرة.
- ٩- انفصال البذور عن اللحم (shaker melons).

أما أهم عيوب الكنتالوب همصد العسل، فقص، كحما يلى،

- ١- أن تكون الثمار غير مكتملة التكوين أو زائدة النضج
- ٢- وجود تلطخات بنية brown blotches، وهو عيب فسيولوجى يتميز بوجود مناطق بنية واضحة الحدود على سطح الثمرة.
- ٣- وجود أعقان على سطح الثمرة
- ٤- وجود انهيار داخلى باللب نتيجة إسقاط الثمار وحدوث أضرار بها.
- ٥- فقد الماء من الثمار غير المكتملة التكوين؛ الأمر الذى يفقدها تمام الاستدارة (Cantwell ١٩٩٦).

ويجب إخضاع جميع شحنات الكنتالوب المصدرة لاختبارات مقاييس الجودة Quality Standards، بهدف التأكد من مطابقتها للحدود الدنيا المسموح بها من تلك المقاييس؛ الأمر الذى يعرف باسم التحكم فى الجودة Quality Control

وتتضمن مقاييس الجودة الصفات التالية:

- ١- اللون الأساسى ground color للثمرة.
- يجب أن يتراوح اللون الأساسى لجند الثمرة (بين الشبك) بين الأخضر الضارب إلى الصفرة والأصفر الضارب إلى الخضرة، ويسمح بوجود ثمرة واحدة ذات لون أخضر فاتح

الفصل الثالث الكنتالوب (القأوون) والشمام

أو أصفر بكل كرتونة، وذلك عند الشحن بطريق البحر أما عند الشحن الجوى فإن لون الثمار يجب أن يتراوح بين الأصفر الفاتح والأصفر ولا يسمح بوجود أكثر من ثمرة واحدة مخالفة في اللون لما سبق بيانه في الكرتونة

٢- عدد الثمار في الكرتونة:

يجب أن يتطابق عدد الثمار الموضح على الكرتونة من الخارج مع العدد الفعلى الموجود فيها. والذى يكون ٤، أو ٥، أو ٦، أو ٨، أو ٩، أو ١١ ثمرة (يراجع لذلك جدول ٢-٣).

٣- شكل الثمرة:

يجب أن تكون جميع ثمار الكرتونة الواحدة ذات شكل جيد مطابق للمصنف، ويسمح بوجود ثمرة واحدة مخالفة في الشكل

٤- تكوين الشبك:

يفضل أن يغطى الشبك الجيد التكوين بين ٩٦٪ و ١٠٠٪ من سطح الثمرة، ويسمح بأن يتراوح السطح المغطى بالشبك في كل ثمرة بين ٨٥٪ و ٩٥٪.

٥- محيط الثمرة:

يفضل ألا تتجاوز الاختلافات في محيط الثمرة بين ثمار الكرتونة الواحدة ٢٥ ملليمترًا، ويسمح بثمرة واحدة تتجاوز الحدود بمقدار ٢٦-٣٥ ملليمترًا فقط.

٦- نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية:

يجب أن تتراوح نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS (Brix) في ثمار الكرتونة الواحدة بين ١٠٪ و ١٤٪، ويسمح بوجود ثمرة واحدة يقراوح محتواها بين ٩,٥٪ و ١٠٪، أو بين ١٤٪ و ١٦٪.

٧- الندوب Scars:

يفضل ألا تزيد مساحة الندوب عن ٣٪ من سطح الثمرة، ويمكن أن يسمح بها حتى ٥٪.

٨- لسعة الشمس Sunscald، والتضليع الشديد Severe Ribbing، والأضرار الحشرية Insect Damage، وأضرار الطيور Bird Damage، والأضرار الميكانيكية Mechanical Damage.

لا يسمح بأى نسبة من تلك العيوب والأضرار.

٩- قطر الطرف الزهرى الخشن للثمرة:

يجب ألا يزيد قطر الجزء الخشن من الطرف الزهرى للثمرة عن ٤ سم، ويسمح بثمرة واحدة يتراوح فيها قطر هذا الجزء الخشن بين ٤، و ٦ سم

١٠- مساحة مكان تلامس الثمرة مع الأرض:

يجب ألا يزيد قطر تلامس الثمرة مع الأرض Ground Spot عن ٤ سم، وألا يكون لون ذلك الجزء مخالفاً بصورة شديدة للون بقية الثمرة، ويسمح بوجود ثمرة واحدة فى الكرتونة يكون فيها قطر تلك المساحة بين ٤، و ٦ سم، مع استمرار شرط عدم اختلاف لونه بصورة شديدة عن لون بقية سطح الثمرة.

١١- طول عنق الثمرة:

يجب أن يتراوح طول عنق الثمرة بين ٥ سم، و ١٠ سم (فى ثمار الجاليا) ويسمح بوجود ثمرتين فى كل كرتونة يقل فيهما طول عنق الثمرة عن ٥ سم، أو يزيد حتى ٢٠ سم

١٢- صفات اللب

يجب أن يكون لب الثمار متماسكاً، وذا لوان أخضر فاتح، وألا تحتوى الثمار على تجويف داخلى، أو بذور سائبة، أو سوائل، ويسمح بوجود ثمرة واحدة يكون فيها تجويف داخلى لا يزيد عن ١٥ مم، وقليل جداً من السوائل.

١٣- الأعفان Decay، و التفلاقات Splits، والموزايك Mosaic.

لا يسمح بوجود أى نسبة من تلك العيوب

١٤ - الخدوش Bruises

يجب عدم وجود أى نسبة من الخدوش، ويسمح بوجود ثمرة واحدة فى الكرتونة يكون فيها خدشاً سطحياً لا يصل إلى اللحم، ولا يزيد قطره عن ١٠ مم.

١٥ - التشققات Cracks

يجب خلو الثمار من التشققات ويسمح بوجود ثمرة واحدة فى الكرتونة يكون بها شق واحد ملتئم ولا يزيد طوله عن ١٠ مم (عن مشروع استخدام ونقل التكنولوجيا الزراعية بتصرف)

الكنتالوب المجهز للمستهلك

التجهيز للمستهلك وما تجب مراعاته بهذا الشأن

تصلح ثمار الهنى ديو التى تقطف من أعناقها أو وهى فى مرحلة نصف الانفصال وبها ١١٪-١٢٪ مواد ذائبة للتجهيز للمستهلك fresh-cut. يُختار الصنف المناسب فيما يتعلق بمحتوى ثماره من السكر، وصلابة لبه وسمكه. تغسل الثمار وتطهر سطحياً فى محلول ٢٠٠ جزء فى المليون (٢٠٠ ميكروليتر/لتر) من ٥,٢٥٪ هيوكلوريت الصوديوم على ٥°م، و $pH = 6,5 - 7$ لمدة خمس دقائق، ثم تقطع إلى مكعبات باستعمال شفرات حادة جداً. ويلى ذلك شطف المكعبات فى محلول ١٥٠ جزءاً فى المليون من ٥,٢٥٪ هيوكلوريت الصوديوم على ٥°م لمدة ٣٠ ثانية. يمكن لتلك المكعبات أن تحتفظ بصفاتها الأكلية الجيدة لمدة ٦-١٠ أيام على ٥°م.

وفيقيد تعديل الهواء إلى ٥٪ أكسجين + ٥٪ ثانى أكسيد كربون فى الحد من النمو الميكروبى، وفقدان الصلابة، والتغيرات الأخرى فى صفات الجودة (Lester & Shellie, ٢٠٠٤).

وتجهز ثمار الكنتالوب الشبكي للمستهلك بنفس الطريقة، مع اختيار الأصناف ذات اللب القوى السميك المرتفع فى نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية، وحصاد الثمار فى

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

أبكر مراحل النضج المقبولة للاستهلاك، وهى مرحلة نصف الانفصال أو ثلاثة أرباع الانفصال (Shellie & Lester ٢٠٠٤، و Beaulieu & Lea ٢٠٠٧)

وفى كل طرز الكنتالوب يمكن استبعاد أجزاء لحم الثمار التى تقابل أجزاء السطح التى تكون مصابة بلسعة الشمس أو بها عيوب أخرى سطحية، وتقطع باقى اللب إلى كميات يعد هذا الإجراء ضرورياً لأن اللب غالباً ما يكون أقل جودة مقابل تلك العيوب السطحية (Cantwell & Portela ١٩٩٨)

وبرامى محد تصير الكنتالوب للمصطلح fresh-cut - بصورة عامة - ما يلى،

١- يفضل عدم تجهيز الأجزاء السليمة من الثمار المصابة جزئياً أو التى يوجد بها أضرار واضحة فى أجزاء منها

٢- يجب استبعاد أجزاء الثمار المقابلة للبقع السطحية المصابة بلسعة الشمس أو التى تكون البقعة الملامسة للأرض فيها كبيرة وطرية.

٣- تغسل الثمار جيداً بماء ذا نوعية جيدة ويقل فيه الحمل الميكروبي كثيراً، مع مراعاة استخدام تركيز مناسب من أحد المطهرات، فذلك - وحده - كفى بخفض الحمل الميكروبي على جلد الثمرة بمقدار ٢-٣ لوغاريتم للوحدات المكونة للمستعمرات CFU. وفى كل الأحوال يجب أن نتذكر أن الغسيل والتطهير السطحي لا يمكن أن يودى إلى التخلص التام من التلوث الميكروبي للثمار

٤- يفضل إجراء التطهير السطحي للثمار بالماء الساخن.

٥- ضرورة تطهير شفرات التقطيع بصورة منتظمة.

٦- سرعة تبريد قطع الثمار بعد تجهيزها إلى صفر-٥°م مع بقائها على تلك الدرجة أثناء الشحن والتوزيع، علماً بأن الكنتالوب المجهز للمستهلك لا يكون حساساً لأضرار البرودة الكاملة (Produce Market Association & United Fresh Fruit Association - الإنترنت - ٢٠٠٥)

ولقد أمكن إنتاج صنف من الكنتالوب الشبكي الأمريكى (المuskmelon)، يتميز

بصلابته الفائقة (ultra-firm)، ويناسب التجهيز الطازج للمستهلك خلال فصل الشتاء، حيث أمكن تخزين الثمار لمدة خمسة أسابيع على 1°C في ظروف جو معدل، وأعقب ذلك تجهيزه للمستهلك fresh-cut وتخزينه لمدة ١٤ يومًا في الهواء على 5°C حيث استمر في المحافظة على جودته (الصلابة = $\text{N}51$ ، والمواد الصلبة الكلية $< 12\%$ ، والبيتاكاروتين = 18 مجم/كجم ، وحامض الأسكوربيك = 182 ملليجرام/كجم)، ولم تظهر أى علامة على شفافية اللب أو التنقيير السطحى، على الرغم من ازدياد الحمل الميكروبي إلى $< 11 \text{ لو.كجم}$ (Lester & Saftner ٢٠٠٨، و Saftner & Lester ٢٠٠٩).

أهمية استخدام الشفرات الحادة فى التقطيع

تم تجهيز قطع كنتالوب (اسطوانات) بقطر ١,٨ سم وطول ٣,٥-٤ سم باستخدام ثاقبات فلين من الصلب الذى لا يصدأ وبحافة حادة أو غير حادة (باردة)، وخزنت لمدة ١٢ يومًا في الهواء على 5°C . ولقد حافظت القطع التى جهزت بالثاقبات الحادة على مظهرها الجيد لمدة ستة أيام على الأقل، بينما كانت القطع المجهزة بالثاقبات غير الحادة غير مقبولة قبل اليوم السادس بسبب ما ظهر عليها من تغيرات لونية وشفافية. هذا ولم تؤثر حدة الثاقبات على أى تغيرات فى التحلل أو الصلابة أو محتوى السكر أو النكهة، ولكن القطع التى استعمل فى تحضيرها ثاقبات باردة ازداد فيها تركيز الإيثانول والطعم غير المقبول والتعرب الأيونى مقارنة بما أظهرته القطع التى استعمل فى تحضيرها ثاقبات حادة. وكان معدل التنفس على 5°C متماثلًا فى كلتا الحالتين، إلا أن إنتاج الإثيلين كان أعلى - أحيانًا - فى القطع التى استعمل فى تحضيرها ثاقبات ذات حافة غير حادة (Portela & Centwell ٢٠٠١).

المعاملة بأملاح الكالسيوم ومضادات الأكسدة

تفيد عمومًا معاملة الخضر والفاكهة الطازجة المعدة للمستهلك fresh-cut بالكالسيوم للمحافظة على صلابتها وبحامض الأسكوربيك لتجنب تلونها باللون البنى.

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

وقد أدى غمس قطع الكنتالوب المجهزة للاستهلاك في كلوريد الكالسيوم إلى تحسين صلابتها أثناء التخزين على ٥°م، مع عدم وجود فرق بين الغمس لمدة دقيقة واحدة أو خمس دقائق وعندما كان الغمس لمدة دقيقة واحدة في ٢.٥٪ كلوريد الكالسيوم على ٢٠، ٤٠، أو ٦٠°م فإن الصلابة استمرت كما هي أو تحسنت، وخاصة عندما كان الغمس في درجات الحرارة العالية، بينما ازداد محتوى شرائح الكنتالوب من الكالسيوم بنسبة حوالى ٣٠٠٪ (Luna-Guzmán وآخرون ١٩٩٩)

وعندما غمرت قطع أسطوانية من الكنتالوب لمدة دقيقة في محاليل بتركيز ٢.٥٪ من كلوريد الكالسيوم على حوالى ٢٥°م أو لأكثات الكالسيوم calcium lactate على حوالى ٢٥، و ٦٠°م، ثم خزنت لمدة ١٢ يوماً على ٥°م مع ٩٥٪ رطوبة نسبية، حافظت كلتا المعاملتين على صلابة قطع الكنتالوب خلال فترة التخزين، إلا أن الغمر في محلول كلوريد الكالسيوم – وليس لأكثات الكالسيوم – أضفى على قطع الكنتالوب طعماً مرّاً، ولم تلاحظ أى فروق جوهرية في السلوك الفسيولوجى بين القطع المعاملة وغير المعاملة (Luna-Guzmán & Barrett ٢٠٠٠).

كذلك عوملت القطع المجهزة fresh-cut من ثمار الكنتالوب صنف Amarillo (الذى يتبع الصنف النباتى *Cucumis melo var. saccharinus*) – وهو طراز هام جديد يُزرع لأجل استعماله فى صناعات تجهيز المنتجات الطازجة للمستهلك (fresh-cut industry) – عوملت بالغمس في محلول كلوريد كالسيوم بتركيز ٠.٥٪ لمدة دقيقة واحدة على ٥°م أو ٦٠°م، مع استعمال الماء المقطر فى غمس قطع الكنتالوب. وأعقب الغمس تعبئة قطع الكنتالوب فى صوان محكمة الغلق بغشاء مثقب تثقيباً دقيقاً وتركت لمدة ثمانى أيام على ٥°م. وقد وجد أن معاملة الغمس على ٦٠°م أدت إلى زيادة مستوى الكالسيوم المرتبط بالأنسجة، وحافظت على الصلابة، وقللت النمو الميكروبي، وحسنت خصائصها الأكلية مقارنة بما حدث فى كل من معاملتى الكنتالوب والغمس على ٥°م.

وفى تجربة أخرى أجرى الغمس على حرارة ٦٠°م باستعمال محاليل مختلفة من الكالسيوم (كلوريد الكالسيوم و كربونات الكالسيوم ولاكتات الكالسيوم calcium lactate

الفصل الثالث: الكنتالوب (المقاوون) والشمام

وبروبيونات الكالسيوم (calcium propionate) مع توحيد تركيز الكالسيوم في كل منها ليعادل ٠,٥٪ كلوريد كالسيوم (٠,١٨ جم كالسيوم/١٠٠ مل). وقد وجد أن طراوة قطع الكنتالوب ارتبطت بتركيز الكالسيوم المرتبط: فزيادة الكالسيوم المرتبط تحسنت صلابة الأنسجة. وقد أدى كل من كلوريد ولاكتات وبروبيونات الكالسيوم إلى زيادة الكالسيوم المرتبط بنسبة ٥٠٪ وحافظت على الصلابة، هذا بينما أدت المعاملة بالماء المقطر أو بكربونات الكالسيوم إلى نقص الصلابة بنسبة ٢٧٪، و ١٩٪، على التوالي. كذلك أدت معاملة الغمس في كلوريد الكالسيوم ولاكتات الكالسيوم إلى خفض أعداد الميكروبات بمقدار ٢ لو (2 log)، وأدت معاملة الغمس في بروبيونات الكالسيوم إلى إحداث خفض مقداره ٤ لو، وذلك مقارنة بمعاملة الكنتالوب والتي تراوح فيها العدد بين ٦، و ٧,٣ لو. هذا إلا أن معاملة بروبيونات الكالسيوم — بالتركيز المستعمل — صاحبها تكوين مذاق غير مرغوب فيه خلال فترة الحفظ التي تراوحت لمدة ثمانى أيام على ٥°م (Aguayo وآخرون ٢٠٠٨).

التخزين والتغيرات فى صفات الجودة

تحدث جميع التغيرات البيوكيميائية المؤثرة فى صفات الجودة وكذلك التغيرات الميكروبية فى الكنتالوب المجهز للمستهلك fresh-cut ببطء شديد على ٤°م مقارنة بما يحدث على ١٠°م، وتزداد بشدة سرعة تلك التغيرات على ٢٠°م (Lamikanra وآخرون ٢٠٠٠).

ولقد حافظت قطع الكنتالوب المجهزة للمستهلك fresh-cut بجودتها لمدة تسعة أيام على ٥°م وهى فى MAP سواء أتركت ليتكون الجو المعدل بصورة طبيعية، أم زُودت بهواء يتكون من ٤٪ أكسجين + ١٠٪ ثانى أكسيد كربون، ولكن الجودة كانت أفضل فى الحالة الأخيرة، حيث احتفظت المكعبات بلونها بصورة أفضل، وانخفضت شفافيتها، وكان معدل التنفس فيها أقل وكذلك كان العد الميكروبي فيها أقل مما فى حالة تكون الجو المعدل بصورة طبيعية. وكانت الجودة فى كلتا المعاملتين أفضل مما فى معاملة ثالثة حفظت فيها مكعبات الكنتالوب المجهز على نفس درجة الحرارة ولكن فى

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

أغشية مثقبة، حيث لم تحتفظ بجودتها فيها سوى لمدة ٥-٧ أيام، وكان سبب التدهور السريع فيها هو الشفافية وظهور رائحة غير مرغوب فيها (Bai وآخرون ٢٠٠١). وفي دراسة أخرى مماثلة، ولكن مع استعمال جو معدل حقناً بهواء يتكون من ٥٪ أكسجين، و ٥٪ ثاني أكسيد كربون، مع التخزين على ٥ أو ١٠ °م، كان - أيضاً - الهواء المعدل المحقون هو الأفضل، كما كان التخزين على ٥ °م أفضل منه على ١٠ °م (Bai وآخرون ٢٠٠٣).

ويلعب التوازن بين نسبة الـ nonacetate ester إلى acetate ester دوراً هاماً في إعطاء النكهة المميزة للكتالوب، وهي التي تغيرت بمقدار الضعفين تقريباً بعد يومين فقط من تخزين الكتالوب المجهز للمستهلك fresh-cut في الحرارة المثلى للتخزين، وبمقدار أكثر من ثلاثة أضعاف بعد خمسة أيام. ويعد هذا التغير في مركبات الـ esters التي ينتجها النبات أحد أسباب التدهور الذي يحدث في جودة الكتالوب المجهز للمستهلك (Beaulieu ٢٠٠٦).

التلوث الميكروبي

تعلق بكتيريا السالمونيلا *Salmonella* بالشبك في ثمار الكتالوب وتحتجز بينه؛ فلا يسهل التخلص منها بالغسيل، حيث تتسبب في تلوث اللحم عند تجهيزه للمستهلك، خاصة وأن pH لب ثمار الكتالوب التامة النضج يتراوح بين ٦، و ٧، وبشكل بيئية مثالية لنمو البكتيريا، وخاصة في الحرارة العالية

ومن بين حالات التلوث الأخرى التي ظهرت في الولايات المتحدة - بخلاف السالمونيلا - إصابات بكل من *Campylobacter*، و *E. coli* O157:H7 جراء تلوث اللب - أثناء تجهيزه - بالبكتيريا العالقة بالشبك في جلد الثمرة (Guzmán ١٩٩٧)

الفصل الرابع

البطيخ

يبدأ أزهار البطيخ بعد نحو ٤٠-٥٠ يوماً من الزراعة، ويبدأ نضج الثمار بعد ذلك بنحو شهر ونصف إلى شهرين، أى بعد ٣-٤ شهور من الزراعة. وتحتاج الثمرة لنحو ٤٥-٦٠ يوماً من عقدها إلى تمام نضجها حسب الصنف. ويستمر الحصاد لمدة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف فى الحقل الواحد.

علامات النضج

لا تصل ثمرة البطيخ إلى أفضل نوعية لها إلا بعد اكتمال تكوينها؛ لذا فإنه من الأهمية بمكان ألا تقطف ثمار البطيخ قبل بلوغها تلك المرحلة. ونظراً لأن ثمار البطيخ لا تحدث بها تغيرات ظاهرية أثناء النضج (لا تعتبر الزيادة فى الحجم دليلاً على النضج)، ولا تنفصل انفصلاً طبيعياً عن العنق؛ لذا .. فإن تقدير الوقت المناسب للحصاد يعد أمراً صعباً، ويعتمد على الخبرة مع الاستعانة بعلامات النضج التالية:

١- ذبول وبدء جفاف أقرب محلاق لعنق الثمرة (دون أن يجف تماماً)، واكتسابه لوناً بنياً. ومع أن المحلاق قد يجف لأسباب أخرى لا علاقة لها بالنضج، إلا أن عدم جفافه وبقائه أخضر اللون يُعد دليلاً مؤكداً على عدم نضج الثمرة.

٢- تغير لون جلد الثمرة فى الجزء الملامس للأرض من اللون الأبيض الشاحب أو الضارب إلى الخضرة، إلى اللون الأصفر الفاتح، أو الأصفر الكريمى.

٣- قد يفقد جلد الثمرة جزءاً من نعومته، كما يفقد بريقه ولمعانه.

٤- يُحدث الطرق على الثمرة صوتاً معدنياً رناناً إذا كانت غير ناضجة، وصوتاً مكتوماً إذا كانت ناضجة، وأفضل وقت لإجراء هذا الاختبار هو الصباح الباكر، إلا أن هذا الاختبار لا يعتمد عليه كذلك؛ إذ أن الأصناف ذات اللحم المتماسك تعطى صوتاً

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية – التداول والتخزين والتصدير

معدنيًا رنانًا حتى وهي ناضجة، كما أن معظم الثمار غير الناضجة تعطي صوتًا مكتومًا إذا أجرى الاختبار بعد الظهر، أو بعد فترة من الحصاد. ويعنى ذلك أن هذا الاختبار فائدته محدودة بالنسبة للعامل الذى يقوم بقطف الثمرة، وقليلة جدًا بالنسبة للمستهلك عند شرائه لثمار البطيخ

٥- صعوبة خدش قشرة الثمرة الناضجة بالأظافر فى الجزء الملامس للأرض

٦- يُسمع صوت تمزق الأنسجة الداخلية فى الثمار الناضجة عند الضغط عليها بين راحتي اليدين إلا أن هذا الاختبار يتلف الثمرة

٧- اختفاء الغلاف الجيلاتيني المحيط بالبذرة وتصلب الغلاف البذرى

٨- وصول محتوى المواد الصلبة الذائبة إلى ما لا يقل عن ١٠٪ فى اللب القريب من مركز الثمرة.

٩- تختفى الشعيرات الدقيقة من على ساق النبات لمسافة ٣ سم على جانبي عنق الثمرة الناضجة

وتظل ثمار البطيخ متصلة بالنبات حتى بعد اكتمال نضجها

ويتعين الربط بين علاقة النضج الخارجية وتلك الداخلية بعد اختبار عدد من الثمار التى تُختار عشوائيًا من كل حقل إنتاجي من الصنف الواحد (Rushing ٢٠٠٤، و Suslow ٢٠٠٧).

التغيرات المصاحبة لنضج الثمار

تزداد السكريات المختزلة مبكرًا خلال نمو ثمرة البطيخ بدرجة أكبر عن زيادة السكروز. وعند اكتمال النمو تحتوى الثمرة على سكريات كلية بنسبة حوالى ١٠٪، يكون السكروز ٣٥٪ منها. وإذا سمح للثمرة بأن تصبح زائدة النضج وهي متصلة بالنبات، أو أثناء تخزينها فى حرارة الغرفة فإن نسبة السكروز تزداد إلى حوالى ٦٥٪ من السكريات الكلية. هذا وتزداد السكريات الكلية والمواد الذائبة فى ثمرة البطيخ حتى اكتمال نموها، علمًا بأن السكريات الكلية تشكل حوالى ٨٥٪ من المواد الصلبة الذائبة الكلية فى الثمار الناضجة

الفصل الرابع: البطبخ

يظهر العيب الفسيولوجي القلب الأبيض whiteheart على صورة خطوط بيضاء في اللب، وتسببه زيادة الرطوبة، وكذلك زيادة التسميد الآزوتى خلال مرحلة النضج.

ويكون لب الثمار الزائدة النضج سهل التفتت، وتكثر به الفراغات حول البذور، وفاقد للطعم الجيد. ويؤدى تعرض الثمار للإثيلين أثناء التخزين أو الشحن إلى زيادة سهولة تفتت اللب، وانفصال القشرة عن اللب، وطرارة الثمرة كلها.

الحصاد

تقطف الثمار الناضجة بما لا يقل عن ٣ سم من عنق الثمرة، ويفضل قطع العنق بسكين أو مقص. ويعطى العنق حماية للثمرة من الإصابة بمرض تعفن الساق الذى يسببه الفطر *Physalospora rohodina* لأطول فترة ممكنة. وتحسن إعادة قطع الجزء الطرفى من العنق فيما بعد، ومعاملة السطح المقطوع بأحد المطهرات الفطرية لمكافحة هذا الفطر.

يراعى عدم ترك الثمار فى الحقل لمدة طويلة بعد الحصاد، مع حمايتها من الشمس والأمطار، وعدم وضعها على طرفها الزهرى، وعدم تكويها فى كومات كبيرة لأن ذلك كله يؤدى إلى زيادة نسبة الثمار التالفة. ويجب تفريغ الثمار يدوياً.

عمليات التداول

تتطلب النوعية الجيدة جداً للبطبخ ألا تقل قراءة الرفراكتومتر للمواد الصلبة الذائبة عن ١٠٪، ويفضل أن تصل إلى ١٢٪، ولكن ١٠٪ تعد كافية إذا كان التقدير عشوائياً من أى مكان من الجزء الداخلى الصالح للأكل. أما النوعية "الجيدة" فتتطلب ألا تقل القراءة الداخلية العشوائية عن ٨٪. هذا مع العلم بأن القراءة تكون أعلى فى مركز الثمرة عن جوانبها، وفى طرفها الزهرى عن طرفها القاعدى.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ويجب تداول ثمار البطيخ بحرص وتجنب ارتطامها بعضها ببعض، وإذا حدث ذلك يتعين عدم تصدير تلك الثمار لأن الارتطام يحدث أضراراً تكون غير مرئية وقت التعبئة، ولكنه يؤدي إلى ظهور مساحات متغيرة اللون بجلد الثمرة في موضع الضرر، فضلاً عن حدوث أضرار باللحم ذاته تتطور أثناء الشحن (Rushing ٢٠٠٤).

التدريج

يتم تدريج الثمار حسب الحجم قبل تعبئتها، فلا يجب أن تحتوى الكرتونة الواحدة على ثمار تتفاوت في أحجامها ويجرى التدريج آلياً في محطات التعبئة المجهزة لذلك

المفرز لأجل التصدير

يتعين أن تتوفر في ثمار البطيخ المعدة للتصدير الشروط التالية:

- ١- أن تكون مكتملة التكوين ومطابقة للصفة من حيث الشكل، ولون القشرة الخارجى، ولون اللب
- ٢- ألا يقل محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية قرب مركزها عن ١٠٪.
- ٣- أن تكون خالية من لفحة الشمس، والتشققات، والخدوش، والأضرار الميكانيكية، والتحلل، وانهيار الأنسجة الداخلى الذى يظهر عند زيادة النضج، فيجب أن يكون لب الثمرة صلباً ومتماسكاً
- ٤- كذلك يجب استبعاد جميع الثمار غير المنتظمة الشكل، والتي توجد بسطحها أجزاء منخفضة، أو ندب scars قديمة، فضلاً عن ضرورة استبعاد الثمار غير مكتملة التكوين كما أسلفنا
- ٥- أن تكون الثمار نظيفة
- ٦- ألا يقل وزن الثمرة عن ٢,٥ كجم، وألا يزيد عن ٥ كجم (بالنسبة لأسواق المملكة المتحدة)
- ٧- أن تكون الثمار خالية من متبقيات المبيدات

الفصل الرابع: البطيخ

هذا .. ويكون البطيخ مطلوباً للتصدير إلى الأسواق الأوروبية خلال الفترة من أكتوبر إلى مايو.

التعبئة والعبوات

يجب أن تراعى عديد من الأمور فى عبوات البطيخ التى تستعمل فى التصدير، وفى عملية التعبئة ذاتها، كما يلى :

- ١- يجب أن تكون الكرتين المستعملة فى التعبئة من نوعية جيدة يمكنها أن تتحمل ضغوط تصل إلى ٣٠٠ رطل/بوصة مربعة، أو حوالى ٢١,١ كجم/سم^٢
- ٢- تكون أبعاد كرتين تعبئة البطيخ عادة: ٥٠ سم (عرض) × ٦٠ سم (طول) × ٣٢ سم (ارتفاع)، أو ٣٤ × ٥١ × ٢٠ سم. ويجب أن يتناسب عمق الكرتونة مع أقصى حجم للثمار المعبأة فيها

٣- يجب أن تتم التعبئة بكيفية تتوفر معها تهوية جيدة.

- ٤- توضع عادة طبقة من قصاصات الورق فى قاع الكرتونة لتقليل الخدوش المحتملة. كذلك يفضل وضع ورق مقوى بين الثمار فى العبوة (Fiberboard divider)، لتقليل احتكاكها ببعضها البعض أثناء النقل وبعد ملأ الكرتونة فإنها يجب أن تكون منتفخة من قمته أو أحد جوانبها، ولا تحدث خدوش وتشققات كثيرة فى الثمار المعبأة فيها أثناء النقل. كما يجب ألا تكون الثمار شديدة التزاحم داخل الكرتونة؛ لكى لا تتشقق من جراء ذلك

٥- يبلغ وزن الثمار الصافى فى الكرتونة عادة ١٥ كجم، ويتراوح محتواها بين ثلاث وثمانى ثمار متجانسة فى الحجم، ومن صنف واحد.

٦- يجب أن تُبين على الكرتونة كافة المعلومات المتعلقة بالعبوة، وبخاصة الصنف، وعدد الثمار، والوزن الصافى.

٧- كما يمكن وضع الملصق التجارى المميز للمنتج على كل ثمرة.

٨- ويتعين تحريم الكرتين فى البليتات (palletisation) لتسهيل نقلها داخل محطة التعبئة، وعند شحنها، سواء أكان ذلك بطريق البر أم بطريق البحر

٩- يفضل عند الشحن بطريق الجو - إن كان ذلك اقتصاديًا - أن تكون الكراتين في باليتات مفردة، وألا توضع في كونتينرات Containers محكمة الغلق، لأنها تسمح بارتفاع الحرارة وتجمع الإثيلين بداخلها؛ الأمر الذي يؤدي إلى سرعة تلف الثمار.

١٠- أما عند الشحن بطريق البحر، فإنه يفضل أن يتم ذلك في حاويات مبردة على حرارة ١٢°م

وينص القانون المصرى على أن تكون ثمار البطيخ المُصدرة ناضجة منتظمة الشكل خالية من الجروح، والعطب، وآثار المبيدات، مكتملة النمو غير متقدمة النضج، وغير لينة، وغير مصابة بلفحة الشمس. ويسمح القانون بنسبة لا تزيد عن ٥٪ من الثمار التى بها جروح سطحية ملتئمة، أو أثر لفة شمس، أو آثار التعفير بالكبريت. وينص القانون على أن تكون الثمار متماثلة الصنف، والحجم فى الرسالة الواحدة، ويسمح بنسبة لا تزيد عن ٥٪ من الثمار مختلفة الحجم، كما يسمح بنسبة لا تزيد عن ٥٪ من الثمار التى يقل وزنها عن ٥ كجم فى البطيخ الشليان (أو جيزة)، و ٧,٥ كجم فى الأيرش جراى (والشارلستون جراى)، على ألا يزيد النقص فى الوزن عن كيلوجرام واحد.

التبريد الأولي

يجب تبريد ثمار البطيخ تبريدًا أوليًا إلى ١٠°م فى خلال ٢٤ ساعة من حصادها إذا رُغِبَ فى تخزينها لفترة طويلة كما يجب خفض حرارة الحقل التى قد تصل إلى ٢٨-٣٥°م إلى ١٥°م بأقصى سرعة ممكنة، وذلك لتجنب النضج السريع للثمار الذى يحدث فى الحرارة العالية.

وعلى الرغم من إمكانية تبريد البطيخ أوليًا فى الحجرات المبردة. إلا أن ذلك يكون بطيئًا، ويفضل التبريد بطريقة الدفع الجبرى للهواء.

وتجب المحافظة على الرطوبة النسبية بين ٩٠٪، و ٩٥٪ أثناء عملية التبريد

الأولى

فسيولوجى البطيخ بعد الحصاد

يبلغ معدل تنفس ثمار البطيخ فى مختلف درجات حرارة التخزين كما يلى :

معدل التنفس (مل CO ₂ /كجم ثمار فى الساعة)	الحرارة (°م)
لا يوصى بها لتعرض الثمار فيها لأضرار البرودة	صفر
٤-٣	٥
٩-٦	١٠
٢٥-١٧	٢٠

ولحساب إنتاج الثمار من الطاقة فى مختلف درجات الحرارة يضرب معدل التنفس المبين أعلاه فى ٤٤٠ للحصول على عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل طن من الثمار فى اليوم، أو يضرب فى ١٢٢ للحصول على كمية الطاقة المنطلقة بالكيلو كالورى لكل طن من الثمار فى اليوم.

ويتراوح معدل إنتاج الثمار للإثيلين بين ٠,١ و ١,٠ ميكروليتر/كجم فى الساعة على ٢٠°م (Suslow ٢٠٠٧).

ومن المعروف أن معاملة الثمار غير الكلايمكتيرية Nonclimacteric Fruits بالإثيلين تؤدي إلى زيادة معدل تنفسها، ولكن يعود معدل التنفس فيها إلى وضعه السابق قبل المعاملة بالإثيلين بمجرد إنهاء تلك المعاملة وقد صُنِّف البطيخ منذ فترة طويلة على أنه من الثمار الكلايمكتيرية، وذلك بناء على دراسات أجريت على معدل تنفس الثمار وإنتاجها للإثيلين فى أحد أصناف البطيخ بعد الحصاد. هذا إلا أن تعريض ثمار البطيخ للإثيلين بتركيزات شديدة الانخفاض تصل إلى ميكروليتر واحد/لتر يؤدي إلى تدهور نسيج المشيمة ويجعل الثمار غير صالحة للاستهلاك، حيث تصبح طرية، ومائية، وتظهر بها روائح غير مرغوب فيها. كما يكون لمعاملة الثمار غير الناضجة بالإثيلين تأثيرات غير مرغوب فيها كذلك. وتلك أمور ترجح ألا تكون ثمار البطيخ كلايمكتيرية لأن معاملتها بالإثيلين تؤدي فقط إلى التعجيل ببداية العمليات التي تؤدي

تكنولوجيا وفسبولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

إلى النضج وقد أكد ذلك Elkashif وآخرون (١٩٨٩) من دراستهم التى حصدوا فيها ثمار البطيخ فى مراحل مختلفة من التكوين والنضج وعاملوها بالإيثيلين بتركيز ٥٠ ميكروليتر/لتر، ووجدوا أن تلك المعاملة كان لها تأثير سلبى على الثمار فى جميع مراحل التكوين، حيث تدهورت المشيمة وأصبحت مائية، وازداد معدل تنفس الثمار كثيراً ما استمرت المعاملة بالغاز، ثم عاد التنفس إلى معدله السابق قبل المعاملة بمجرد إيقافها

تؤدى معاملة البطيخ بالإيثيلين إلى إحداث زيادة فى نشاط الإنزيمات المؤكسدة oxidative والمحللة hydrolytic (Karakurt & Huber ٢٠٠٨).

ويؤدى تعريض ثمار البطيخ للإيثيلين إلى جعل أنسجة الثمرة تبدو مائية المظهر كما أسلفنا – وهى نفس الظاهرة التى تحدث جراء تعرض النباتات قبل الحصاد لظروف بيئية قاسية، وما يستتبع ذلك من زيادة إنتاج الثمار للإيثيلين (Lee & Ko ٢٠٠٨) ويصاحب التعرض للإيثيلين من مصدر خارجى بتركيز ٥٠ ميكروليتر/لتر على ٢٠°م زيادة فى نشاط إنزيمى: phospholipases، و lipoxxygenase، وانخفاض فى محتوى كل من phosphatidylcholine، و phosphatidylinositol، وزيادة فى ال phosphatidic acid بدأت تلك التغيرات فى الظهور فى خلال يومين من التعرض للإيثيلين، وتزامن ذلك مع طراوة الثمار، وزيادة فى التسرب الأيونى، والمظهر المائى وفى مقابل ذلك لم تصبح الثمار التى تركت فى الهواء العادى لدة ثماني أيام مائية المظهر، وظل مستوى نشاط الإنزيمات المحللة للدهون والفوسفوليبيدات فيها ثابتاً أما تعريض الثمار لل 1-methylcyclopropene (اختصاراً 1-MCP) بتركيز ٥ ميكروليتر/لتر لمدة ١٨ ساعة قبل معاملتها بالإيثيلين فإنه قلل من الزيادات التى أحدثتها معاملة الإيثيلين فى نشاط الإنزيمات المحللة للدهون، وفى تحليل الفوسفوليبيدات، ومنعت المعاملة تطور المظهر المائى نهائياً، وكذلك منعت الزيادة فى التسرب الأيونى. ويستفاد من ذلك أن معاملة ثمار البطيخ التامة النضج بال 1-MCP يحميها من التأثيرات الضارة التى تحدث جراء التعرض

الفصل الرابع: البطيخ

لمصدر خارجي للإثيلين. وقد استفادت - كذلك - ثمار البطيخ التي خزنت لمدة ٣ أسابيع على ١٣°م دون التعرض لمصدر خارجي للإثيلين من المعاملة بال 1-MCP قبل التخزين (Mao وآخرون ٢٠٠٤).

الظروف المناسبة للتخزين والشحن والتفريات الثمرية المصاحبة

لهما

تتراوح درجة الحرارة المثلى لتخزين ثمار البطيخ بين ١٠ و ١٢°م. ويؤدي تعرض الثمار لدرجات حرارة أقل من ذلك إلى إصابتها بأضرار البرودة، وبهتان لون لب الثمرة، فيصبح أحمر فاتحاً أو برتقالياً. وتتجمد ثمار البطيخ إذا تعرضت لدرجة حرارة تقل عن -٠,٤°م.

تخزن ثمار البطيخ لمدة أسبوعين على حرارة ١٠-١٥°م، ولمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع على حرارة تتراوح بين ٧ و ١٠°م، مع رطوبة نسبية تتراوح بين ٨٥٪ و ٩٠٪، لتجنب فقد الثمار لرطوبتها ولعنان سطحها ويفضل تخزين الثمار التي قاربت على اكتمال التكوين (Slightly Immature) على حرارة ١٦°م، ولكن مع عدم توقع أى تحسن فى صفاتها.

وتعد جميع أصناف البطيخ حساسة لأضرار البرودة إذا خزنت ثمارها فى حرارة تقل عن ٧°م؛ فتظهر نقر سطحية، وصبغات بنية على قشرة الثمرة ويتكون بها طعم وروائح غير مرغوب فيها بعد أسبوع واحد من التخزين فى هذه الظروف. كما تفقد الثمار لونها الأحمر القاتم فى المخازن المبردة، بينما يتحسن لون وطعم الثمار بعد أسبوع واحد من الحصاد إذا خزنت فى حرارة ٢١°م (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨، و Suslow ٢٠٠٧)، ولكنها قد تتعرض للإصابة بالأعفان.

وقد وجد Picha (١٩٨٦) أنه يمكن تقليل حدة الأعراض الخارجية لأضرار البرودة - خاصة ظهور الصبغات البنية على قشرة الثمرة - بوضع الثمار فى حرارة ٢٦°م لمدة أربعة أيام قبل التخزين فى درجة الحرارة المنخفضة. وأدت هذه المعاملة إلى تأخير

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية - التداول والتخزين والتصدير

ظهور أعراض البرودة إلى اليوم الثانى عشر من التخزين فى درجة الصفر المئوى، بالمقارنة بظهورها فى اليوم الرابع فى حالة التخزين فى درجة الصفر المئوى بعد الحصاد مباشرة.

كذلك وجد أن تعريض ثمار البطيخ لحرارة ٢٦°م لمدة ٣ أيام قبل تخزينها على حرارة ١°م قلل إصابتها بأضرار البرودة، وأدى إلى زيادة نسبة الثمار الصالحة للتسويق بعد التخزين، ولكنها لم تلغ المشكلة تماماً (Risse وآخرون ١٩٩٠، و Rushing ٢٠٠٤)

هذا ويقل سمك قشرة الثمرة مع اكتمال تكوينها وأثناء تخزينها، ويحدث الأمر ذاته بالنسبة لدكنة اللون الأحمر للُب الثمرة، إلا أن نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية لا تتغير بعد الحصاد أيًا كانت حرارة التخزين.

وقد وجد أنه بعد سبعة أيام من تخزين ثمار البطيخ على ٢٠°م فى ٨٥٪ رطوبة نسبية، انخفض محتوى السكريات المختزلة بمقدار ٤٢,٥٪، ثم بمقدار ٣,٨٪ أخرى بعد أسبوع إضافي، على الرغم من أن محتوى السكريات الكلية والذائبة لم يتغيرا خلال الأسبوع الأول، ولكنهما انخفضا بنهاية الأسبوع الثانى بمقدار حوالى ١٥٪ (Radulovic وآخرون ٢٠٠٧).

التصدير

نوعيات الثمار التى يجب فرزها وعدم تصديرها

من الضرورى أن تكون ثمار البطيخ المصدرة منتظمة الشكل، وقد يرجع عدم انتظام الشكل إلى ما يلى:

١- وجود الثمرة على جزء غير مستو من الأرض.

٢- حدوث ضرر للثمرة وهى صغيرة الحجم

٣- ضعف التلقيح، وخاصة فى الثمار الطويلة التى يؤدى ضعف التلقيح فيها إلى

ظهور حالة عنق الزجاجاة bottlenecks، والتى يتقلص فيها النمو عند طرف العنق وقد يرجع ضعف التلقيح إما إلى عدم وجود النحل بأعداد كافية، وإما إلى سوء الأحوال

الفصل الرابع: البطيخ

الجوية، علمًا بأنه يلزم نقل النحل لما لا يقل عن ١٠٠٠ حبة لقاح على ميسم الزمرة بفصوصه الثلاثة لإنتاج ثمرة متجانسة فى النمو.

كذلك يجب استبعاد الثمار المصابة بالأمراض وبالعيوب الفسيولوجية، مع إعطاء اهتمام خاص بالعيوب غير الظاهرة، كالقلب الأجوف.

تزداد ظاهرة القلب الأجوف - التى لا تعرف مسبباتها - فى البطيخ اللابذرى، وفى العقد الأول على النبات الذى يعرف باسم crown set.

الأضرار الناشئة الحدوث فى رسائل البطيخ المصدرة ووسائل تجنبها

يجب عدم تعريض ثمار البطيخ لغاز الإثيلين بعد الحصاد أو أثناء التخزين والشحن، حيث تستجيب كلا من الثمار غير المكتملة النضج والثمار الناضجة للغاز، حتى ولو لم يعتمد التركيز هـ أجزاء فى المليون، فتصبح زائدة النضج ويقل سمك قشرة الثمرة، ويفقد اللب صلابته. ولذا .. فإن ثمار البطيخ يجب ألا تشحن مختلطة مع الثمار الأخرى المنتجة للإثيلين.

وترجع معظم الخسائر التى تحدث فى رسائل البطيخ المصدرة أثناء شحنها إلى زيادة نضج الثمار، وتشققها، وتفلقها، وجميعها مشاكل يكون مردها إلى حالة نضج الثمار المصدرة وطريقة تعبئتها وتداولها. فالثمار المكتملة النضج تكون أكثر عرضة للإصابة بالأضرار ويجب تداولها بحرص. ويجب عدم إسقاط أو قذف الكراتين المعبأة بالثمار، وتجنب زيادة ملاء الكراتين أكثر مما ينبغى. كما أن بقاء الثمار لفترات طويلة فى الحاويات المغلقة للطائرات يسمح بتراكم الإثيلين وارتفاع حرارتها، مما يؤدي إلى سرعة تدهورها.

وأكثر الأضرار الميكانيكية حدوثًا هى الخدوش فى الطرف الزمري للثمار، ولكن الخدوش والخرق يمكن أن يحدثان فى جوانب الثمرة كذلك. وتحدث التشققات والتفلاقات عند تداول الثمار بخشونة، وخاصة وهى باردة أثناء سلسلة التبريد.

ومن أكثر الأمراض ظهوراً على ثمار البطيخ بعد الحصاد وأثناء الشحن والتصدير، ما يلي،

١- الأنثراكنوز:

يسبب مرض الأنثراكنوز الفطر *Colletotrichum lagenarium*، ويتميز بظهور بقع خضراء قاتمة أو حلقية أو طويلة على سطح الثمار تزداد هذه البقع في المساحة تدريجياً، وتكتسب لوناً بنياً، ثم تصبح غائرة. وتكون إصابة الثمار تلك كامنة بها من قبل الحصاد، ولكنها لا تظهر إلا أثناء الشحن، وخاصة إذا تأخر تبريد الثمار، مع ارتفاع الرطوبة النسبية.

٢- عنق الطرف الساقى:

يسبب مرض تعفن الطرف الساقى الفطر *Diplodia natalensis*، ويتميز بظهور مناطق بنية طرية مائية المظهر فى الطرف الساقى للثمرة (طرف العنق) يبدأ العفن - عادة - فى سطح العنق المقطوع، كما قد يحدث أيضاً من خلال الجروح والخدوش ويفيد قطع عنق الثمرة بطول ٣ سم مع معاملته بمظهر فطرى، أو بالشمع فى الحد من الإصابة بهذا المرض.

البطيخ المجهز للمستهلك

لا يستفيد البطيخ المجهز للمستهلك fresh-cut - كثيراً - من الـ MAP، حيث لم تزداد فترة صلاحيته للتخزين، ولم ينخفض معدل تنفسه إلا على حرارة ١-٣°م مع زيادة تركيز الأكسجين عن ١٤٪ (Fonseca وآخرون ٢٠٠٤).

ولقد أدى حفظ مكعبات البطيخ المجهزة فى أوعية مغلقة من البوليسترين على ٢°م لمدة استمرت حتى ١٠ أيام إلى ازدياد تركيز ثانى أكسيد الكربون وانخفاض تركيز الأكسجين خطأً مع فترة التخزين حتى وصل التركيز إلى ١٠٪ لكل منهما بعد ١٠ أيام وصاحب التخزين تحت هذه الظروف انخفاضاً طفيفاً فى محتوى المواد الصلبة الكلية والليكوبين، وذلك بنسبة وصلت بعد ٧ أيام إلى ٦٪، و ١١٪ على التوالي، أما

البينتاكارونين والـ *cis-lycopene* فقد كانا بتركيز ٢، و ٦ مجم/كجم - على التوالي - ولم يتغير تركيزهما مع التخزين (Perkins-Veazie & Collins ٢٠٠٤).

وأدت معاملة مكعبات البطيخ المجهزة للمستهلك بالأشعة فوق البنفسجية سى -UV C إلى خفض العد الميكروبي بها بعد المعاملة مباشرة. وبعد ١١ يوماً من المعاملة على ٥ م، كانت أعداد البكتيريا الـ *mesophilic*، والـ *psycrophilic*، والـ *enterobacteria* أقل جوهرياً عما فى الكنترول. وتبعاً لاختبارات التذوق، فإن الكنترول ومعاملة الجرعة المنخفضة من الـ UV-C (١,٦ و ٢,٨ كيلوجول/م^٢) أمكنها المحافظة على جودة الطعم بها لمدة ١١ يوماً على ٥ م، مقارنة بثمانى أيام فقط فى معاملة الجرعات المتوسطة والعالية من الـ UV-C (٤,٨ و ٧,٢ كيلوجول/م^٢). وبينما انخفض محتوى الليكوبين بمقدار ١٦٪ بعد ١١ يوماً من التخزين على ٥ م - فى كل من الكنترول ومعاملة الـ UV-C بالجرعة العالية - فإن المعاملة بالجرعة المنخفضة (٢,٨ كيلوجول/م^٢) حافظت على محتواها من الليكوبين. ولم تؤثر معاملة الأشعة فوق البنفسجية على محتوى البطيخ المجهز من فيتامين ج، كما لم تؤثر على كل من نشاط الكاتاليز *catalase* والمحتوى الفينولى الكلى اللذان انخفضا كثيراً خلال كل فترة التخزين، على الرغم من ازدياد النشاط الكلى لمضادات الأكسدة خلال نفس الفترة، دون أن تكون لمعاملات UV-C علاقة بذلك. وكاستنتاج رئيسى من تلك الدراسات، يمكن اعتبار أن تعريض مكعبات البطيخ المجهزة للمستهلك وسيلة واعدة للمحافظة على صفات الجودة العامة بها (Artéz-Hernández وآخرون ٢٠١٠).

الفصل الخامس

الخيار

مرحلة النضج المناسبة للحصاد

يبدأ حصاد الخيار عادة بعد ٤٥-٦٠ يوماً من الزراعة، وتقل المدة عن ذلك قليلاً في حالة خيار التخليل، كما أنها تتوقف على الصنف ودرجة الحرارة، فيكون الحصاد أكثر تبكيراً في الصنف البلدى وفي الجو الحار.

وتستغرق ثمار الصنف البلدى، وخيار التخليل نحو ٤-٥ أيام من تفتح الزهرة إلى الحصاد. أما أصناف الاستهلاك الطازج الأمريكية الطويلة .. فإن ثمارها تستغرق من ١٥-١٨ يوماً حتى تصل إلى الحجم المناسب للحصاد. وتكون ثمار طراز البيت ألفا وسطاً بينهما.

وعموماً .. فإن حصاد الخيار يتم على أساس حجم الثمرة، والغرض من الزراعة، فتجمع ثمار أصناف التخليل وكذلك الصنف البلدى عندما يصل طول الثمرة إلى ٨-١٥ سم، وذلك لأنها تصبح زائدة النضج إذا زاد طولها عن ذلك. وتجمع ثمار الصنف بيت ألفا عندما يتراوح طولها من ١٥-١٨ سم، وتجمع ثمار الأصناف الأمريكية الطويلة عندما يبلغ طولها من ٢٠-٢٥ سم، وتجمع ثمار الزراعات المحمية الطويلة جداً عندما يتراوح طولها من ٣٥-٤٠ سم. وقد تحصد الثمار لغرض التخليل وهي بطول ٣-٥ سم، وعلى الرغم من أنها تباع بأسعار عالية إلا أن ذلك لا يعوض النقص الشديد في المحصول الذي يحدث عند حصاد الثمار وهي بهذا الحجم.

هذا ويرتبط لون الأشواك التي توجد بثمار الخيار بكل من لون الثمار الناضجة نباتياً وشبكيتها، فالثمار التي توجد بها أشواك بيضاء تكون خضراء فاتحة اللون إلى صفراء عند النضج وتكون شبكية، بينما تلك التي تكون أشواكها سوداء تصبح برتقالية أو بنية اللون عند النضج وقد تكون شبكية.

العوامل السابقة للحصاد التى تؤثر فى القدرة التخزينية لثمار الخيار

ترتبط القدرة التخزينية للخيار الإنجليزي ذات الثمار الطويلة – إيجابياً – بمدى دكنة اللون الأخضر للثمار عند الحصاد؛ الأمر الذى يزداد بخف الثمار، وبتزايد معدلات التسميد، كما تزداد دكنة اللون الأخضر فى الثمار التى تحصد من العقد العليا للنبات عما فى تلك التى تحصد من العقد السفلى (Lin & Ehret ١٩٩١). والسبب فى ذلك الارتباط أن القدرة التخزينية تتوقف على سرعة فقد الثمار للونها الأخضر، ويفرض أن ذلك الفقد يحدث بمعدل ثابت، فإن مدة التخزين سوف تتوقف – تلقائياً – على شدة اللون الأخضر للثمار منذ البداية. ويرجع هذا اللون الأخضر إلى صبغة الكلوروفيل التى يزداد تكونها بزيادة التعرض للضوء – كما فى أعلى النباتات – وبزيادة شدة الإضاءة وتفيد نظم تربية الخيار رأسياً التى تسمح بمرور الضوء خلال النموات الخضرية فى جعل الثمار أكثر اخضراراً وأفضل قدرة على التخزين (Klieber وآخرون ١٩٩٣) وقد وجد أن استعمال لمبات الصوديوم ذات الضغط العالى فى زيادة قوة الإضاءة أدى إلى زيادة القدرة التخزينية للثمار (Lin & Jolliffe ١٩٩٥)

ومن المعلوم أن الأوراق التى لا تتعرض لضوء كاف تكون شاحبة اللون ويقل محتواها من الكلوروفيل، كذلك يقل محتوى الأوراق من الكلوروفيل بانخفاض نسبة الضوء الأحمر إلى الأشعة تحت الحمراء، علماً بأن الضوء الأحمر يرتبط ببطء تحليل الكلوروفيل خلال فترة الشيخوخة

وعند إنتاج الخيار الإنجليزي (ذات الثمار الطويلة جداً) فى الصوبت نجد أن النبات يستمر فى الإنتاج لفترة قد تصل إلى ١٠ شهور أو ١١ شهراً، وهى فترة طويلة جداً تتعرض خلالها النباتات لتغيرات كبيرة فى الفترة الضوئية وشدة الإضاءة كما أن كثافة النمو الخضرى تختلف باختلاف طريقة تربية المحصول وباختلاف عمر النبات؛ وهى أمور تؤثر بكل تأكيد على شدة الضوء التى تصل إلى الثمار ونجد فى بداية عمر النبات أنه يربى على ساق واحدة، ثم بعد وصوله إلى السلك العلوى فإنه يقلم قمياً ويربى على ٤-٦ فروع، الأمر الذى يترتب عليه شدة تراحم النمو الخضرى، وانخفاض

الفصل الخامس: الخيار

شدة الإضاءة في وسط النموات الخضرية وانخفاض نسبة الأشعة الحمراء إلى الأشعة تحت الحمراء.

وفي زراعات الخيار المحمية أدى نظام التربية الذي سمح بتخلل أكبر للضوء خلال النموات الخضرية بزيادة اخضرار الثمار وزيادة فترة صلاحيتها للتخزين (Klieber وآخرون ١٩٩٣).

وقد وجد Lin & Jolliffe (١٩٩٦) علاقة طردية بين شدة الإضاءة التي تتعرض لها الثمار وبين قدرتها على التخزين، حيث كان متوسط القدرة التخزينية يومًا واحدًا، وخمسة، وثمانية أيام في الثمار التي تعرضت لـ ٣١٪، و ٦٦٪، و ١٠٠٪ من الضوء الطبيعي، على التوالي. كما كانت الثمار التي غطيت بفلتر منفذ للأشعة الحمراء أكثر اخضرارًا من تلك التي غطيت بمرشح منفذ للأشعة تحت الحمراء، وتؤكد ذلك باستعمال مصادر متنوعة للإضاءة الصناعية تختلف في نسبة ما يصدر عنها من أشعة حمراء إلى أشعة تحت حمراء. وفي جميع الحالات كان هناك ارتباط إيجابي بين شدة اللون الأخضر في الثمار وفترة صلاحيتها للتخزين.

كذلك وجد أن القدرة التخزينية لثمار الخيار تنخفض بزيادة عمر الثمار عند الحصاد. واقترح بعض الباحثين أن العوامل التي تحفز النمو القوي للثمار يترتب عليها زيادة قدرتها التخزينية وظهر أن سرعة استطالة الثمار قبل الحصاد ترتبط بزيادة قدرتها التخزينية (Jolliffe & Lin ١٩٩٧).

كما يلعب محتوى ثمار الخيار من الفوسفور دورًا بالغ الأهمية في قدرة الثمار على الاحتفاظ بجودتها بعد الحصاد وعلى مختلف صفاتها آنذاك ففي دراسة أنتجت فيها ثمار الخيار (الإنجليزى الطويل عديم البذور) في ظروف انخفاض في مستوى التسميد الفوسفاتى كان محتوى الثمار من العنصر حوالى ٤٥٪ من محتوى الثمار التى أنتجت فى ظل وفرة العنصر، وقد صاحب انخفاض محتوى الثمار من العنصر انخفاضًا فى محتوى الجدار الثمرى الوسطى mesocarp من الفوسفوليبيدات phospholipids،

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضـر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

وانخفاضاً مماثلاً في درجة تشبع الأحماض الدهنية، ومعدلاً أعلى للتسرب الأيوني عما في الثمار الغنية بالعنصر كذلك كان معدل التنفس في الثمار الفقيرة في العنصر أعلى بمقدار ٢١٪. عما في الثمار الغنية به على مدى ١٦ يوماً بعد الحصاد على ٢٣ م. وبالإضافة إلى ما تقدم بيانه، فإن الثمار الفقيرة في الفوسفور ظهر فيها كلامكتيرك تنفسى بدأ بعد نحو ٤٠ ساعة من الحصاد ووصل إلى أقصاه بعد ٧٢ ساعة من الحصاد، ثم انخفض إلى معدله السابق للكلامكتيرك بعد ٩٠ ساعة من الحصاد وقد كان الفرق في معدل التنفس بين الثمار الفقيرة في العنصر والغنية فيه ٥٧٪ أثناء الكلامكتيرك هذا مع العلم بأن الكلامكتيرك – الذى ظهر فقط في الثمار الفقيرة في الفوسفور – لم يكن مصاحباً بزيادة في إنتاج الثمار للإثيلين أو بالنضج ويعنى ذلك أن التغذية بالفوسفور يمكن أن تؤثر على فسيولوجيا بعد الحصاد في ثمار الخيار بتأثيرها على كيمياء الدهون بالأغشية الخلوية، وسلامة الأغشية، وأيض التنفس Knowles وآخرون ٢٠٠١).

كذلك وجد أن فترة ثمار التخليل على التخزين ونوعية الثمار بعد تخليلها تحسن كثيراً برش النباتات – قبل الحصاد – بكل من البوتاسيوم بتركيز ١٠٠ جزء في المليون مع الكالسيوم بتركيز ٥٠٠٠ جزء في المليون (Bakr & Gawish ١٩٩٣).

هذا . ويفيد توفير الرطوبة الأرضية للنباتات قبل الحصاد، وتبريد الثمار أولياً بالماء البارد على حرارة ٨ م، وتخزينها في حرارة ١٥ م، ورطوبة نسبية عالية (حوالي ٨٥٪) . يفيد ذلك كله في الحد من ظهور الثمار الإسفنجية في خيار التخليل بعد الحصاد (Navazio & Staub ١٩٩٤).

الحصاد

يجرى الحصاد يدوياً غالباً، لكنه قد يجرى آلياً كذلك ويستمر الحصاد اليدوى لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين، وتتوقف المدة على الظروف البيئية السائدة، ومدى سلامة النمو الخضري من الإصابة بالآفات ويكون الحصاد عادة كل يومين أو ثلاثة أيام في

الفصل الخامس: الخيار

بداية موسم الحصاد، ثم يوميًا بعد ذلك، وتزيد المدة بين مرات الجمع إلى ٥ إلى ٧ أيام في الجو البارد. ويؤدى تأخير الحصاد - ولو إلى أيام قليلة - إلى تخطى الثمار للطور المناسب للتسويق. ويلزم فى هذه الحالة حصادها والتخلص منها بدلاً من تركها على النبات، وذلك لأن تكوين ونضج البذور يستنفذ جزءاً كبيراً من طاقة النبات، ويمنع نمو الثمار الأخرى، ويقلل سرعة النمو الخضرى والمحصول.

ويلزم عند إجراء الحصاد يدوياً ترك جزء من عنق الثمرة متصلاً بها، وأخذ الحبيطة حتى لا تحدث أضرار للنمو الخضرى.

أما الحصاد الآلى .. فإنه يجرى مرة واحدة؛ لذا فإنه يتم توقيت مواعيد بحيث يمكن الحصول على أكبر عدد من الثمار ذات النوعية الجيدة من كل نبات. ولقد وجد فى إحدى الدراسات أن أنسب موعد للحصاد هو عندما يتراوح وزن الثمار - التى يزيد قطرها عن ٥ سم - بين ١٤٪ و ٣١٪ من وزن الثمار الكلى بالحقل. وتتراوح نسبة النباتات التى تكون مثمرة عند الحصاد فى تلك المرحلة بين ٩١٪ و ٩٧٪، ويكون متوسط عدد الثمار بالنبات حوالى ١,٢٧ ثمرة. وتجدر الإشارة إلى أن كثافة الزراعة تراوحت فى هذه الدراسة من ٧٠ إلى ١٠٠ ألف نبات بالفدان. ويمكن عملياً تحديد مرحلة النمو هذه، والتى ينصح فيها بإجراء الحصاد الآلى عندما تلاحظ ثمار يزيد قطرها عن ٥ سم (Miller & Hughes ١٩٦٩).

ويوصى فى كاليفورنيا بأن يجرى الحصاد الآلى عندما يلاحظ وجود نحو خمس ثمار، وقد بدأت فى الاصفرار من جهة طرفها الزهرى فى كل أربعة أمتار ونصف (١٥ قدمًا) من خط الزراعة المزدوج (ينطبق ذلك على الأصناف ذات الأشواك السوداء، وهى التى تظهر عليها ظاهرة الاصفرار من جهة الطرف الزهرى مبكراً عند النضج). ويؤدى أى تأخير فى الحصاد إلى زيادة كبيرة فى حجم الثمار قد تصل إلى ٤٠٪ فى خلال ٢٤ ساعة، ويصاحب ذلك نقص فى قيمة المحصول يتراوح بين ٥٪ و ١٥٪، وقد تفقد قيمتها التسويقية كلية، ويصبح الحقل غير صالح للحصاد. لذا .. فمن الضرورى أن يتواجد المزارع فى الحقل منذ اليوم الأول لظهور الثمار الصفراء، وأن يتابع الحالة بنفسه

تكنولوجيا واثسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

يومياً، وذلك لأن الثمار الصفراء قد تكون مختفية تحت النوات الخضرية ويفضل نزع بعض النباتات، وفصل ثمارها، وتقسيمها حسب الحجم

ويجب البدء بالحصاد مبكراً قبل الموعد المثالي، لأن عملية الحصاد الآلي تتطلب بعض الوقت حتى ينتظم العمل، ويحقق القاثمون عليه أعلى كفاءة ممكنة ومن الضروري مراقبة فريق العمل جيداً للتأكد من استبعاد كافة الثمار غير المرغوبة فيها، ومن أنه لا تستبعد نسبة كبيرة من الثمار الصالحة للتسويق. ويلاحظ دائماً أن تتناسب سرعة الآلة مع قدرة العمال القاثمين بالعمل عليها وفي حالة التأخير عن الجدول المقرر للحصاد . يحسن عمل نوبة عمل أخرى ليلية. وإذا تأخر حصاد حقل عن مواعده فإنه يستحسن تركه، والانتقال إلى الحقل التالي حتى لا يصبح متأخراً هو أيضاً (Sims & Zahara ١٩٧٨)

وقد قام اليابانيون على إنتاج آلة حصاد يمكنها – بواسطة إنسان آلي Robot – حصاد الثمار التي وصلت إلى مرحلة النضج الاستهلاكي فقط، وتم تجريب أول طراز من تلك الآلة بنجاح (Arima وآخرون ١٩٩٦)

عمليات التداول

التدريج

يُدرج الخيار الذي يؤكل طازجاً على أساس الحجم والشكل والمظهر العام. أما خيار التخليل .. فيدرج على أساس الحجم، مع أخذ الشكل والمظهر العام في الاعتبار أيضاً.

التشميع والمعاملة بالمطهرات الفطرية

يشمع الخيار الذي يؤكل طازجاً عادة بعد التدريج والغسيل أو التنظيف بالفرش، إذ يعمل التشميع على تأخير انكماش الثمار، وتحسين مظهرها، ويساعد على عدم فقدانها لصلابتها أثناء الشحن والتسويق وتستهمل أنواع مختلفة من الشموع والزيوت المعتمدة لهذا الغرض.

الفصل الخامس: الخيار

ويمكن إطالة مدة حفظ الثمار في حرارة 7°C بتغليفها بأغشية خاصة (film wrapping)، أو بتشميعها، أو بمعاملتها بمطهر فطري. ومع أن التشميع كان أكثر فاعلية من التغليف في حفظ الثمار، إلا أن الثمار المعاملة حدثت بها نسبة عالية من العفن في خلال ثلاثة أيام من النقل إلى حرارة 21°C سواء أكان ذلك بعد ١٤ يوماً أم بعد ٢١ يوماً من التخزين في 7°C ، كذلك ازدادت نسبة العفن في الثمار المغلفة عما في غير المغلفة، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد ٢١ يوماً من التخزين في 7°C . وقد أدى غمس الثمار في محلول من المطهر الفطري إمازاليل imazalil إلى نقص الإصابة بالعفن، حتى ولو كان التخزين لمدة ٢١ يوماً. وقد وجد أن التشميع يؤدي إلى زيادة التنفس اللاهوائي، وظهور مركبات متطايرة تدل عليه، مثل: الأسيتالدهيد، والإيثانول، والميثانول (Risse وآخرون ١٩٨٧).

وأوضحت دراسات Purvis (١٩٩٤) أن الفقد الرطوبي من ثمار الخيار ينخفض عند تشميعها، وأن فاعلية الشموع في خفض الفقد الرطوبي تزداد بزيادة تركيزها. كذلك أدى التشميع إلى زيادة تحمل الثمار لأضرار البرودة عند تخزينها في حرارة 5°C ، إلا أن الحرارة المنخفضة (5°C مقارنة بحرارة 15°C) ساعدت على تكوين شقوق في طبقة الشمع أدت إلى زيادة فقد الرطوبة من الثمار.

التبريد الأولي

لا تجرى عملية التبريد الأولى عادة على محصول الخيار المعد للاستهلاك السريع الطازج، ولكنه يُبرد إلى الدرجة المطلوبة في الحاويات أو في المخازن المبردة، ويستثنى من ذلك المحصول الذي يُحصد في وسط النهار أثناء ارتفاع درجة الحرارة، حيث يوصى بتبريده أولاً بطريقة الغمر في الماء البارد (Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

ويمكن تبريد الخيار أولاً بطريقة الدفع الجبرى للهواء، أو باستعمال ماء مثلج تقل حرارته عن حرارة التخزين الموصى بها للخيار وهي 10°C ، ولكن لا يجوز أن تنخفض حرارة الماء عن 6°C ، أو تبريد الخيار أولاً إلى تلك الدرجة، أو تعريض الثمار لحرارة

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

تقل عن ١٠°م لأكثر من ست ساعات، حتى لا تصاب الثمار بأضرار البرودة (DeEll وآخرون ٢٠٠٠)

فسولوجيا الخيار بعد الحصاد

تُصنف ثمار الخيار على أنها غير كلايمكتيرية، إلا إنه تحدث زيادة في إنتاج الإثيلين تسبق فقد الثمار المكتملة التكوين للكلوروفيل

نتج ثمار الخيار الإثيلين بعد حصادها، ويزداد معدل إنتاج الغاز في الثمار الصغيرة الحجم عما في الثمار الكبيرة لكل كيلوجرام من الثمار، وفي الثمار التي تحصد آلياً عما في الثمار التي تحصد يدوياً، كما يتأثر معدل التنفس بطريقة مماثلة لتأثير إنتاج الإثيلين (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

ويتراوح معدل إنتاج ثمار الخيار للإثيلين بين ٠,١ و ١,٠ ميكروليتر/لتر في الساعة على ٢٠°م

وثمار الخيار شديدة الحساسية للإثيلين، حيث يؤدي تعرضها لمصدر خارجي من الغاز إلى اصفرارها وتحللها حتى ولو كان التركيز ١-٥ أجزاء في البليون. ولذا يجب عدم تخزين أو شحن الخيار مختلطاً بالثمار المنتجة للغاز مثل الموز والكتنلوب والطماطم.

ويتباين معدل تنفس ثمار الخيار حسب درجة الحرارة، كما يلي:

الحرارة (°م)	معدل التنفس (مجم ثاني أكسيد كربون/كجم في الساعة)
١٠	١٢-١٥
١٥	١٢-١٧
٢٠	٧-٢٤
٢٥	١٠-٢٦

كذلك يتباين معدل تنفس الثمار - في حرارة تزيد عن ١٠°م - حسب مرحلة

الفصل الخامس: الخيار

اكتمال تكوينها، حيث يزداد معدل التنفس في الثمار الأقل اكتمالاً في التكوين (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧).

ويبقى مستوى المركب 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (اختصاراً: ACC)، وإنتاج الإثيلين منخفضاً أثناء تعرض الثمار لحرارة ٢٠.٥°م، ولكنهما يزدان سريعاً بعد نقلها لحرارة ٢٥°م (عن Lipton & Wang ١٩٨٧).

معاملات خاصة يعطاها الخيار قبل التخزين والشحن

قد تُعطى ثمار الخيار معاملات معينة قبل التخزين والشحن أو أثناء التخزين؛ بهدف حمايتها من الإصابة بأضرار البرودة، أو المحافظة على جودتها، أو للهدفين معاً وبينما تطبق بعض هذه المعاملات تجارياً، فما زال بعضها الآخر قاصراً على النطاق البحثي.

المعاملة الحرارية قبل التخزين البارد

وجد أن غمر ثمار الخيار في ماء تبلغ حرارته ٤٢°م لمدة ٣٠ دقيقة أدى إلى زيادة تحملها لأضرار البرودة فيما بعد، وتمثل ذلك في نقص التسرب الأيوني منها (McCollum & McDonald ١٩٩٣).

وفي دراسة لاحقة أوضح McCollum وآخرون (١٩٩٥) أن تخزين ثمار الخيار على ٢٠.٥°م ترتب عليه حدوث زيادة كبيرة في التسرب الأيوني - الذي يعد أحد أهم دلائل أضرار البرودة - وأن ذلك التسرب نقص جوهرياً بغمر الثمار - قبل تخزينها في حرارة ٢٠.٥°م - في ماء دافئ أو ساخن لمدة ٣٠ دقيقة وقد ازداد النقص في التسرب الأيوني من جراء التخزين في الحرارة المنخفضة مع زيادة درجة حرارة الماء الذي غمرت فيه الثمار مسبقاً من ٢٥ إلى ٤٢°م وكان إنتاج ثاني أكسيد الكربون والإثيلين في الثمار التي تعرضت للحرارة المنخفضة لمدة أسبوعين ثم نقلت إلى حرارة ١٢°م أعلى عما في الثمار التي لم تُعرض للحرارة المنخفضة، ولكن لم تظهر اختلافات بين معاملات الغمر في الماء

الدافئ أو الساخن فيما يتعلق بإنتاج الثمار من غاز ثانى أكسيد الكربون، بينما أدت معاملة غمر الثمار فى الماء الساخن قبل تخزينها فى الحرارة المنخفضة إلى انخفاض إنتاجها من الإثيلين، وازداد هذا الانخفاض بزيادة درجة حرارة الماء الذى غمرت فيه الثمار من ٢٥ إلى ٤٢°م، واستمر هذا التأثير لمدة ٧٢ ساعة بعد نقل الثمار إلى ٢١°م، وتأثر محتوى الثمار من مركب ACC بتلك المعاملات مثلما تأثر إنتاجها من غاز الإثيلين أما نشاط ACC oxidase فقد كان أعلى فى الثمار التى لم تتعرض لأضرار الحرارة المنخفضة (وهى التى خزنت فى حرارة ١٢°م) - عند بداية نقلها إلى حرارة ٢١°م - عما فى الثمار التى تعرضت للحرارة المنخفضة، كما انخفض نشاط ACC oxidase بزيادة درجة حرارة الماء الذى غمرت فيه الثمار

التدفئة المتقطعة أثناء التخزين البارد

التدفئة المتقطعة intermittent warming هى تعريض المنتجات المخزنة فى حرارة منخفضة - لفترة واحدة أو أكثر من فترة - فى حرارة مرتفعة ويجب أن تتم هذه المعاملة قبل أن تتقدم أضرار البرودة إلى مرحلة لا رجوع فيها؛ لأن ذلك إن حدث فهو يعنى أن معاملة التدفئة تؤدي إلى إسراع ظهور أعراض البرودة؛ ولذا فإن توقيت معاملة التدفئة يعد أمراً حيوياً، ومن الأهمية بمكان التعرف على بدايات حدوث أضرار البرودة

وقد اتبعت طريقة التدفئة المتقطعة فى تجنب أضرار البرودة فى كلٍّ من الليمون الأضاليا، واليامية، والخيار، والفلقل الحلو، والكوسة، والخوخ، والنكتارين ولكل محصول منها الفترات الحرجة - الخاصة به - المناسبة لمعاملة التدفئة.

فمثلاً وجد Cabrera & Saltveit (١٩٩٠) أن تدفئة ثمار الخيار بنقلها من ٢.٥°م إلى ١٢.٥°م لمدة ١٨ ساعة كل ثلاثة أيام قلل من أضرار البرودة التى ظهرت عليها وبالمقارنة فقد ظهرت أضرار شديدة للبرودة - تمثلت فى تنقير شديدة وتحلل - عندما خزنت الثمار على حرارة ثابتة مقدارها ٢.٥°م لمدة ١٣ يوماً، وذلك بعد ستة أيام

الفصل الخامس: الخيار

من نقلها إلى ٢٠°م، بينما لم تظهر أية أعراض لأضرار البرودة عندما خزنت الثمار على حرارة ثابتة مقدارها ١٢.٥°م، ثم نقلت بعد ذلك إلى حرارة ٢٠°م.

وفي دراسة لاحقة (Caberara & Saltveit ١٩٩١) استعمل الباحثان التدفئة المتقطعة بالنظام السابق بيانه، ولكن على حرارة ٢٠°م بدلاً من ١٢.٥°م، ووجدوا أنها منعت تماماً ظهور أية أضرار للبرودة. من جراء التخزين على حرارة ٢٠.٥°م لمدة ١٣ يوماً، علماً بأن الثمار التي لم تعامل بالتدفئة المتقطعة ظهرت عليها أضرار البرودة بعد أسبوع من نقلها من حرارة ٢٠.٥°م - التي ظلت فيها لمدة ٧ أيام - إلى حرارة ٢٠°م، وأن شدة هذه الأضرار ازدادت بزيادة فترة بقاء الثمار في الحرارة المنخفضة كذلك ظهرت نموات فطرية على الثمار التي خزنت على ٢٠.٥°م بعد أربعة أيام من نقلها إلى ٢٠°م، بينما لم يحدث ذلك في الثمار التي أعطيت معاملة التدفئة المتقطعة. وقد لوحظ حدوث زيادة مؤقتة في معدل تنفس الثمار وإنتاجها من الإثيلين خلال فترات التدفئة المتقطعة، وكانت تلك الزيادات أعلى في دورة التدفئة الأولى عما كان عليه الحال في دورتي التدفئة الثانية والثالثة

كذلك وجد أن أضرار البرودة ازدادت في ثمار الخيار بزيادة فترة تخزينها في حرارة ٢°م، وكان معدل التنفس والنشاط الأيضي في تلك الثمار أعلى مما في الثمار التي خزنت على حرارة ٢٠°م. وقد أدى تعريض الثمار للهواء الدافئ على حرارة ٤٠°م لمدة ٤٨ أو ٧٢ ساعة قبل تخزينها في حرارة ٤°م إلى استمرار معدل التنفس فيها بصورة طبيعية، وحصل على نتيجة مماثلة بتدفئة الثمار على فترات أثناء التخزين البارد. كذلك ازداد إنتاج الإثيلين والتسرب الأيوني بزيادة فترة التخزين البارد، وأمكن تجنب ذلك بتعريض الثمار لدورتين على الأقل من التدفئة على فترات هذا بينما لم تؤثر معاملة الثمار بكلوريد الكالسيوم معنوياً على حساسيتها لأضرار البرودة (Imani وآخرون ١٩٩٥).

ومن بين النظريات الافتراضية التي اقترحت لتفسير تأثير التدفئة المتقطعة أن رفع درجة الحرارة في وسط معاملة البرودة يحفز النشاط الأيضي، الأمر الذي يسمح للأنسجة النباتية بتصريف المركبات الوسيطة أو المركبات السامة التي تتراكم خلال فترة التعريض

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

للبرودة، بتحويلها إلى مركبات غير ضارة كذلك قد تسمح تدفئة الأنسجة لفترات قصيرة بمعالجة الأضرار التي تحدث للأغشية الخلوية، وعضيات الخلية، والنسارات الأيضية خلال فترة التعريض للبرودة كما قد تفيد التدفئة في إعادة توفير المركبات التي تستنفذ أو التي لا يمكن تمثيلها خلال معاملة البرودة وقد تلعب تلك التغيرات الحرارية الفجائية (من البرودة إلى الدفء ثم إلى البرودة) دوراً في زيادة تمثيل الأحماض الدهنية غير المشبعة، الأمر الذي يجعل الأغشية الخلوية أكثر مرونة، ويزيد من تحملها للحرارة المنخفضة (عن Wang 1994)

المعاملة بالـ 1-MCP

بينما أدى تعريض ثمار الخيار (الإنجليزى الطويل عديم البذور) لمصدر خارجي من الإيثيلين بتركيز 3-5 ميكروليتر/لتر إلى إسراع تحلل محتواها من الكلوروفيل، فإن تبخيرها بالـ 1-MCP - قبل تعرضها المستمر للإيثيلين - أدى إلى منع تحلل ما بها من كلوروفيل لمدة تراوحت بين 9، و 14 يوماً، ولكن لم تكن للمعاملة بالـ 1-MCP فوائد أخرى (Nilsson 2005)

المعاملة بحامض السلسليك

كانت معاملة ثمار الخيار بحامض السلسليك بتركيز 0.5 مللى مول قبل تخزينها لمدة 18 يوماً على 1°م عالية الكفاءة في خفض حساسيتها لأضرار البرودة. كذلك أدت تلك المعاملة إلى المحافظة على صلابة الثمار وعلى مستوى منخفض من محتواها من الـ malonaldehyde مقارنة بما حدث في ثمار الكنترول هذا في الوقت الذي أدت فيه المعاملة بحامض السلسليك إلى تأخير الانخفاض في محتوى الثمار من حامض الأسكوربيك ومحتوى جلدها من الكلوروفيل، كما ازداد في الثمار المعاملة نشاط إنزيمات الـ superoxide dismutase، والـ catalase، والـ peroxidase، والـ ascorbate peroxidase، والـ phenylalanine ammonia lyase تحت ظروف شد حرارة التخزين المنخفضة ويعنى ذلك أن معاملة الخيار بحامض السلسليك بتركيز 0.5

الفصل الخامس: الخيار

مللى مول تحميها بكفاءة عالية من الإصابة بأضرار البرودة على 1°C ، وأن تلك الحماية تحدث من خلال زيادة المعاملة لنشاط الإنزيمات المضادة للأوكسدة وللـ phenylalanine ammonia lyase (Cao وآخرون ٢٠٠٩).

التخزين

التخزين البارد العادي وأضرار البرودة

يخزن الخيار على $10-12.5^{\circ}\text{C}$ و ٩٥٪ رطوبة نسبية لمدة ١٤ يوماً، يتدهور بعدها سريعاً في كل من مظهره وطعمه فبعد هذه الفترة يظهر على الثمار أعراض الانكماش والاصفرار والتحلل. وعلى حرارة أقل من 10°C تظهر على الثمار أعراض الإصابة بأضرار البرودة في خلال ٢-٣ أيام.

ومن أهم مشاكل الثمار بعد حصادها اصفرارها؛ الأمر الذي يزداد معدله في الثمار التي تحصد في عمر متقدم، ولدى التعرض للإيثيلين - ولو بتركيز ٠.١ جزءاً في المليون لمدة ٤٨ ساعة - والتخزين في حرارة منخفضة (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧). كذلك تكون فترة التخزين أقصر في الثمار ذات اللون الأخضر الفاتح عما في الثمار ذات اللون الأخضر الداكن (عن Mattsson ١٩٩٣).

أما أصناف التخليل التي قد تُخزن ثمارها مؤقتاً لحين تخليلها فإنها توضع في حرارة 10°C ورطوبة نسبية ٩٥٪، وتتفاوت الأصناف كثيراً في مدى قدرة ثمارها في الاحتفاظ بنضارتها تحت هذه الظروف؛ فهي تتراوح - مثلاً - من ١٠ أيام في الصنف Ohio MR200 إلى ٤٧ يوماً في الصنف ماركتر Marketer (عن Robinson & Decker Walters ١٩٩٧).

وتتعرض الثمار للإصابة بأضرار البرودة إذا خزنت في حرارة تقل عن 7°C لمدة أكثر من يومين. وتظهر هذه الأضرار على شكل بقع مائية، ونقر، وانهيار بأنسجة الثمرة، كما تتحلل أنسجة الثمرة بسرعة بعد إخراجها من المخزن. ويؤدي تخزين الثمار - في حرارة تزيد عن 10°C - إلى سرعة اصفرارها، ويبدأ التغير في اللون في غضون يومين.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتزداد سرعته إذا وجدت ثمار تفاح، أو غيره من الثمار المنتجة للإثيلين مع الخيار فى المخزن أما الرطوبة النسبية العالية فترجع أهميتها إلى منع الانكماش وذبول الثمار بسرعة أثناء التخزين (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨).

وعلى الرغم من أن جميع أصناف الخيار تعد حساسة لأضرار البرودة، فإنه توجد بعض الاختلافات بين الأصناف والسلالات فى مدى تحملها لتلك الأضرار؛ فمثلاً يعتبر الصنف داشر ٢ Dasher II أكثر تحملاً من الصنف بوينست ٧٦ Poinsett 76 (عن Jennings & Saltveit ١٩٩٤).

ويوجد ارتباط قوى بين مدى فقد الثمار لرطوبتها خلال مدة خمسة أيام من التخزين على حرارة ٥°م ورطوبة نسبية ٦٥٪، وبين شدة أضرار البرودة التى تظهر عليها بعد يومين أو أربعة أيام من نقلها - بعد التخزين البارد - إلى حرارة ١٥°م ورطوبة نسبية ٨٥٪ (Purvis ١٩٩٥).

وقد ظهرت اختلافات بين أصناف الخيار فى حساسية ثمارها للإصابة بأضرار البرودة، وكانت الأصناف الأكثر مقاومة أعلى فى محتوى عصيرها (الإفرازات التى تظهر عند قطع الثمار) من المواد الصلبة، كذلك بدا أن ذلك المحتوى من المواد الصلبة يرتبط بدرجة إصابة الثمار بالتنقيير (Cabrera & Saltveit ١٩٩٣).

كما تتوفر اختلافات بين أصناف وسلالات الخيار فى حساسيتها لأضرار البرودة على ١°م، وخاصة فى درجتى التنقيير pitting والتحلل decay. وقد تبين أن التحلل والفقد فى الوزن كانتا الصفتان الوحيدتان اللتان ارتبطتا بصفة التنقيير التى تسببها الحرارة المنخفضة (Abdul Hakim وآخرون ١٩٩٩).

وقد وجد Fan وآخرون (١٩٩٦) أن محتوى ثمار الخيار من البوترسين Putrescine يزداد قبل ظهور أضرار البرودة على الثمار التى خزنت لمدة ثلاثة أيام على حرارة ٢°م وبينما أحدث وضع الثمار على حرارة ١٣°م قبل تخزينها على حرارة ٢°م نقصاً معنوياً فى أضرار البرودة التى ظهرت عليها، فإن مستوى البوترسين ازداد بالطريقة ذاتها،

الفصل الخامس: الخيار

ولكن محتوى الاسبرميدين Spermidine كان أقل قليلاً في الثمار التي سبق وضعها في حرارة ١٣°م قبل تخزينها على ٢°م

ويجب عند شحن الخيار خفض حرارة الحاويات إلى ١٠°م على ألا ترتفع الحرارة عن ١٣°م مع توفير تهوية بمعدل ٣٠م³/ساعة (٢٠ قدم³/دقيقة) للحاويات الـ ٢٠ قدم، و ٦٠م³/ساعة (٣٥ قدم³/دقيقة) للحاويات الـ ٤٠ قدم، هذا مع توفير ٩٠٪-٩٥٪ رطوبة نسبية (Optimal Fresh ٢٠٠١ - الإنترنت).

التخزين في الجو المتحكم في مكوناته

يؤدي تخزين الخيار في جو يحتوى على حوالى ٥٪ CO₂، أو ٥٪ O₂ إلى تأخير اصفرار ثمار الخيار، ويزداد هذا التأثير عند الجمع بين نسبتي الغازين. هذا إلا نسبة ثاني أكسيد الكربون المرتفعة - ودرجة أقل - نسبة الأكسجين المنخفضة - تزيدان من حساسية الخيار لأضرار البرودة. وحتى في درجات الحرارة العادية، فإن نسبة شأني أكسيد الكربون يجب ألا تزيد عن ١٠٪، وألا تقل نسبة الأكسجين عن ٢٪. ويفيد الجو الذى يحتوى على ٣٪ O₂، أو ٥٪-١٠٪ CO₂ في تثبيط إنتاج الثمار لغاز الإثيلين، وخاصة عندما تخزن الثمار مختلطة مع غيرها من الثمار المنتجة للإثيلين مثل الكنتالوب، والتفاح، والكمثرى. ويمكن إطالة فترة تخزين الخيار إلى نحو ٢-٣ أسابيع بتخزينها في جو يحتوى على ٥٪ CO₂، و ٥٪ O₂ (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

التخزين مع التعبئة في الأغشية المعدلة للهواء

أدى تخزين الثمار على حرارة ٥°م ورطوبة نسبية مقدارها ٩٠٪-٩٩٪ لمدة ١٨ يوماً إلى زيادة محتواها من البوترسين، وكانت تلك الزيادة في البوترسين أكبر عندما كان تخزين الثمار في أكياس بلاستيكية غير مثقبة، كما ازداد محتوى الثمار من الاسبرميدين عندما كان تخزينها في أكياس بلاستيكية مثقبة أو غير مثقبة. ونظراً لأن أضرار البرودة التي ظهرت على الثمار كانت أقل عند التخزين في الأكياس البلاستيكية غير المثقبة مما كان عليه الحال عند التخزين في الأكياس البلاستيكية المثقبة، والتي كانت فيها أضرار

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

البرودة أقل - بدورها - مما فى حالة التخزين المائي؛ لذا... اقترح أن هذه المستويات العالية من البولي أمينات Polyamines تُسهم فى تحمل الثمار المعبأة فى الأكياس لأضرار البرودة (Wang & Qi 1997).

كذلك وجد أن ثمار الخيار التى عبئت فى الأكياس البلاستيكية المصنوعة من البوليثلين ذى الكثافة المنخفضة، والتى بلغ سمكها 31,75 ميكرونًا - سواء أكانت مثقبة، أم غير مثقبة (كانت الأكياس 33,5 سم × 35 سم وتتسع لثلاث ثمار) - وجد أن أضرار البرودة التى ظهرت على هذه الثمار بعد 18 يومًا من تخزينها على 5°م ورطوبة نسبية 90-95% كانت أقل مما فى الثمار التى لم تعبأ فى الأكياس وكانت أضرار البرودة فى الثمار التى عبئت فى أكياس غير مثقبة أقل مما كان عليه الحال فى الثمار التى عبئت فى أكياس مثقبة وقد وجد أن تركيز ثانى أكسيد الكربون ازداد داخل الأكياس غير المثقبة إلى 3%، بينما انخفض فيها تركيز الأكسجين إلى 16% وكانت أقل الإصابات الفطرية ظهورًا فى الثمار التى عبئت فى الأكياس غير المثقبة. وبالمقارنة لم يحدث تغير يذكر فى تركيز الأكسجين وثانى أكسيد الكربون داخل الأكياس المثقبة مقارنة بنسبتها فى الجو العادى. وبينما بلغ الفقد فى وزن الثمار غير المعبأة فى الأكياس 9% فى خلال 18 يومًا من التخزين، فإن الفقد فى وزن الثمار المعبأة فى أكياس بلاستيكية مثقبة أو غير مثقبة لم تتعد نسبته 1% (Wang & Qi 1997).

وقد وجد Zhang وآخرون (1996) أن تغليف الثمار فى أغشية البوليثلين - مع تخزينها على 12°م - أدى إلى تقليل فقدائها للرطوبة، وعدم اصفرارها، وتثبيت تحليل البروتينات الذائبة فيها.

كذلك أدى تخزين ثمار الخيار فى أكياس بلاستيك (اسمها التجارى إكستند Xtend) إلى خفض فقدائها للوزن، ومنع انكماشها وذبولها، واصفرارها، ومنع إصابتها بأضرار البرودة والأعفان سواء أكان تخزينها فى حرارة مثلى (10°م)، أم منخفضة (7°م)، أم عالية (12°م) (Rodov وآخرون 1998).

الفصل الخامس: الخيار

ولدى مقارنة التغليف بأغشية البولييثيلين ذات الكثافة المنخفضة وأغشية السيراميك ceramic film بسمك ٢٠، و ٣٠، و ٤٠ ميكرونًا، كانت أفضلها في المحافظة على صفات الجودة أثناء التخزين أغشية السيراميك بسمك ٢٠ ميكرونًا (Park & Kang ١٩٩٨).

وعموماً .. تتبع طريقة تغليف الثمار بأغشية البولييثيلين في أصناف البيوت المحمية، وخاصة الأصناف ذات الثمار الطويلة، والتي تكون ذات جلد رهيف وتفقد رطوبتها بسهولة، بينما يكفي تشميع ثمار الأصناف الأخرى.

الفصل السادس

الكوسة

يبدأ حصاد نباتات قرع الكوسة بعد نحو ٤٠ يوماً من الزراعة في الجو الدافئ، وبعد نحو ٥٠ يوماً في الجو البارد نسبياً. ويتطلب وصول الثمار إلى مرحلة النضج الإستهلاكى مدة يوم إلى أربعة أيام من العقد في الأصناف الزوكيني، ومن ٤ إلى ٥ أيام في الأصناف الإسكالوب، ومن ٦ إلى ٧ أيام في الأصناف الصفراء ذات الرقبة المستقيمة والملتوية.

تأثير الظروف السابقة للحصاد على القدرة التخزينية للثمار

أوضحت دراسات Savvas وآخرون (٢٠٠٩) أن التغذية بالسيليكون لا تؤثر على قدرة ثمار الكوسة الزوكيني على التخزين، بينما تؤدي زيادة الملوحة (كلوريد الصوديوم) في المحاليل المغذية إلى تحسين تلك القدرة قليلاً، ولكن مع تأثيرات سلبية على كل من وزن الثمرة والمحصول الصالح للتسويق.

الحصاد

تحصد الثمار وهي صغيرة إلى متوسطة الحجم، ولم تتصلب قشرتها بعد وتفضل معظم الأسواق أن تحصد الثمار قبل أن يسقط تويج الزهرة من الثمرة وتسوق بها، إلا أن بعض المناطق الريفية تفضل الثمار الأكبر حجماً، ويزداد المحصول كلما سُحج للثمار بالزيادة في الحجم قبل الحصاد، ولكن نوعية الثمار تكون منخفضة.

يستمر حصاد الكوسة حوالى شهرين، ويكون الحصاد كل ٢ إلى ٣ أيام صيفاً، وكل ٥ إلى ٧ أيام شتاءً، وتحصد الثمار عادةً بجزء من العنق. وفي حالة تخطى الثمرة لمرحلة النضج الاستهلاكى .. فإنه يجب قطعها والتخلص منها، وذلك لأن تركها على النبات يؤدي إلى ضعف ونقص محصوله

التداول

يجب تداول الثمار بعناية تامة بعد الحصاد لتقليل الجروح بقدر الإمكان، خاصة عند الرغبة في تخزين المحصول تدرج ثمار الكوسة – غالباً – على أساس الحجم، ويتم فرز الثمار المجروحة والزائدة النضج أثناء التدريج.

وغالباً ما تعامل ثمار الكوسة بشموع أو زيوت معتمدة لأجل خفض فقدتها للرطوبة وتقليل تجريحها، مع تحسين مظهرها (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧).

فسيولوجيا الكوسة بعد الحصاد

يتباين معدل تنفس ثمار الكوسة حسب درجة الحرارة، كما يلي:

المحارة (م)	معدل التنفس (بجم ثاني أكسيد كربون/كجم في الساعة)
صفر	٦-٧
٥	٧-١٠
١٠	١٧-١٨
١٥	٣٧-٤٥
٢٠	٤٢-٤٨

أما معدل إنتاج ثمار الكوسة للإثيلين فإنه يتراوح بين ٠,١ و ١ ميكروليتر/كجم في الساعة على ٢٠°م

وتعد ثمار الكوسة منخفضة إلى متوسطة الحساسية للإثيلين الخارجي، ومن أهم أضراره فقد الثمار الخضراء لونها الأخضر لدى تعرضها لتركيزات منخفضة من الغاز (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧).

وتعد الكوسة من الخضر شديدة الحساسية للإصابة بأضرار البرودة، كما سيأتي بيانه تحت موضوع التخزين.

معاملات خاصة تُعطىها الكوسة قبل التخزين والشحن للحد من أضرار البرودة

المعاملات الحرارية

أدى تخزين ثمار الكوسة الزوكيني من صنف أمباسدور لمدة يومين على حرارة 10°م أو 15°م - قبل تخزينها بعد ذلك على حرارة 25°م أو 5°م - إلى تأخير بداية ظهور أعراض البرودة. كذلك أدى تبادل وضع الثمار في دورات من يومين في حرارة منخفضة يليهما يوم واحد في حرارة 20°م إلى الحد من الإصابة بأضرار البرودة (Kramer & Wang, 1989).

كما أوضحت دراسات Wang (1991) أن تعريض ثمار الكوسة لحرارة 10°م لمدة يومين بعد حصادها وقبل تخزينها في حرارة 20.5°م أدى إلى زيادة محتوى الثمار من حامض الأبسيسيك وتأخير ظهور أضرار البرودة وتقليل شدتها، فلم تظهر أية أعراض لأضرار البرودة إلا بعد 6 أيام من التخزين على 25°م ، وكانت الأعراض حينئذ طفيفة، بينما بدأت النقر السطحية على ثمار المقارنة (معاملة الشاهد) بعد 4 أيام من التخزين البارد، وكانت الأعراض شديدة بعد 8 أيام. واستمر مستوى حامض الأبسيسيك عاليًا في الثمار التي وضعت في البداية لمدة يوم واحد على حرارة 10°م عما في ثمار الكنترول طوال فترة التخزين التي دامت لمدة 10 أيام. وقد أدى تشريب الثمار بحامض الأبسيسيك بتركيز 0.5 أو 1.0 مللي مولار - تحت ضغط - قبل تخزينها على حرارة 25°م إلى زيادة مستوى حامض الأبسيسيك الطبيعي في الثمار، وتأخير ظهور أعراض البرودة وتقليل شدتها، وذلك مقارنة بما حدث في الثمار التي شربت ابتداءً بالماء المقطر.

وفي دراسة لاحقة، وجد Wang وآخرون (1992) أن تعريض ثمار الكوسة الزوكيني (صنف أمباسدور) لحرارة 15°م لمدة يومين قبل تخزينها على 5°م أخر ظهور أعراض أضرار البرودة بنحو 3-5 أيام، مقارنة بالثمار التي لم تعرض لحرارة 15°م قبل التخزين البارد. وأوضحت الدراسة أن التخزين في حرارة 5°م أحدث نقصًا في محتوى الثمار من الفوسفوليبيدات، وأن سبق تعريض الثمار لحرارة 15°م قلل ذلك النقص كما انخفضت درجة تشبع الأحماض الدهنية في الفوسفوليبيدات خلال

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

التخزين البارد، وقللت معاملة الثمار بحرارة ١٥°م قبل التخزين البارد من شدة الانخفاض كذلك ازدادت نسبة الاستيروولات الحرة إلى الفوسفوليبيدات الكلية أثناء التخزين البارد، ولكن ثبتت معاملة الثمار بحرارة ١٥°م من تلك الزيادة في النسبة وتعني هذه النتائج أن وضع الثمار في حرارة ١٥°م لمدة يومين قبل تخزينها في حرارة ٥°م يحمي أغشيتها الخلوية من التلف الذي تحدثه الحرارة المنخفضة في النيبيدات الجسرينية glycerolipids.

كذلك وجد أن شدة أعراض أضرار البرودة في ثمار الكوسة (صنف إليت Elite) التي خزنت في حرارة ٥°م، ثم نقلت إلى حرارة ٢٠°م انخفضت عندما عوملت مسبقاً - قبل تخزينها البارد - بالماء الساخن على حرارة ٤٢°م لمدة ٣٠ دقيقة. كما ازداد الانخفاض في شدة أعراض البرودة عندما عرضت الثمار لحرارة ١٥°م لمدة يومين قبل تعريضها لمعاملة الماء الساخن التي سبقت التخزين البارد على ٥°م وبينما لم تظهر أية أعراض لأضرار البرودة على الثمار التي خزنت في حرارة ١٥°م، فإن الفقد في وزنها كان أكبر عما في الثمار التي خزنت على ٥°م لمدة أسبوعين. وكان الفقد في الوزن متماثلاً في الثمار التي عوملت بالماء الساخن والتي لم تعامل. وقد ازداد مستوى البوترسين في الثمار مع الوقت أثناء التخزين على ٥°م وكان مستواه في الثمار التي أعطيت معاملة الماء الساخن منخفضاً في البداية، ولكنه ازداد سريعاً بعد التخزين على ٥°م، وظهرت زيادة مماثلة لذلك في مستوى البوترسين في الثمار التي عرضت لحرارة ١٥°م لمدة يومين وقد انخفض مستوى الاسبرميدين والاسبرمين في كل المعاملات أثناء التخزين على ٥°م، ولكن ذلك الانخفاض قلت حدته في قشرة الثمار التي عوملت بحرارة ١٥°م أو بالماء الساخن عما في ثمار الكنترول (Wang ١٩٩٤).

كما أدت معاملة تعريض الثمار لحرارة ١٥°م لمدة يومين قبل تخزينها على ٥°م إلى تثبيط حدوث أى زيادة في نشاط إنزيم البيروكسيداز peroxidase، وخفض التدهور في نشاط إنزيم الكاتاليز؛ الأمر الذي لم يحدث في الثمار المخزنة في حرارة ٥°م، والذي يكون مصاحباً بظهور أضرار البرودة. كما كان مستوى نشاط إنزيم superoxidase

dismutase أعلى في الثمار التي عوملت بحرارة ١٥°م لمدة يومين عما في ثمار الكنترول التي لم تعط هذه المعاملة (Wang ١٩٩٥)

وفي دراسة تالية وجد Wang (١٩٩٦) أن تعريض ثمار الكوسة الزوكيني صنف إليت لحرارة ١٥°م لمدة يومين قبل تخزينها على ٥°م أدى - إلى جانب تأخير ظهور أعراض البرودة - إلى التأثير على نظام مضادات أكسدة حامض الأسكوربيك في الحرارة المنخفضة من خلال التأثير على نشاط الإنزيمات.

Ascorbate free reical reductase

Acorbate peroxidase

Dehydroascorbate reductase

وقد انخفض محتوى ثمار معاملة الشاهد من حامض الأسكوربيك أثناء تخزينها على ٥°م. كذلك انخفض محتوى الثمار التي عرضت لحرارة ١٥°م لمدة يومين قبل تخزينها على ٥°م انخفض محتواها من حامض الأسكوربيك أثناء تخزينها على ٥°م، ولكن بدرجة أقل مما في ثمار الكنترول. أما محتوى الثمار من الدي هيدرو حامض الأسكوربيك dehydroascorbic acid فلم يتغير جوهرياً في كلتا المعاملتين أثناء التخزين على ٥°م. وقد ازداد نشاط الإنزيمات الثلاثة المؤثرة على نظام مضادات أكسدة حامض الأسكوربيك .. ازداد نشاطها ابتداءً بعد ٤- ٨ أيام من التخزين، ثم انخفض بعد ذلك في ثمار كلتا المعاملتين، ولكن نشاط الإنزيمات ازداد إلى درجة أكبر وظل أعلى في الثمار التي عرضت لحرارة ١٥°م لمدة يومين عما في ثمار الكنترول.

وبالمقارنة بما سبق . وجد Deswarte وآخرون (١٩٩٥) أن أضرار البرودة كانت أعلى جوهرياً في الثمار التي عرضت لحرارة ٣٠°م لمدة نصف ساعة أو ثماني ساعات قبل تخزينها على ٢°م عما في الثمار التي لم تتلق تلك المعاملة، هذا بينما لم تظهر على الثمار التي خزنت على ١٠ أو ١٣°م أية أضرار كذلك أوضح Jacobi وآخرون (١٩٩٦) أن تعريض ثمار الكوسة الزوكيني لهواء ساخن رطب استمر إلى حين وصول حرارة قلب الثمار إلى ٤٥°م لمدة ٣٠ دقيقة أدى إلى زيادة اصفرار جلد الثمار أثناء التخزين

المعاملة بأملاح الكالسيوم وبنزوات الصوديوم

أمكن خفض شدة اضرار البرودة في ثمار الكوسة المخزنة على ٤°م بغمسها قبل التخزين في محلول كلوريد كالسيوم بتركيز ١٪، أو بنزوات الصوديوم بتركيز ١٠ مللى مول لمدة ٣٠ دقيقة على ٢٠°م وقد أظهرت الثمار التي عوملت ببنزوات الصوديوم إصابة بأضرار البرودة تقل عن ١٠٪ بعد ٣٠ يوماً من التخزين على ٤°م (Lee & Yang ١٩٩٩)

المعاملة بمتعددات الأمين

أدى تشريب ثمار الكوسة بأى من متعددات الأمينات polyamines بتريسين putrescine، أو اسبرميدين spermidine، أو اسبرمين spermine إلى توفير حماية للأغشية الخلوية، وخاصة في معاملة الاسبيرميدين الذى قلل من التسرب الأيونى بنحو ٦٧٪ إلى ٨٢٪، مقارنة بما حدث في ثمار الكنترول، وذلك في الثمار التى خزنت على ٢°م وقد تراوح التركيز المناسب من مختلف متعددات الأمين بين ١،١ و ١٥ مللى مول (Ramos-Clamont وآخرون ١٩٩٧)

المعاملة بالمثيل جاسمونيت

وجد أن تشريب ثمار الكوسة بمركب ميثيل جاسمونيت Methyl Jasmonate (تحت ضغط ٨٢٧ كيلو باسكال لمدة ٣ دقائق) قبل تخزينها على حرارة ٥°م أدى إلى تأخير بداية ظهور أعراض أضرار البرودة بنحو يومين إلى أربعة أيام مقارنة بثمار معاملة الشاهد التى شُربت بالماء المقطر، وبدأت تظهر عليها أعراض أضرار البرودة بعد ٤ أيام من التخزين البارد وقد ازداد تركيز حامض الأبسيسيك فى الجدار الثمرى الخارجى لثمار معاملة الكنترول بعد معاملة البرودة. وحدثت زيادة أكبر فى تركيز الحامض فى الثمار التى عوملت بمثيل الجاسمونيت، مما يدل على أن الجاسمونيت قد يحفز تمثيل حامض الأبسيسيك فى الحرارة المنخفضة وقد أظهرت الثمار المعاملة وثمار الكنترول زيادات متماثلة فى محتواها من البوتريسين putrescine عندما

تعرضت للحرارة المنخفضة بينما انخفض محتوى الثمار من كل من الاسبرميدين spermidine والاسبرمين spermine في الحرارة المنخفضة في كلتا المعاملتين، إلا أن الثمار المعاملة بالجاسمونيت احتفظت بمستوى أعلى من الاسبرميدين والاسبرمين - اللذان يقللان من أكسدة الليبيدات - عن ثمار معاملة الكنترول طوال فترة التخزين على ٥° م ويعنى ذلك أن مثيل الجاسمونيت يمنع ظهور أعراض أضرار البرودة من خلال عملية تنظيم لمستوى كل من حامض الأبسيسيك والبولي أمينات (Wang & Buta ١٩٩٤، و Wang ١٩٩٤).

التخزين

التخزين البارد العادى وأضرار البرودة ظروف التخزين المناسبة وأعراض أضرار البرودة

تعد ثمار الزوكيني شديدة الحساسية للإصابة بأضرار البرودة، حيث تصاب بأضرار دائمة في خلال يوم واحد إلى يومين من التخزين على حرارة تقل عن ٥° م. ومن أهم تلك الأعراض ظهور نقر سطحية دائرية أو طولية مائية المظهر على الثمار، مع تغيرات في لونها، وتدهور في الصفات الأكلية، مع ذبول الثمار واصفرارها وتحللها. وقد ترجع تلك الأعراض إلى الأضرار التي تحدثها الحرارة المنخفضة بالأغشية الخلوية (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧).

وتفقد ثمار الكوسة صلاحيتها للتسويق بعد ٥ أيام من تخزينها على ٢° م وبعد ٢٠ يوماً من تخزينها على ١٠° م وبينما لم تظهر أى أعراض لأضرار البرودة على الثمار التي خزنت على ١٢° م، فإنها لم تكن صالحة للتسويق بعد ٢٠ يوماً بسبب تدهور صفاتها.

وبسبب أضرار البرودة، فإنه يوصى بتخزين ثمار الزوكيني على ٧-١٠° م، مع رطوبة نسبية تتراوح بين ٩٠٪ و ٩٥٪، حيث يمكن أن تحتفظ الثمار بجودتها لمدة ٧-١٤ يوماً ويؤدي التخزين في حرارة أعلى من ١٠° م إلى ليونة الثمار وتغير طعمها (عن Kramer & Wang ١٩٨٩).

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية - التداول والتخزين والتصدير

وتبدأ أضرار التجمد في الظهور على حرارة -0.5°C ، ومن أهم أعراضها وجود مساحات مائية المظهر

(الاختلافات الوراثية في الحساسية لأضرار البرودة)

تتفاوت طرز الكوسة وأصنافها في شدة حساسيتها لأضرار البرودة، وفي معدلات تنفس ثمارها وإنتاجها للإثيلين أثناء التخزين.

ويعتبر جين B - وهو الجين المسئول عن ظهور الصبغة الصفراء في ثمار الكوسة، والذي أدخل في عديد من الأصناف - يعتبر هذا الجين من أكثر الجينات تأثيراً على صفات الثمار (ذلك لأنه له تأثير متعدد Pleiotropic)، ويرتبط بشدة بجينات أخرى قد تكون مرغوبة أو غير مرغوب فيها كما أن ظهور تلك الصفات يتوقف على تفاعل الجين B مع الخلفية الوراثية للنبات ومن بين التأثيرات السلبية للجين B زيادته لحساسية الثمار لأضرار البرودة

ولدى مقارنة سلالات ذات خلفية وراثية متشابهة isogenic lines فيما عدا احتوائها، أو عدم احتوائها على الجين B بحالة أصلية - من الصنفين Caserta (وهو من طراز المارو marrow)، و Benning's Green Tint (وهو من طراز الإسكالوب scallop) كانت معدلات تنفس الثمار وإنتاجها للإثيلين - في درجات الحرارة المعتدلة - أعلى دائماً في المارو عما في الإسكالوب، ولم يكن للجين B أى تأثير على معدل التنفس في تلك الحرارة المعتدلة، إلا أن وجود الجين B حفز الزيادة في معدل التنفس التي تسببها الحرارة المنخفضة في طرازي الكوسة كذلك ازداد إنتاج الإثيلين في الحرارة المنخفضة في طرازي الكوسة، ولكن الزيادة كانت أكبر في طراز المارو عما في طراز الإسكالوب، وأدى وجود الجين B إلى مزيد من الزيادة في إنتاج الإثيلين في كلا الطرازين، مع استمرار الاختلاف بينهما أما التسرب الأيوني من الثمار فلم يرتبط بدرجة الحرارة، أو الطراز الصنفى، أو وجود الجين B من عدمه (McCollum

(١٩٩٠)

علاقة عمر الثمرة بحساسيتها لأضرار البرودة

يتبين من دراسات Tatsumi وآخرين (١٩٩٥) أن الحساسية لأضرار البرودة عند تخزين الثمار على ٥°م تنخفض كلما ازداد عمر الثمرة بعد التلقيح من يوم واحد إلى تسعة أيام. ووجدت تركيزات عالية من البوترسين، والاسبرميدين، والاسبرمين في الثمار بعد يوم واحد إلى خمسة أيام من التلقيح، وانخفض مستوى البولي أمينات مع زيادة نضج الثمار. هذا إلا أن مستوى البوترسين في الثمار التي قطفت بعد يوم إلى خمسة أيام من التلقيح ازداد أثناء التخزين، بينما انخفض مستوى الاسبرميدين والاسبرمين أثناء التخزين أيًا كان عمر الثمرة عند حصادها باستثناء مستوى الاسبرمين في الثمار التي قطفت بعد يوم واحد من التلقيح.

التخزين في الجو المتحكم في مكوناته وعلاقة ذلك بالحد من الإصابة بأضرار البرودة

تستفيد الكوسة قليلاً من التخزين في الجو المتحكم في مكوناته، ففي مستوى منخفض من الأكسجين (٣٪-٥٪) يتأخير الاصفرار في الأصناف ذات اللون الأخضر الداكن ويتأخر بدء تحلل الثمار لبضعة أيام. وتتحمل ثمار الزوكيني زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون حتى ١٠٪، إلا أن ذلك لا يفيد في زيادة فترة الصلاحية للتخزين. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون حتى ٥٪ تقلل من حساسية الثمار لأضرار البرودة (عن Suslow & Cantwell ٢٠٠٧).

وأوضحت دراسات Mencarelli (١٩٨٧) أن تخزين ثمار الكوسة الزوكيني في هواء يحتوي على ٢١٪ أكسجين مع ٥٪ ثاني أكسيد كربون قلل كثيراً من إصابة الثمار بأضرار البرودة عندما كان التخزين على ٥°م لمدة ١٩ يوماً، ثم على ١٣°م - في الهواء العادي - لمدة ٤ أيام. وقد وجدت علاقة عكسية بين إصابة الثمار بأضرار البرودة، وبين تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون فيما بين صفر، و ١٠٪ إلا أن تركيز ١٠٪ كان مصاحباً بتغيرات غير طبيعية في طعم الثمار، بينما كانت الإصابة بأضرار البرودة عالية إلى

تكنولوجيا وقسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

درجة غير مقبولة عندما كانت نسبة ثاني أكسيد الكربون في هواء المخزن صفراً، أو ٢٥٪ وكانت دراسات سابقة للباحث ذاته قد أوضحت عدم وجود تأثير يعتمد به لتكريز الأكسجين في هواء المخزن على إصابة ثمار الكوسة بأضرار البرودة.

وقد ظهرت أضرار البرودة متمثلة في التنقير على أكثر من ٩٣٪ من سطح ثمار الكوسة الزوكيني صنف إليت Elite بعد ١٢ يوماً من تخزينها على ٢°م، وازداد تركيز البوترسين putrescine خلال تلك الفترة بنحو ٢٠٠٪ في جلد الثمرة، ونحو ٢٥٠٪ في لبها، بينما ازداد حامض الأبسيسيك في جلد الثمرة فقط وأدت معاملة الثمار بغاز ثاني أكسيد الكربون قبل تخزينها على ٢°م إلى خفض أضرار البرودة وعندما كان تركيز ثاني أكسيد الكربون ٥٪ كانت الزيادة في تركيز البوترسين وحامض الأبسيسيك أقل مما في الكنترول. أما زيادة تركيز الغاز إلى ٤٠٪ فإنها خفضت محتوى الثمار من كل من البوترسين وحامض الأبسيسيك هذا في الوقت الذي انخفض فيه محتوى الثمار من الاسبرميدين spermidine وتركيزه فيها أثناء التخزين أيضاً كانت معاملة ثاني أكسيد الكربون (Serrano وآخرون ١٩٩٨).

ولقد كان تخزين الثمار في جو متحكم فيه يتكون من ١٪ ثاني أكسيد كربون + ١٪ أكسجين، أو ٣٪ ثاني أكسيد كربون + ١٪ أكسجين فعالاً في خفض إصابتها بأضرار البرودة لمدة ١٥، و ٢٠ يوماً، على التوالي، وقد أوصى بتلك الظروف لأجل التخزين الطويل المدى للكوسة (Lee & Yang ١٩٩٩).

تغليف الثمار وتعبئتها في أغشية معدلة للجو

أدى تغليف ثمار الكوسة - كل على انفراد - في أغشية من البوليثيلين المنخفض الكثافة - قبل تخزينها على ١٠°م، و ٨٥٪ رطوبة نسبية - إلى تعديل الهواء المحيط بالثمرة إلى ٢٪-٧٪ أكسجين و ٥٪-٨٪ ثاني أكسيد كربون، وأفاد ذلك في احتفاظ الثمار بجودتها، وبمحتواها من حامض الأسكوربيك، وتقليل فقدتها للرطوبة (Park & Cho ١٩٩٧).

الفصل السادس : الكوسة

وأوضحت دراسات Rodov وآخرون (١٩٩٨) أن تغليف ثمار الكوسة الزوكينى (صنف بلاك ماجك Black Magic) - المنتجة بالطريقة العضوية - بالغشاء البلاستيكي إكستند Xtend (وهو غشاء منفذ لبخار الماء بدرجة عالية، وتتفاوت نوعياته فى درجة نفاذيتها لكل من الأكسجين وثانى أكسيد الكربون) أدى تغلف الثمار إلى تحسين مظهرها، وتثبيت اصفرارها، وفقدانها لصلابتها، ونمو الفطريات السطحية عليها، مع تقليل فقدائها للوزن إلى نصف ما تفقده الثمار المعبأة فى الكراتين التجارية.

وكانت تعبئة الثمار فى أغشية من البوليثلين ضرورية للحفاظ على جودتها أثناء التخزين لمدة أسبوعين على ٥ أو ١٠ م° (Savvas وآخرون ٢٠٠٩)

الكوسة المجهزة للمستهلك

تجهز الكوسة الزوكينى للمستهلك على صورة شرائح يجب أن تكون الشرائح المجهزة ذات قشرة خضراء قاتمة اللون ونسيج داخلى أبيض قَسم cnspy. يجب أن تكون حرارة المنتج الذى يصل المصنع ١٣ م° وأن يخزن بعد وصوله على ٥-١٠ م°، وعلى صفر-٥ م° بعد تجهيزه. ويفيد خفض مستوى الأكسجين فى العبوات إلى ١٪، علمًا بأن خفض الأكسجين إلى ٠,٥٪ يخفض التنفس بنسبة ٥٠٪ على ٥ م°، وبمقدار ٨٠٪ على ١٠ م° مقارنة بالتنفس فى الهواء العادى عند نفس درجات الحرارة.

هذا .. ومن مشاكل الكوسة الزوكينى المجهزة أن يظهر بها مناطق مائية المظهر (نتيجة لأضرار البرودة) على صفر م°، وتلون بنى على ٥-١٠ م° يزدادان مع زيادة فترة التخزين. يمكن غمر شرائح الزوكينى فى محلول كلوريد كالسيوم منقردًا أو مع هيبوكلوريت الصوديوم، علمًا بأن معاملة الكالسيوم تقلل كلا من: الأعفان، والنمو الميكروبي الكلى، وفقدان حامض الأسكوربيك (Barth وآخرون ٢٠٠٤).

الفصل السابع

الفراولة

تكون الثمرة خضراء اللون عند بداية العقد، ثم تتحول إلى اللون الأبيض، ثم تتلون جزئياً باللون الوردى، ثم باللون الأحمر، وتزيد مساحة الجزء الملون تدريجياً. ويكون التلون من الطرف القمى للثمرة نحو الطرف القاعدى.

العوامل المؤثرة فى سرعة نضج الثمار

تتوقف المدة من تفتح الزهرة الأولى لحين نضج الثمرة على درجة الحرارة؛ ففي حرارة ١٥°م تستغرق هذه الفترة حوالى شهر. وبينما تزيد هذه الفترة عن ذلك فى الحرارة الأقل من ١٥°م، فإنها تزداد طولاً - كذلك - مع تقدم موسم الحصاد ومع ارتفاع درجة الحرارة فى نهاية الموسم. وقد تراوح المدى لعشرين صنف - درست على مدى ثلاث سنوات - بين ٢٥، و ٣٨ يوماً بمتوسط قدره ٣٢,١ يوم.

ومتى تفتحت الأزهار فإن الثمار لا تتكون إلا عندما تكون الحرارة أعلى من ٦°م، حيث تسمح هذه الدرجة بتفتح الأزهار، ولكنها لا تسمح بنضج الثمار. ويكون نضج الثمار أكثر تأثراً بدرجة حرارة الليل (عن Avigdon-Avidov ١٩٨٦).

تصل الثمار إلى مرحلة اللون الأبيض بعد ٢١ يوماً من تفتح الزهرة، وتكون تامة الإحمرار بعد ١٠-٢٠ يوماً أخرى. وتكون عملية النضج سريعة للغاية، حيث تحدث فى خلال ٥-١٠ أيام بعد انتهاء مرحلة اللون الأبيض، ويتوقف ذلك على درجة الحرارة (عن Perkins-Veazie ١٩٩٥).

تتوقف سرعة نضج الثمرة - كما أسلفنا - على درجة الحرارة السائدة، ويلزم عادة يومان من بداية تلون الثمرة إلى مرحلة ثلاثة أرباع تلوين، ويومان آخران حتى تصبح الثمرة حمراء تماماً، وهى مازالت صلبة، ويومان إضافيان - وهى على النبات - حتى تصبح رخوة وزائدة النضج.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

وللإضاءة القوية تأثير إيجابي على سرعة نضج الثمار (عن Avigdoni-Avidov ١٩٨٦).

التغيرات المصاحبة للنضج

يصاحب نضج ثمار الفراولة – وهى على النبات – التغيرات التالية:

١ – زيادة الحجم، ويتمثل ذلك فى زيادة حجم الخلايا، وتضخم الفجوات العصارية

٢ – زيادة نسبة الرطوبة.

٣ – نقص الصلابة

٤ – زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية.

٥ – زيادة كبيرة فى نسبة السكريات التى تشكل من ٧٠٪-٨٠٪ من المواد الصلبة الذائبة.

٦ – نقص الحموضة المعيرة.

٧ – تكون الصبغات الأنثوسيانينية الحمراء.

٨ – تمثيل المركبات العطرية المتطايرة المسؤولة عن النكهة المميزة.

وعلى الرغم من أن ثمار الفراولة يمكن أن تتلون بصورة تامة إذا ما قطفت فى مرحلة اللون الأبيض أو الوردى، فإن تغيرات القوام، والسكريات، والحموضة لا تحدث بصورة كاملة كما تحدث فى الثمار التى تقطف فى مراحل أكثر تقدماً من النضج (عن Perkins- Veazie ١٩٩٥).

صفات جودة الثمار

تتكون ثمرة الفراولة الناضجة من خمس مناطق نسيجية هى – من الخارج نحو الداخل – كما يلى.

١ – طبقة بشرة تتكون من خلايا متعددة الجوانب، سمكة الجدر، وشعيرات طويلة مدببة

- ٢ - طبقة تحت بشرة تتكون من خلايا ميرستيمية لا توجد بينها مسافات
- ٣ - القشرة (أو اللحم الحقيقي) تتكون من خلايا ميرستيمية ولا توجد بينها مسافات كذلك.
- ٤ - منطقة حزم تتكون من أوعية مغلطة حلزونياً وحلقياً (الخشب واللحاء).
- ٥ - النخاع ويتكون من خلايا رقيقة الجدر غالباً ما تنفصل أثناء نمو الثمرة تاركة وراءها فراغات كبيرة بينها.

ويبين جدول (٧-١) المدى الطبيعي للمحتوى الكيميائي لثمرة الفراولة (عن Kader ١٩٩١)

جدول (٧-١): المدى الطبيعي للتركيب الكيميائي لثمرة الفراولة.

المكون (الوحدة)	المدى
المواد الصلبة الكلية (%)	١٢,٧-٧,١
المواد الصلبة الذائبة الكلية (%)	١١,٩-٤,٦
المكربات الكلية (%)	٦,٦-٤,١
المكربات المختزلة (%)	٥,٢-٣,٧
الكروم (%)	٢,٥-١,٢
الفراكتوز (%)	٣,٥-١,٧
الجلوكوز (%)	٣,١-١,٤
البكتينات الكلية (%)	٠,٩-٠,٢
pH	٤,١٠-٣,١٨
الحموضة المعايرة (%)	١,٨٧-٠,٥٠
حامض الستريك (%)	١,٢٤-٠,٤٢
حامض الماليك (%)	٠,٦٨-٠,٠٩
حامض الأسكوربيك الكلى (مجم/١٠٠ جم)	١٢٠-٢٦
الفينولات الكلية (مجم/١٠٠ جم)	٢١٠-٥٨
الأنثوسيانينات الكلية (مجم/١٠٠ جم)	١٤٥-٥٥

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

ويحدد طعم الفراولة بمحتواها من كل من السكريات والأحماض. كما يلي،

السكرات	الأحماض	الطعم
عالية	عالية	جيد
عالية	منخفضة	حلو
منخفضة	عالية	لاذع
منخفضة	منخفضة	لا طعم له

ومن أهم صفات جودة الفراولة، ما يلي،

- ١ – درجة النضج، وهى التى تتحدد بنسبة كل من اللونين الوردى والأحمر
- ٢ – اللعنان، وهو دليل على الطراوة وعدم فقد الرطوبة
- ٣ – غياب العيوب، مثل الأعفان، والتحللات، والخدوش، والذبول
- ٤ – الطعم الجيد، وهو الذى يتحدد بالسكريات والحموضة والمركبات المتطايرة
- ٥ – الحجم وتجانسه
- ٦ – الصلابة وعدم وجود ثمار فاقدة لصلابتها أو زائدة النضج (Mitcham ١٩٩٦).

تأثيرات العوامل السابقة للحصاد على صفات جودة الثمار وقسوتها التخزينية

معاملات التسميد

تتأثر جودة ثمار الفراولة بعد الحصاد بمعاملات التسميد السابقة للحصاد، كما يلي

(ثنيتروجين)

يؤدى الإفراط فى التسميد الآزوتى إلى زيادة النمو الخضرى على حساب النمو الثمرى، حيث تكون الثمار المنتجة أقل عدداً وأصغر حجماً، وتزداد فيها الإصابة بالأعفان، ومعدل التنفس، وتقل صلابتها ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية، وطعمها ونكهتها مقارنة بثمار النباتات التى تأخذ كفايتها من التسميد الآزوتى دونما إغراط.

وتؤدى زيادة التسميد الآزوتى مع نقص البوتاسيوم والكالسيوم وضعف الإضاءة إلى زيادة نسبة الثمار الألبينو مع طراوتها.

(الكالسيوم)

كثيراً ما أعطى التسميد بالكالسيوم اهتماماً خاصاً بهدف زيادة صلابة الثمار، ولكن النتائج لم تكن دائماً إيجابية.

فعندما رشّت النباتات قبل الحصاد بمدة ٣-١٤ يوماً بكلوريد الكالسيوم بمعدل ٢٠ كجم للهكتار (٨٠٤ كجم/فدان)، فإن ذلك انعكس إيجابياً على الثمار أثناء التخزين حيث انخفضت معدلات طراوتها وإصابتها بالأعفان (عن Perkins-Veazie & Collins ١٩٩٥) وبالمقارنة .. أدى تسميد الفراولة بالكالسيوم رشاً أو عن طريق التربة - فى دراسة أخرى - إلى تقليل أعفان الثمار، ولكن لم تجعل المعاملة الثمار أكثر صلابة (Makus & Morris ١٩٩٨).

وربما تؤدى المعاملة بالكالسيوم قبل الحصاد إلى تقليل إصابة الثمار بالأعفان بعد الحصاد بسبب زيادة المعاملة لمحتوى الجدر الخلوية من الكالسيوم؛ مما قد يؤدى إلى اعتراض وصول الإنزيم الفطرى بولى جالاكتورونيز polygalacturonase إلى البكتينات كما أن زيادة الكالسيوم قد تحد من نفاذية الأغشية البروتوبلازمية وقد أدى بالفعل رش نباتات الفراولة بالكالسيوم إلى زيادة محتوى الثمار الكلى من العنصر، وكذلك محتواها من البكتين، مما يدل على احتمال زيادة المعاملة لعملية لصق الجدر الخلوية معاً (عن Perkins-Veazie & Collins ١٩٩٥).

وبالمقارنة .. لم يؤثر تسميد الفراولة بنترات الكالسيوم - فى دراسة أخرى - على محتوى التخت الزمى المتشحم من الكالسيوم، ولكنه أدى إلى زيادة محتوى الكالسيوم فى الثمار الحقيقية achenes (البذور)، وخاصة فى تلك التى تقع فى الجزء القاعدى - القريب من العنق - من التخت الزمى (Makus & Morris ١٩٩٨).

كما وجد أن رش نباتات الفراولة قبل الحصاد بكلوريد الكالسيوم بتركيز ٢٪ أو ٤٪

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية – التداول والتخزين والتصدير

أدى إلى زيادة تركيز الكالسيوم في الثمار، وزيادة نشاط إنزيم pectin methylesterase، ونقص نشاط إنزيم polygalacturonase (Scalon ١٩٩٩)

وأدى رش ثمار الفراولة قبل الحصاد ٤ مرات بكيالات الكالسيوم Ca chelate بتركيز ١٥٠ جزء في المليون وبمعدل ٢٠٠ لتر/١٠٠٠م^٢ – مع استعمال المادة الناشرة توين ٢٠ – إلى زيادة صلابة الثمار عند التخزين لمدة ٣ أسابيع على الصفر المئوي، وزيادة محتواها من حامض الأسكوربيك عن ثمار الكنترول، كذلك انخفض محتوى هذه الثمار من البكتينيات الذائبة في الماء، بينما ازداد محتواها من البكتينيات القابلة للذوبان في حامض الأيدوركلوريك، كذلك أدت المعاملة بالكالسيوم إلى تثبيط نشاط العفن الرمادي (Wasna وآخرون ١٩٩٩).

كما وجد أن رش حقول الفراولة ٣-٤ أيام قبل الحصاد بنحو ٢٠ كجم/هكتار (٨.٤ كجم/فدان) من كلوريد الكالسيوم يقلل من طراوة الثمار وإصابتها بالتحلل خلال ٧ أيام من التخزين على ٥°م وتزداد فيها نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية (Hancock ١٩٩٩)

مستوى الإضاءة

يؤدي ضعف الإضاءة إلى انخفاض محتوى الثمار من حامض الأسكوربيك والمواد الصلبة الذائبة الكلية، وعدم تلونها جيداً (Mitcham ١٩٩٦).

المعاملة بمحفزات المقاومة الطبيعية للأمراض

(المعاملة بالـ Acibenzolar)

أدت معاملة نباتات الفراولة بالـ Acibenzolar (منشط الـ SAR) بتركيز ٢٠-٢٥، مجم مادة فعالة / مل إلى تأخير ظهور العفن الرمادي بعد الحصاد لمدة يومين على ٥°م. وهي فترة تعادل ١٥-٢٠٪ من فترة صلاحية الفراولة للتخزين (Terry & Joyce ٢٠٠٠)

(المعاملة بالـ شيتوسان)

قام Reddy وآخرون (٢٠٠٠) برش نباتات الفراولة بمحلول الشيتوسان بتركيز ٢،

و ٤، و ٦ جم/لتر عندما بدأت الثمار فى التلون بالأحمر، ثم رشت مرة أخرى بعد ١٠ أيام، وتم حصاد الثمار بعد ٥، و ١٠ أيام من كل رشّة، ولقحت بالفطر *B. cinerea*. و خزنت فى حرارة ٣ أو ١٣ م. أحدثت معاملة الشيتوسان نقصاً جوهرياً فى الإصابة بعفن الثمار بعد الحصاد، وحافظت على جودتها مقارنة بالكنترول، كما ازداد تأثير المعاملة فى مكافحة العفن بزيادة تركيز الشيتوسان، بينما ازداد العفن بزيادة كل من فترة التخزين وحرارة التخزين. وكانت الثمار التى قطفت من النباتات التى عوملت بالشيتوسان أكثر صلابة وأبطأ نضجاً، كما انعكس ذلك على محتواها من كل من الأنثوسيانين والحموضة المعاييرة مقارنة بثمار الكنترول. ولم تكن لمعاملة الشيتوسان أية تأثيرات سامة على النباتات عند أى تركيز وقد أدى الرش بالشيتوسان بتركيز ٦ جم/لتر مرتان بفاصل ١٠ أيام بينهما إلى حماية الثمار من العفن والمحافظة على جودة الثمار عند مستوى مقبول خلال فترة التخزين التى دامت ٤ أسابيع على ٣ م. وكان التأثير الوقائى للشيتوسان أكثر فاعلية فى ثمار القطفة الأولى بعد المعاملة عما فى ثمار القطفة التالية. وبدأ واضحاً أن الشيتوسان يعوض التدهور الذى يحدث عند التخزين فى حرارة ١٣ م.

المعاملة بيروكسى حامض الخليك

أدى رش نباتات الفراولة قبل الحصاد بمحلول peroxyacetic acid بتركيز ١٠٠ جزء، فى المليون قبل الحصاد بثلاثة أيام إلى خفض إصابة الثمار بعد الحصاد بكل من الفطرين *Botrytis cinerea*، و *Rhizopus stolonifer*، وذلك عندما كان تخزينها على ١٨ م. وقد أدى تغليف الثمار بالشيتوسان بتركيز ١٪ بعد الحصاد - بالإضافة إلى معاملة الرش - قبل الحصاد - بمحلول بيروكسى حامض الخليك - إلى تقليل أعفان الثمار لمدة ١٢ يوماً بعد الحصاد مقارنة بمعاملة الرش منفردة (Narciso وآخرون ٢٠٠٧).

المكافحة الجيدة للبوترينس

وجد أن رش نباتات الفراولة مرة واحدة أسبوعياً أثناء فترتى الإزهار ونمو الثمار بأى

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

من المبيدات الفطرية iprodione، أو metameclan، أو captafol أدى إلى إحداث نقص جوهري في إصابة الثمار بالفطر *B. cinerea* - مسبب مرض العفن الرمادى - خلال فترة تخزين امتدت لمدة ١٠ أيام بعد الحصاد على ٢٠°م، ثم الحفظ لمدة يومين على حرارة ٢٠°م - في محاكاة لظروف الشحن البحرى - ثم العرض للبيع (Aharoni & Barkai-Golan ١٩٨٧).

فسولوجيا ما بعد الحصاد

نتناول بالشرح موضوع فسيولوجيا ما بعد الحصاد - قبل دراسة موضوع الحصاد ذاته وعمليات التداول التالية للحصاد حتى وصول المنتج إلى المستهلك - وذلك لكى نتمكن من فهم الأسباب التى تدعونا إلى إعطاء أهمية قصوى لكل ما سيأتى بيانه عن الحصاد وعمليات التداول، حتى يحتفظ المنتج بجودته العالية لأطول فترة ممكنة

التغيرات التى تطرأ على الثمار بعد الحصاد

إن من أهم التغيرات التى تلى الحصاد، والتى تؤثر فى جودة ثمار الفراولة، ما يلى

(التمال) (النضج) وتأثيره بالحرارة والضوء

يمكن لثمار الفراولة التى تحصد قبل تمام نضجها أن تكمل نضجها بعد الحصاد - وفى غياب الضوء - ولكن ذلك يعتمد على درجة الحرارة. ويمكن للضوء أن يزيد قليلاً من سرعة النضج ودرجة التلوين على ٢٤°م. هذا - إلا أن محتوى السكر بالثمار لا يطرأ عليه أى تحسن بعد الحصاد

فعندما قطفت ثمار الفراولة من صنف كنت Kent، وهى فى مراحل التلوين بالأحمر، وبالوردى، وبالأبيض وخزنت على حرارة ١٥°م فى الضوء، وقيم فيها التلون السطحى وتكوين المركبات المتطايرة على مدى ١٠ أيام . وصل إنتاج المركبات المتطايرة فى الثمار الحمراء والوردية إلى قمته بعد أربعة أيام من التخزين، وكان أقصى إنتاج لهذه المركبات فى الثمار الحمراء ٨ أمثال أقصى إنتاج لها فى الثمار الوردية و ٢٥ مثل أعلى إنتاج لها فى الثمار الخضراء هذا ولم يبدأ إنتاج المركبات المتطايرة

الفصل السابع - الفراولة

فى الثمار الخضراء إلا بعد مرور ٤ أيام من الحصاد، ثم استمر إنتاجها بعد ذلك. وقد توافقت التغييرات فى اللون السطحى للثمار بعد الحصاد مع التغييرات التى حدثت فى إنتاج المركبات المتطايرة.

ولدى مقارنة التخزين فى الضوء مع التخزين فى الظلام، وفى حرارة ١٠°م مقارنة بحرارة ٢٠°م وجد أن تكوين المركبات المتطايرة والصبغات الأنثوسيانينية - فى الثمار التى قطفت وهى ورديّة اللون - تأثر بكل من الضوء ودرجة الحرارة (Miszczak وآخرون ١٩٩٥).

تقران الرطوبة

يشكل الماء حوالى ٩٠٪-٩٥٪ من ثمار الفراولة، ويؤدى فقد الماء عن طريقى النتج والتنفس إلى حدوث فقد فى الوزن، وكرمشة، وقئامة فى اللون. فضلاً عن ارتفاع معدل تنفس ثمار الفراولة، فإن معدل النتج يزداد فيها - كذلك - بسبب ارتفاع نسبة سطحها إلى حجمها، ولأن طبقة الأديم cuticle التى تغطيها رقيقة للغاية.

كذلك يؤدى فقد الرطوبة إلى ذبول أوراق الكأس وجفافها.

وتجدر الإشارة إلى أن فقد الرطوبة يزداد فى ثمار الفراولة الصغيرة الحجم عما فى الثمار الكبيرة بسبب زيادة مساحة السطح الخارجى لكل وحدة وزن من الثمرة فى الثمار الصغيرة عما فى الكبيرة.

تقران الصلابة

تفقد ثمار الفراولة كثيراً من صلابتها بين طورى النضج الأبيض والأحمر، وتستمر فى فقدانها لصلابتها بعد الحصاد، حيث تنفصل الجدر الخلوية على امتداد الصفيحة الوسطى، مع تحرر بكتينات ذات وزن جزيئى كبير وهيميسيليلوز أما الثمار التى تقطف قبل اكتمال تكوينها فلا تحدث فيها تغييرات القوام الطبيعية (عن Mitchell وآخرين

(١٩٩٦)

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

ويزداد معدل تدهور ثمار الفراولة وتزداد سرعة فقدتها لصلابتها عند حصادها في مرحلة اللون الأحمر عما يكون عليه الحال عند حصادها في مرحلة القمة البيضاء، وعند تخزينها على ١٠°م عما في حالة تخزينها على ٣°م.

(التغيرات اللونية)

تزداد دكنة اللونين الخارجى والداخلى لثمار الفراولة أثناء التخزين وتصبح حمراء قرمزية اللون، كما يختفى بريقها بسرعة كبيرة، وخاصة عندما يكون التخزين على ٥°م – أو أعلى من ذلك – مع رطوبة نسبية منخفضة ويبدو أن التغير اللونى يكون مرده إلى تغير pH الثمرة من المجال الحامضى إلى المجال القلوى، مما يؤثر فى أبيض الأنثوسيانين، أما فقد الثمرة لبريقها فيكون مرده إلى فقد الرطوبة الذى يؤدي إلى كرمشة الأديم

هذا وتحتوى الثمار الحمراء عند الحصاد على الأنثوسيانينات بتركيزات تعادل خمسة أضعاف تلك التى تحتويها الثمار ذات القمة البيضاء ويقل هذا الفارق أثناء التخزين وبالمقارنة فإن الثمار التى تُحصد فى مرحلة القمة البيضاء يزيد محتواها من الفلافونات والفينولات الكلية والنشاط انضاد للأكسدة عما فى الثمار التى تحصد فى مرحلة اللون الأحمر (Shin وآخرون ٢٠٠٨)

كذلك تختلف نوعية الأنثوسيانينات التى تتكون فى الثمار التى تنضج حقلًا وهى على النبات عن تلك التى تتكون أثناء التخزين، حيث يتكون بالأخيرة نسبة أعلى من الـ cyanidin-3-glucoside، وهى التى تكون أقيم لونا (Hancock ١٩٩٩)

(التغيرات فى محتوى الثمار من حامض الأسكوربيك)

ينخفض محتوى حامض الأسكوربيك فى الثمار ذات القمة البيضاء عما فى الثمار الحمراء، ولكنه يزيد قليلاً فى الثمار الأولى بعد الحصاد، بينما يبقى ثابتاً فى الثمار الثانية على ١٠°م إلى أن يبدأ فى الانخفاض بعد ١٢ يوماً (Shin وآخرون ٢٠٠٨)

الإصابة بالضرر الميكانيكية

تتكون الأضرار injuries التي تظهر بثمار الفواولة إما من القطوع cuts، وإما من الخدوش bruises التي تحدث أثناء الحصاد أو النقل. تؤدي هذه الأضرار إلى تقاطر العصير الخلوي من الثمار، كما أنها تشكل منفذاً لإصابتها بالكائنات المسببة للأعقان.

وتحدث الخدوش بالثمار عند إسقاطها من ارتفاع يزيد عن ٨ سم على سطح صلب، وخاصة عندما تكون الثمار باردة. كما تحدث عند كثرة الضغط عليها بين الأصابع أثناء الحصاد، وعند زيادة تعبئة البنتس عما ينبغي، وخاصة في الثمار الدافئة، ولذا يفيد الحصاد أثناء انخفاض درجة الحرارة في تقليل هذه النوعية الأخيرة من الأضرار.

الإصابة بالأعقان

يعتبر العفن الرمادي grey mold الذى يسببه الفطر *Botrytis cinerea* أكثر الأعقان انتشاراً وأهمية وأكثرها إحداثاً للخسائر بعد الحصاد في حرارة التخزين المنخفضة، ناهيك عن أضراره الجسيمة في حرارة التخزين المرتفعة.

وفي حرارة ١٠°م أو أعلى من ذلك يمكن أن تنتشر - كذلك - الإصابة بعفن ريزوبس *Rhizopus* الطرى في خلال يوم واحد أو يومين.

قد تبدو إصابات البوتريتس السابقة للحصاد كبقع ثمرية صغيرة، سريعاً ما تكبر في الثمار الناضجة، لتنتشر في كل أجزاء الثمرة والثمار المجاورة لها من العبوة بعد الحصاد.

ويمكن أن يصيب فطر البوتريتس الأزهار ويبقى ساكناً بها إلى ما بعد عقد الثمار وحتى نضجها، حين يبدأ نشاطه المرضي، كما يمكن أن يصيب الفطر الثمار من خلال الجروح أثناء نضجها وتداولها. وينتشر الفطر الفطري السطحي من الثمار المصابة إلى الثمار المجاورة لها مكوناً ما يعرف بـ "العش" nest، الذى يزداد اتساعاً باستمرار ويمكن للفطر أن يستمر في النمو على درجة الصفر المئوي، ولكن ببطء شديد مقارنة بنموه في درجات الحرارة الأعلى من ذلك (عن Mitchell وآخرين ١٩٩٦).

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتفيد سرعة تبريد الثمار إلى الصفر المئوي - ثم المحافظة على سلسلة التبريد بعد ذلك - في الحد من انتشار الإصابة بمختلف الأعفان أثناء التخزين المؤقت، والشحن، والعرض في الأسواق

معدل تنفس الثمار

تتميز ثمار الفراولة بمعدل تنفس عالٍ للغاية وتقدر كمية الطاقة الحرارية التي تنتج عن تنفس طن واحد من ثمار الفراولة يوميًا بحوالي ٣٣٠٠ وحدة حرارية بريطانية في حرارة الصفر المئوي، ترتفع إلى ٤١٨٠٠ وحدة حرارية بريطانية في حرارة ٢٧°م

ويقبلين معدل تنفس الفراولة حسب درجة الحرارة، كما يلي:

المحارة (م)	معدل التنفس (مليلتر ثاني أكسيد كربون/كجم في الساعة)
صفر	١-١٠
١٠	٢٥-٥٠
٢٠	٥٠-١٠٠

هذا . ولا تحدث ظاهرة الكلايمكتيك في ثمار الفراولة أثناء نضجها، فقد وجد أن معدل تنفس الثمار المقطوفة والموضوعة أعناقها في الماء لمنع جفافها انخفضت أثناء نضجها على ٢٠°م من ٢٤٠ مليلتر من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو جرام من الثمار الخضراء في الساعة إلى ٢٠ في الثمار الوردية، وإلى ٢٥ في الثمار الحمراء وبالمقارنة كان معدل تنفس الثمار المقطوفة في درجات مختلفة من النضج هو ٤٥ مل/كجم في الساعة في الثمار الخضراء، مقارنة بنحو ٢٠ مل/كجم في الساعة في الثمار الوردية، و ٣٠ مل/كجم في الساعة في الثمار الحمراء القائمة (عن Perkins-Veazie ١٩٩٥).

إنتاج الثمار من الإثيلين

يعتبر إنتاج ثمار الفراولة من الإثيلين شديد الانخفاض حيث يتراوح بين ١٥ و ٨٠

الفصل السابع - الفراولة

نانوليتر لكل كيلو جرام من الثمار في الساعة فيما بين مرحلتى اللون الأخضر والأحمر القاتم، على التوالي (عن Perkins-Veazie ١٩٩٥)

كما لم تكن لمعاملة ثمار الفراولة بالإيثيلين تأثيراً يذكر على إنضاجها، وقد استعمل لهذا الغرض غاز الإيثيلين حتى تركيز ٢٠٠ ميكروليتر/لتر، وغاز البروبيلين حتى تركيز ٥٠٠٠ ميكروليتر/لتر، والإيثيفون رشاً حتى تركيز ١٠٠٠ جزء، فى المليون (عن Perkins-Veazie ١٩٩٥). وبذا .. فإنه لا يمكن حصاد الثمار قبل اكتمال تكوينها على أمل إنضاجها بالمعاملة بالإيثيلين بعد الحصاد هذا بالإضافة إلى أن زيادة تركيز الإيثيلين عن ١٠ أجزاء فى المليون تحفز الإصابة بالعفن الرمادى، كما قد تؤدي إلى التواء وانحناء أوراق كأس الثمرة (عن Mitchell وآخرين ١٩٩٦)

موسم الحصاد ودورات الإنتاج

على الرغم من أن إنتاج بعض المزارع الخاصة من بعض الأصناف الشديدة التبركير يمكن أن يبدأ فى أواخر شهر أكتوبر، إلا أن غالبية المزارع لا يبدأ إنتاجها من الفراولة قبل منتصف شهر نوفمبر. يكون الإنتاج شديد الانخفاض فى البداية، ولا يتعدى - غالباً - ٣٠٠ كجم للفدان حتى آخر شهر نوفمبر، ثم يزداد معدل الإنتاج سريعاً إلى أن يصل إلى قمة الدورة الأولى من الإنتاج، ويكون ذلك ما بين ١٥ ديسمبر وآخر يناير حسب الصنف ومدى تبركيره فى الإنتاج. يعقب ذلك فترة ينخفض فيها معدل الإنتاج تدريجياً إلى أن يصل إلى أقل معدل له لمدة تمتد حوالى أسبوعين خلال شهر فبراير. ومع بداية شهر مارس يزداد معدل الإنتاج بشدة مرة أخرى إلى أن يصل إلى أقصى معدل له - على امتداد الموسم كله - خلال النصف الثانى من شهر مارس، ويلي ذلك انخفاض الإنتاج مرة أخرى إلى أن يتوقف تماماً - أو يصبح الحصاد غير اقتصادى - فى منتصف شهر مايو.

وجدير بالذكر أن أسعار الفراولة فى أسواق التصدير الأوروبية لا تكون مرتفعة قبل منتصف شهر نوفمبر، إلا أن البداية المبكرة للحصاد فى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

يجعل المزرعة فى أوج إنتاجها حينما ترتفع أسعار التصدير خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر

وهى الصنف صوبى تشارلى - وهو من أكثر الأصناف المزروعة محلها
تبعيًّا - بفلاحة دوراته للإنتاج عند زراعته بالطريقة الضرر، كما يلى،

الدورة الأولى، وهى تمتد من حوالى منتصف نوفمبر إلى منتصف يناير، وتبلغ أوجها
فى منتصف شهر ديسمبر

الدورة الثانية، وهى تمتد من حوالى منتصف شهر يناير إلى منتصف فبراير، وتبلغ
أوجها فى آخر يناير، وهى أقل الدورات فى كمية المحصول.

الدورة الثالثة، وهى تمتد من حوالى منتصف فبراير إلى آخر مارس، وتبلغ أوجها فى
منتصف شهر مارس

ويمكن أن يستمر الإنتاج بعد ذلك منخفضًا من أول أبريل حتى منتصف مايو

ويكون توزيع إنتاج الصنف سويت تشارلى على مدى موسم الحصاد على النحو لتالى

الإنتاج (% من الحاصل الكلى)

الفترة

٨	النصف الثانى من نوفمبر
١٦	النصف الأول من ديسمبر
١٢	النصف الثانى من ديسمبر
١٠	النصف الأول من يناير
٨	النصف الثانى من يناير
٨	النصف الأول من فبراير
١٤	النصف الثانى من فبراير
١٦	النصف الأول من مارس
٥	النصف الثانى من مارس

الفصل السابع - الفراولة

الفترة	الإنتاج (% من المحصول الكلى)
النصف الأول من أبريل	١
النصف الثانى من أبريل	١
النصف الأول من مايو	١

ويبين جدول (٧-٢). توزيع الإنتاج فى صنفين آخرين من الفراولة ، وهما سلفا وهو محايد للفترة الضوئية ، وشاندلر وهو قصير النهار ومتأخر، وذلك عند زراعتهم بالطريقتين: الفريجو والفرش (عن Picha ١٩٩٧).

جدول (٧-٢): مقارنة الإنتاج لصنفى الفراولة سلفا وشاندلر فى طريقتى الزراعة الفريجو والفرش (النسبة المئوية للإنتاج).

الشهر	سلفا		شاندلر	
	فريجو	فرش	فريجو	فرش
نوفمبر	-	٥	-	-
ديسمبر	-	١٠	-	٥
يناير	-	٢٠	-	١٠
فبراير	١٥	٢٠	٥	٢٥
مارس	٢٥	٢٥	٢٥	٣٠
أبريل	٣٥	٢٠	٣٥	٢٠
مايو	٢٠	-	٢٥	١٠
يونية	٥	-	١٠	-

الحصاد

الحصاد لأجل التسويق المحلى للثمار الطازجة

يكون الحصاد كل ٢-٥ أيام حسب درجة الحرارة، ويراعى أن يجرى فى الصباح

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الباكر؛ ولكن بعد زوال الندى من على النباتات حتى لا تنتشر الأمراض من النباتات المصابة إلى السليمة أثناء مرور العمال في الحقل. تقطف الثمرة بجزء من العنق يبلغ طوله نصف سنتيمتر، ويجب ألا يحتفظ العامل بأكثر من ثمرتين في يده أثناء الحصاد

وتحصد الثمار - لأجل التسويق الطازج محلياً - وهي ملونة بنسبة ٧٥٪ (ثلاثة أرباع تلوين)، أو كاملة التلوين، ويتوقف ذلك على درجة الحرارة السائدة، ومدى قرب الأسواق فتزيد درجة النضج التي يجرى عندها الحصاد في الجو البارد، وعند قرب الأسواق من منطقة الإنتاج وبرغم أن الثمار التي تحصد - وهي في مرحلة ربع، أو نصف تلوين - يكتمل تلونها في حرارة ٢١°م، إلا أنها تكون أقل جودة. لذا فإنه لا ينصح بحصاد الثمار قبل وصولها إلى مرحلة ثلاثة أرباع التلوين

تنقل الثمار بعد الحصاد مباشرة إلى مكان مظلل، حيث تستبعد الثمار المصابة بالأمراض حتى لا تفسد باقى الثمار فى العبوات، كما تستبعد الثمار الخضراء، والزائدة النضج، والمشوهة بشدة، ويلى ذلك تعبئة الثمار فى عبوات من عيدان الحناء، أو فى عبوات خشبية للموق المحلي

الحصاد لأجل تصدير الثمار الطازجة

أمور عامة يجب مراعاتها

إن من أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند حصاد الفراولة لأجل التصدير، ما يلي:

١ - مراعاة جميع الأمور المتعلقة بالصحة العامة، والتي من أهمها ما يلي.

أ - ضرورة قيام جميع المشتغلين بعملية الحصاد بغسل أيديهم بصابون مضاد للبكتيريا antibacterial soap قبل القيام بعملية الحصاد مباشرة، وكذلك بعد استعمال المرحاض، وبعد تناول الطعام، وبعد أى مرة تتلوث فيها الأيدي بأى طريقة كانت

ب - ضرورة تقليل الأظافر مع تفريشها بالماء المضاد للبكتيريا

ج - ضرورة عدم ارتداء أى خواتم بالأصابع أثناء الحصاد لأن الميكروبات يمكن أن

تتراكم تحتها

- د - تجفف الأيدي - بعد غسلها - بورق تنشيف نظيف، مع التخلص من القوط الورقية في سلة مهملات بلاستيكية ذات غطاء.
- هـ - استعمال مناشف مضادة للبكتيريا لمسح الأيدي بها عندما يتطلب الأمر تنظيفها من أي أتربة أثناء عملية الحصاد.
- و - إذا ظهر أثناء الحصاد أن عنق إحدى الثمار كان أطول عما ينبغي فإنه يتعين تقصيره إلى الطول المناسب باستعمال الأصابع، وليس بقرضه بالأسنان.
- ز - يجب عدم النفخ في الثمار لإزالة الأتربة التي قد تكون عالقة بها، ويمكن أن يستعمل بدلاً من ذلك قطعة إسفنجية نظيفة تمرر على الثمرة برفق شديد حتى لا تجرح.
- ٢ - يجب أن يجري الحصاد لأجل التصدير يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في ساعات الصباح المبكرة قبل ارتفاع درجة الحرارة، حيث تكون حرارة الثمار مرتفعة، مما يجعلها عرضة للأضرار التي تنشأ عن عمليات التداول، وتتطلب وقتًا أطول في عملية التبريد الأولى لأجل التخلص من حرارة الحقل، مما يزيد من التكلفة، ويزيد من الفترة التي يرتفع فيها معدل تنفس الثمار إلى حين خفض حرارتها إلى الصفر المئوي.
- ٣ - هذا . إلا أن الحصاد يجب ألا يبدأ قبل جفاف معظم الندى في الصباح، ويعرف ذلك بمسح النباتات بالمرور عليها باليدين، فإذا تبين وجود كثير من البلبل يتعين الانتظار لمدة حوالى ساعة قبل بدء الحصاد. وترجع أهمية هذه الخطوة إلى أنها تقلل من فرصة التصاق الرمل والتربة بالثمار وهي مبتلة
- ٤ - تستخدم اليدين معًا في مسح النباتات بحثًا عن الثمار الصالحة للحصاد، وذلك أمر مهم لأن بعض الثمار التي يغطيها النمو الورقي لا يمكن رؤيتها إلا بهذه الطريقة
- ٥ - يتعين عند الحصاد فحص كل نبات على حدة، مع التركيز فقط على نباتات الخطين القريبين للقائم بعملية الحصاد التي تقع بين القوسين السلبيين المحددين للمساحة التي جاء عليها الدور في الحصاد
- ٦ - تجب عدم محاولة الوصول إلى الثمار التي توجد في الجانب الآخر من المصطبة

بعد منتصفها، فسوف يقوم بحصادها عامل آخر وتؤدي محاولة الوصول إليها إلى وضع القائم بالحصاد يده على البلاستيك ليستند عليه، وهذا يؤدي إلى تلوث الأيدي بالتراب، ومن ثم احتمال وصول الجراثيم إلى الثمار، كما أن الاستناد على البلاستيك بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى الأضرار بالنباتات والثمار والمصاطب ذاتها

٧ - كذلك يجب عدم الاستناد على المصاطب بالركبة، أو السير عليها لأن ذلك يؤدي حتمًا إلى الإضرار بالمصاطب، مما يسبب مشاكل عند الحصاد

٨ - يجب أن يضع القائم بعملية الحصاد قفازًا بلاستيكيًا في جيبه لاستعماله عند الحاجة في إزالة الثمار التي تكون في مراحل متقدمة من العفن. وبعد استخدام القفاز فإنه يخلع بحرص ويلف جانبه الداخلي على جانبه الخارجي التلوث ويوضع في جيب القائم بعملية الحصاد لحين استعماله مرة أخرى.

٩ - إذا حدث خطأ أحد العمال على ثمرة فإنه يتعين إزالتها في الحال لأنها إذا تركت فسوف تتعفن حتمًا، وتكون مصدرًا لانتشار العفن، ويراعى عند إزالة الثمار المتعفنة عدم ملاستها باليد.

١٠ - تجنب كذلك إزالة الثمار المشوهة إذا أمكن التعرف عليها وهي صغيرة، وذلك حتى لا تستنفذ طاقة النبات في تكوين ثمار غير مرغوب فيها. أما إذا لم يتم التعرف على هذه الثمار إلا في مرحلة متقدمة من نموها، فإنه يفضل تركها لحين نضجها ثم حصادها للسوق المحلية

١١ - يتم قطف الثمار بجزء من العنق يتراوح بين ٥، و ١٠ مم.

١٢ - تحصد ثمار التصدير إلى أوروبا وهي في مرحلة ٧٥٪ تلوين مع حوالى ٢٥٪ أكتاف خضراء، وتستثنى من ذلك السوق الفرنسية التي تتطلب الحصاد في مرحلة ٩٠٪ تلوين مع حوالى ١٠٪ أكتاف خضراء أما ثمار الأصناف الصلبة مثل كاماروزا وسلفا فإنها تحصد وهي مكتملة التلوين

١٣ - يراعى أن الثمار الزائدة النضج لا تتحمل عمليات التداول والشحن، وتكون هذه الثمار عند وصولها إلى أسواق التصدير طرية ولا تصلح للعرض بالأسواق.

١٤ - يجب توجيه جميع الثمار التي تفقد كؤوسها أثناء الحصاد، وتلك التي تكون زائدة النضج إلى خط محصول التصنيع

١٥ - يجب ألا تقل نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في ثمار الفراولة المعدة للتصدير عن ٧٪، وذلك هو الحد الأدنى، ولكن النسب المرتفعة عن ذلك هي المفضلة. وفي الولايات المتحدة تُشترط نسبة مواد صلبة ذائبة كلية مقدارها ٩٪ في ثمار الدرجة الأولى U. S. #1

١٦ - يجب ألا تتجاوز الفروق بين أقطار الثمار أكثر من ١٠ ملليمترات في البنات punnet الواحدة.

١٧ - يجب فحص الثمار بعد حصادها - وقبل وضعها في البنات punnets - للتأكد من خلوها من البتلات الجافة تحت الكأس، والرمل، والحشرات، والأضرار الحشرية.

المصاء مع التعبئة في المصاطب الحقلية

يراعى عند إجراء التعبئة في المصاطب الحقلية أن يكون حصاد محصول التصدير على النحو التالي:

١ - يفضل لأجل تسهيل عملية الحصاد استعمال عربة صغيرة ذات ثلاث عجلات لحمل الكراتين أو عبوات الحقل، ويتم سحب هذه العربات بين مصاطب الزراعة.

٢ - يتم قطف الثمار بالإمساك بعنق الثمرة (وليس بالثمرة ذاتها) بين السبابة والإبهام، بينما تكون الثمرة براحة اليد، ثم تلف الثمرة إلى أعلى حتى تنفصل بجزء من العنق يتراوح طوله بين ٠.٥، و ١.٠ سم، مع الكأس الأخضر. ويراعى ألا تتعرض الثمرة أثناء الحصاد لأي ضغط عليها، وإلا أدى ذلك إلى إحداث أضرار شديدة بها، وسرعة تغير لون الأنسجة المضارة.

٣ - توضع الثمار المقطوفة برفق في عبوات الحقل دون إسقاطها، ويجب أن يتم ذلك أولاً بأول؛ فلا يجوز أبداً الاحتفاظ بأكثر من ثمنتين في راحة اليد، وألا تزيد فترة الاحتفاظ بهما عن ثوانٍ معدودة لحين وضعها في عبوات الحقل

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

٤ - تتكون عبوات الحقل من طاولات (صوان) خشبية تبلغ أبعادها ٣٠ × ٤٠ سم وبعمق ٧ سم يوضع فى قاع كل صينية منها رقيقة إسفنجية بسبك سنتيمتر واحد، لتقلل إصابة الثمار بالكدمات ويعاب على هذه الرقائق الإسفنجية أنها تكون مصدرًا متجددًا لإصابة الثمار بمختلف الكائنات الدقيقة المسببة للأعفان، وتلك الضررة بصحة الإنسان؛ ولذا . يفضل استبدالها بشرائح بلاستيكية ذات فقاعات هوائية ليسهل تنظيفها، مع وضعها بحيث يكون جانب الشريحة الذى تبرز منه الفقاعات إلى أسفل

٥ - يجب عدم ملئ العبوات الحقلية عما ينبغى لأن ذلك يزيد كثيرًا من حالات الأضرار الميكانيكية، مثل الخدوش السطحية والتهتك السطحى للأنسجة

(التعبئة الحقلية)

تعرف عملية الحصاد مع التعبئة الحقلية باسم field packing، وهى تعد ضرورة حتمية إذا أريد للمنتج المصرى من الفراولة أن يكون منافسًا قويًا للمحصول المنتج من الدول الأخرى المنافسة فى أسواق التصدير العالمية، ذلك لأن التعبئة الحقلية تعنى تداول الثمار يدويًا مرة واحدة، وقلة تعرضها للإصابة بالكدمات، وسرعة تبريدها أوليًا، الأمر الذى يعنى زيادة قدرتها التخزينية مع احتفاظها بجودتها لفترة أطول عما فى حالة التعبئة فى المحطات الحقلية

تعتمد عمليتا الحصاد والتعبئة الحقلية على توفر عربة خاصة حقلية تُصنع محليًا، ويتم جرهما يدويًا بين مصاطب الزراعة.

تصنع عربة الحصاد الحقلية من أسياخ حديدية دائرية المقطع، وعجلات كبيرة نسبيًا تسمح بسهولة حركتها، علما بأن حركة العربة تكون أسهل بكثير عند سحبها وليس عند دفعها ويوجد بالعربة حلقة لوضع كيس القمامة، ومكان لوضع صندوق بلاستيكي توضع فيه البننتس punnets التى توضع فيها الثمار التى يتم قطفها من الربتتين السوبر (الإكسترا) والأولى، ومكان آخر بمقدمة العربة لوضع صندوق آخر توضع فيه ثمار الرتبة الثانية، ويد لسحب العربة، ويوضع فى قاع العربة صندوق آخر لتجميع

الثمار التي توجه للسوق المحلي، ويوضع بقاع هذا الصندوق شريحة من البلاستيك ذات فقعات هوائية، وذلك أدعى للنظافة من استعمال رقائق الإسفنج.

يخصص كيس القمامة لوضع الثمار المصابة بالأعفان، وكذلك الثمار غير المكتملة النمو التي تقطف مبكراً لأنها تكون مشوهة وغير منتظمة الشكل، ومختلف البقايا الأخرى.

تستعمل عادة البنّس العميقة التي تتسع لطبقتين من الثمار لتعبئة ثمار التوتتين الأولى والثانية، بينما تستعمل البنّس المسطحة التي تتسع لطبقة واحدة من الثمار لتعبئة ثمار رتبة السوبر، وجميعها تتسع لما مقداره ٢٥٠ جم من الثمار. هذا علماً بأن البنّس المسطحة تطلبها - عادة - محلات السوبر ماركت الأوروبية

يجب عند وضع شريحة البلاستيك ذات الفقعات الهوائية في قاع البنّس (وهي مطلوبة في الأسواق الأوروبية) أن يكون الجانب الذي تبرز منه الفقعات إلى أسفل في البنّس؛ فذلك يسمح بانسياب التيار الهوائي - عند التبريد - أسفل الثمار، ويقلل من احتمال الإضرار بها. وتلعب هذه الوسائد البلاستيكية دوراً هاماً في تقليل الأضرار الميكانيكية التي يمكن أن تحدث بالثمار أثناء الشحن.

يفضل رص صندوقين أو ثلاثة صناديق بلاستيكية فوق بعضها البعض على عربة الحصاد الحقلية لأجل زيادة كفاءة عملية الحصاد؛ حيث لا يحتاج القائمين بالحصاد إلى العودة كل فترة للتزود بهذه الصناديق. وبمجرد امتلاء الصناديق فإنها تنقل إلى مكان التجميع الحقلية بمعرفة شخص آخر يقوم - كذلك - بتزويد القائم بالحصاد بمزيد من الصناديق.

يجب أن يخصص لكل خط عامل واحد يقوم بحصاده.

يتم الاسترشاد بالأقواس السلكية التي تحمل الغطاء البلاستيكي في معرفة نهاية الجزء الذي تم حصاده من الخط، مع التركيز في عملية الحصاد على نباتات الخط التي توجد بين قوسين.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

يقف القائم بعملية الحصاد بين مصطبتين، ويركز جهده على الخطين القريبين منه فقط في كل مصطبة عن يمينه ويساره، فينتهى أولاً من حصاد جميع النباتات التي تقع في الخطين القريبين منه بين القوسين السلبيين اللذان انتهى عندهما الحصاد، ثم يستدير إلى الخلف ليقوم بحصاد النباتات التي تقع في المصطبة الأخرى في الخطين القريبين منه بين القوسين السلبيين اللذان انتهى عندهما الحصاد. ويلى ذلك سحب عربة الحصاد الحقلية لتكون في متناول اليد عند تكرار العملية بين قوسين سلبيين آخرين هذا ويترك خطا النباتات على الجانب الآخر من كل من المصطبتين ليقوم بحصادها عاملين آخرين.

يتم الحصاد بالإمساك بالثمرة بين السبابة والإبهام، مع جعل ظهر الإبهام موجهاً للقائم بالحصاد، وبالضغط على العنق يتم قطعه بحركة سريعة إلى أعلى بالسبابة وإلى أسفل بالإبهام وهذه الحركة تؤدي إلى قصف عنق الثمرة بسهولة وبالطول المرغوب فيه

وبعد الحصاد لا يتم تداول الثمرة إلا من ساقها

توضع الثمرة برفق في البنت الخاصة بالرتبة المناسبة لها، على أن تكون ساقها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى مع مراعاة ألا يخترق ساق الثمرة المجاورة لها.

يجب توخى الحذر التام عند الرغبة في تعديل وضع الثمار بالبنت لأجل تحسين وضعها أو لأجل إضافة المزيد من الثمار إليها بغرض الوصول بها إلى الوزن المطلوب، وإذا ما تطلبت الضرورة القصوى إجراء هذا التعديل فإنه يجب تداول الثمار برفق شديد، مع عدم دفعها في البنت وإلا حدثت بها خدوش وتهتكات تقلل كثيراً من قدرتها التخزينية، وتعرضها للإصابة بالأعفان.

إذا لوحظ وجود ثمار مقطوفة على المصاطب فإنه يجب إما إزالتها والتخلص منها بوضعها في كيس القمامة، وإما وضعها في الصندوق المخصص للتسويق المحلى إن كانت بحالة جيدة

تجب دائماً إزالة أى ثمرة يعثر عليها تكون مصابة بالعفن، ووضعها في كيس

القمامة. وإذا كان العفن ما يزال في مراحله الأولى فإنه يمكن التخلص من الثمرة دون أن تلامس يد القائم بالحصاد الجزء المتعفن من الثمرة، أما إذا كان العفن في مرحلة متقدمة بحيث يصعب التخلص من الثمرة دون ملامسة الجزء المتعفن منها، فإنه يتعين استعمال القفازات أو المناديل الورقية في الإمساك بالثمرة.

ومن أهم مزايا التعبئة الحقلية إجراء عمليات الفرز والتدريج والتعبئة في آن واحد، فتقل بذلك عمليات التداول، وتقل معها احتمالات تعرض الثمار للإصابة بالخدوش والكدمات. ويتم أثناء الفرز استبعاد الثمار المصابة ميكانيكياً أو مرضياً، والثمار المصابة بلفحة الشمس، وتلك التي تظهر بها آثار تغذية الحشرات، والمشوهة، والطرية، والزائدة النضج، والتي فقدت كاسها، والمتشققة، والمجروحة، والصغيرة الحجم، وغير الناضجة.

عند إجراء التعبئة الحقلية فإن متوسط إنتاج العامل أو العاملة يجب أن يكون في حدود ٢٤-٣٢ punnet - أو حوالي ٣ إلى ٤ كرتونات - من الفواولة يومياً، وذلك من كل فئات المحصول: السوبر، والدرجتين الأولى والثانية. وبالمقارنة .. فإن متوسط إنتاج العامل الواحد بطريقة التعبئة العادية في محطات التعبئة (مع أخذ كل عمليات الحصاد والتداول في الاعتبار) يتراوح بين ٤، و ٦ كرتونات يومياً.

الحصاد لأجل التصنيع

يجرى الحصاد لأجل التصنيع عندما تكون الثمار مكتملة التلوين، وهي مازالت صلبة، ويزال منها الكأس وعنق الثمرة في الحقل (Welch وآخرون ١٩٨٢).

وقد جرت محاولات عديدة لتطوير آلات لأجل حصاد ثمار الفواولة الخاصة بمحصول التصنيع آلياً، وذلك في كل من ولايتي أركنسا Arkansas وميتشجان Michigan الأمريكيتين، وفي إيطاليا، والدانمرك، وبريطانيا، وكندا وقد صممت أول آلة حصاد لهذا الغرض في جامعة أركنسا في عام ١٩٦٧، ثم طورت كثيراً بعد ذلك. وتعتمد فكرة الحصاد في جميع الآلات التي صممت على نزع الثمار من النباتات بواسطة

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

أصابع تمر خلال النموات الخضرية، ثم فصل الثمار عن البقايا النباتية الأخرى أثناء مرورها على أجزاء الآلة.

ويعتمد عمل هذه الآلات على زراعة الفراولة فى خط واحد أو خطين بالمصطبة، ثم قيام الآلة بحصاد جميع الثمار مرة واحدة ولهذا السبب يفضل إجراء الحصاد اليدوى مرة أو مرتان قبل مرور الآلة وتشكل الثمار الخضراء - التى تحصد تلقائياً مع الثمار الناضجة - أكبر المشاكل لأنها تقلل من جودة المنتج المصنع، بينما لا يمكن التخلص منها بعد الحصاد. ولكن يعتقد بأن الأصناف ذات الثمار الغنية بالأنثوسيانين يمكنها أن تتحمل وجود نسبة تصل إلى ٥٠٪ من الثمار غير المكتملة التكوين فى المربى لى تُصنع منها

وحتى عام ١٩٩٩ لم يكن موجودا سوى آلة واحدة تعمل تجارياً فى الحصاد الآلى لمحصول التصنيع، وذلك فى ولاية أوريجون الأمريكية (Morris ١٩٩٩).

ويذكر Smith (١٩٨٦) أنه أمكن حصاد الفراولة آلياً لأجل التصنيع، مع تخزينها فى حرارة ١°م لمدة ٤-٦ أيام فى المخازن المبردة العادية، أو لمدة ٦-٨ أيام عند إجراء تبريد أولى للثمار بطريقة الدفع الجبرى للهواء البارد بعد الحصاد مباشرة، عفاً بأنه لم يحدث نتيجة لذلك أى فقد فى نوعية الثمار المعدة للتصنيع. ويعد تخزين الثمار التى تحصد آلياً أمراً ضرورياً، وذلك لأن الحصاد الآلى يساعد على زيادة كمية المحصول التى يمكن أن تورد لمصانع الحفظ لأجل تصنيعها.

أما بالنسبة لمحصول الاستهلاك الطازج .. فلا أحد يفكر - بطبيعة الحال - فى حصاده آلياً - على الأقل فى الوقت الحاضر - نظراً لأن هذه العملية تدمر النباتات، وتؤدى بصفات الجودة، وتقضى على قدرة الثمار على التخزين.

عمليات التداول السابقة للتبريد الأولى

تختلف عمليات التداول السابقة للتبريد الأولى فى حلة التعبئة فى المحطات الحقلية عما فى حالة التعبئة الحقلية عند الحصاد.

تعتبر ثمار الفراولة أكثر الخضر تعرضاً للتلف والتدهور السريع إن لم يتم التخلص من حرارة الحقل بأقصى سرعة ممكنة بعد الحصاد مباشرة. ويقدر الضرر (التدهور في النوعية) الذي يحدث للثمار في ساعة واحدة - وهي على ٣٠°م - بما يعادل الضرر الذي يحدث لها خلال أسبوع كامل من التخزين على درجة الصفر المئوي.

لحا .. فإنه يهتم اتخاذ الإجراءات التالية،

١ - وضع الثمار التي يتم حصادها في الظل أولاً بأول، مع حمايتها من الرياح الساخنة والأمطار، علماً بأن الثمار التي تتعرض للشمس ترتفع حرارتها كثيراً عن حرارة الهواء المحيط بها.

٢ - نقل الثمار التي يتم حصادها أولاً بأول إلى محطة التعبئة الحقلية.

٣ - يجب أن تكون محطة التعبئة في مكان قريب من الحقل بحيث يمكن أن تنقل إليها الثمار بسرعة وسهولة، وأن تتحرك الثمار بعد ذلك بسهولة إلى التبريد الأولي، ثم إلى التخزين المؤقت لحين شحنها

ومبهما تكون التعبئة في المحطة الحقلية، فإنه تجرى العمليات التالية،

١ - يتم فرز الثمار من الصواني الخشبية (عبوات الحقل)؛ فتستبعد الثمار المشوهة، والمصابة بالأمراض، وغير الكاملة التلقيح، والمجروحة، والمأكولة أجزاء منها بفعل الديدان أو الطيور.

٢ - توضع ثمار الدرجات السوبر، والأولى، والثانية في البنتس punnets الخاصة بها برفق بعد مسحها بعناية فائقة إما بفرشاة جافة أو بريشة نظيفة، وبعد تهذيب العنق ليصبح بالطول المناسب وهو ١,٥-١,٠ سم.

٣ - تمسك الثمار دائماً من العنق، وتوضع في البنتس بحيث تكون قمته إلى أعلى، ومع مراعاة عدم زيادة التعبئة في البنتس عما ينبغي لكي لا تحدث كدمات بالثمار من جراء انضغاطها.

أما محطما تكون التعبئة قد أجريته في العطل أثناء الحصاد، فإنه تجري الصلهاة التالية،

١ - تنقل البنفس والكراتين سريعاً إلى محطة الفحص الحقلية لإعادة فحصها ووضع الغطاء عليها ويتعين وضع نظام لنقل المحصول الذى يتم حصاده أولاً بأول، وعلى فترات منتظمة، من الحقل إلى محطة الفحص الحقلية.

٢ - تكون أولى الخطوات بعد وصول المحصول إلى محطة التعبئة هي صف الكراتين فى مكان يكون جيد الإضاءة، وتتراوح حرارته بين ٧، و ١٠ م ومن الطبيعى أن يقوم العاملون فى هذا المكان بارتداء ملابس ثقيلة لكي يتمكنوا من الاستمرار فى العمل تحت هذه الظروف

٣ - يلى ذلك تحريك الكراتين يدوياً أو بالاستعانة بسير متحرك إلى مكان التدريب والوزن، حيث يتم فحص كل بنت على حدة والتأكد من مطابقة الثمار بها لصفات الجودة الخاصة بكل رتبة، وقد يتطلب الأمر استبدال ثمرة أو أكثر فى العبوة بثمار أخرى.

وصواء أجريته التعبئة حقلها، أم في المحطة الحقلية، فإن الخطوات التالية تكون كما يلي،

١ - يتم وزن البنفس على ميزان رقمى إلكترونى ذات حساسية جرام واحد أو جرامين، ويجب أن يتراوح الوزن الصافى للثمار بالبنفس بين ٢٦٠، و ٢٦٥ جم لكى لا يقل وزنها عند الوصول للمستهلك عن ٢٥٠ جم وفى الوقت ذاته لا تجب زيادة الوزن الصافى للثمار عن ٢٦٥ جم لأن ذلك يعنى تصدير نسبة من المحصول قد تصل إلى ١٠٪ بلا مقابل، كما أن زيادة تعبئة البنفس عما ينبغى قد يؤدى إلى انضغاط الثمار وتجريحها

٢ - يلى ذلك وضع الغطاء على البنفس، ووضعها فى مكانها بالكرتونة.

٣ - تكون أبعاد الكراتين - عادة - ٤٠ × ٦٠ سم، وتتسع كل منها لثمانى بنفس سعة كل منها ٢٥٠ جم، أى يكون الوزن الصافى للثمار بالكرتونة ٢ كجم

٤ - يعقب ذلك تحزيم (شميرة) كل أربع كراتين معاً لأجل تبريدها أولئها، ولتسهيل تداولها ووضعها فى بالتات بعد ذلك

عبوات الفراولة

عبوات المستهلك: "البنتس" Punnets

تعرف عبوات المستهلك التي تعبأ فيها ثمار الفراولة باسم "بنتس" punnets (ومفردا بنت punnet)، وهي عبوات بلاستيكية شفافة ذات غطاء، تتسع إما لربع كيلو جرام (في طبقة واحدة، أو أكثر من طبقة)، وإما لنصف كيلو جرام من الثمار. وتتطلب بعض محلات السوبر ماركت (مثل ماركس آندسبنس) بنتس تتسع لما مقداره ٢٢٧ جم (١/٢ رطل) من الثمار.

ويفضل عدم استعمال البنتس التي تتسع لربع كيلو جرام من الثمار إلا عند استخدامها في تعبئة الثمار المتوسطة الحجم مع إرسالها إلى محلات السوبر ماركت مباشرة. أما عند تعبئة ثمار كبيرة الحجم، أو عند تعبئة ثمار من أي حجم لأجل أسواق البيع بالجملة wholesale markets فإنه يفضل استعمال البنتس التي تتسع لنصف كيلو جرام من الثمار. ويعيب البنتس الصغيرة صعوبة استعمالها في تعبئة الوزن المطلوب من الثمار الكبيرة، بينما لا يكون من المناسب تعبئة خليط من الثمار الكبيرة والصغيرة معاً في العبوة الواحدة.

ومن أهم خصائص البنتس punnets، ما يلي،

تتميز البنتس بوجود فتحات دائرية أو طويلة من جميع الجوانب في الجزءين العلوي والسفلي من كل جانب، وكذلك من القاع والغطاء حتى يمكن تبريد الثمار بكفاءة. وبغير هذه الفتحات فإن الهواء البارد الذي يستخدم في عملية التبريد الأولى يقوم بتبريد البنتس ذاتها وليس الثمار. ومع انطلاق بخار الماء من الثمار الدافئة فإنه سريعاً ما يتكثف على الجدر الداخلية للبنتس التي تكون باردة، ليتجمع في قطرات صغيرة من الماء، تشكل بدورها أفضل الظروف لنمو الفطريات المسببة للأعفان، ويحدث ذلك لأن الثمار تكون دافئة نسبياً بسبب عدم انسياب الهواء البارد بكفاءة إلى داخل العبوات.

تسمح الفتحات التي توجد على جوانب البنتس بمرور الهواء البارد بداخلها وحول الثمار أثناء إجراء عملية التبريد الأولى بطريقة الدفع الجبرى للهواء. أما فتحات القاع

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

والغطاء فإنها تسمح باستمرار انسياب الهواء البارد داخل البنتس أثناء الشحن البرى (وأثناء النقل البرى بعد الشحن الجوى) فى الحاويات التى يستخدم فيها نظام دفع الهواء البارد من القاع bottom air delivery refer-containers. ولهذا السبب يتعين عدم وضع وسادة بلاستيكية فى قاع البنتس. على أن يوضع - كبديل لها - شريحة بلاستيكية ذات فقائيع هوائية، وعلى أن يكون قاع البنتس مضلعاً ليسمح بتجمع الماء المتكثف بعيداً عن الثمار (Zagory ١٩٩٨)

يجب أن يكون السطح الداخلى للبنتس خالياً من البروزات والحواف الحادة، كما يجب ألا تكون البنتس عميقة أكثر من اللازم لتخفيف ضغط الثمار العليا على الثمار السفلى فى البنت أثناء الشحن

ويجب أن تكون البنت على قدر كاف من المتانة بحيث تتحمل عمليات الشحن والتداول والعرض بالأسواق ولا تنهار على الثمار بداخلها.

ويتطلب المستوردون الأوروبيون وضع وسادة بلاستيكية ذات فقاعات هوائية فى قاع البنتس، لأجل حماية الثمار من الكدمات، ولكنها تمد كذلك فتحات التهوية التى توجد فى قاع البنتس.

ويعد البوليثلين تيرى فتاليت polyethylene terephthalate (اختصاراً PETE) أفضل لتصنيع البنتس عن الـ oriented polyesterene (اختصاراً OPS).

ومن أهم مميزات البنتس punnets الجيدة ما يلى،

- ١ - أن تحتوى على فتحات كبيرة فى الغطاء تسمح برؤية الثمار جيداً بداخلها
- ٢ - أن تكون شفافة
- ٣ - أن يسمح تصميمها برصها فوق بعضها البعض عند عرضها فى محلات السوبر ماركت
- ٤ - أن تكون متينة ولا تنهار من أى ضغط خفيف عليها أو عند رصها
- ٥ - أن يكون غطاؤها محكم الإغلاق فلا ينفث بسهولة أثناء الشحن

الفصل السابع - الفواولة

- ٦ - أن تكون تضليعاتها (التي يكون الهدف منها تقوية البنتس وعمل مجار للرطوبة الحرة التي يمكن أن تتكثف بالقاع) غير حادة حتى لا تؤدي إلى تجريح الثمار.
- ٧ - أن تكون فتحاتها مناسبة تمامًا لعملية التبريد الأولى بطريقة الدفع الجبرى للهواء.

٨ - أن تسمح أبعادها بوضعها فى طبقة واحدة أو طبقتين بالكراطين مع إحكام رصها وعدم ترك فراغات بالكرتونة التي يراعى فيها أن تكون مناسبة تمامًا للباقيات دون زيادة أو نقصان.

- ٩ - أن يكون تصنيعها من مادة يمكن إعادة تدويرها recyclable material لأجل حماية البيئة، علمًا بأنها تصنع - عادة - من ال PET، وال PP، وال PS.

ومن بين الشركات التي تقوم بتصنيع البنتس، ما يلي،

الدولة	الشركة
الولايات المتحدة وكندا	Tenneco Packaging
الولايات المتحدة	Sambrailo Packaging
الولايات المتحدة	Monte Packaging
الولايات المتحدة	Ultra Pac
الولايات المتحدة	Estman Link
المملكة المتحدة	Dolphin Packaging
إيطاليا	Infil Company
إسبانيا	Autobar

الكراطين

تستخدم - عادة - فى تعبئة محصول الفواولة كراطين تبلغ أبعادها ٤٠ × ٦٠ سم، تتسع لثمانى بنتس punnets عميقة يعبأ بكل منها ٢٥٠ جرم من الثمار، أى تعبأ الكرتونة بما مقداره ٢ كجم من الثمار.

وتصمم كراتين الفراولة التي تستخدم فى تصدير المحصول بحيث تناسب عملية التبريد الأولى، ويتطلب ذلك ضرورة أن تسمح الفتحات التى توجد بها - والتي تشكل ما لا يقل عن ٥٪ من مساحة الجوانب - بمرور الهواء فى اتجاه مساره الجبرى، ويتم ذلك بعمل فتحات فى الجوانب الطولية للكراتين تكون مواجهة للفتحات التى توجد بجوانب البنّس كما يجب توفر ثقب بامتداد القاع فى الجوانب الطولية للكراتين لكى تسمح بمرور الهواء البارد من خلال الفتحات التى توجد بقاع البنّس

ويجب أن تكون الكراتين قوية بدرجة تمنع انهيارها تحت ظروف الضغط العالى عليها (كما يكون عليه الحال بالنسبة للكراتين التى تقع بالطبقات السفلى من البالطة) مع الرطوبة العالية جداً (٩٠٪-٩٥٪) التى يجب أن تتوفر أثناء التخزين والشحن ويفضل ألا تقل قدرتها على تحمل الضغوط عن ٢٥٠ رطل على البوصة المربعة، أى حوالى ١٧ ٦ كجم على السنتيمتر المربع، أو حوالى ١٧٢٤ كيلو باسكال kPa

ولذا يتعين أن تصنع الكراتين من ورق بكر virgin لم يسبق استعماله من قبل ثم أعيد تدويره، وأن يكون ورق الكرتون مموج corrugated، وذات طبقة رابطة داخلية internal bond قوية وقليلة التشرب بالماء. كما يجب أن يكون الغراء المستعمل فى لصق طبقات الكرتون مقاوم للرطوبة لمنع انفصالها عن بعضها البعض.

ونظراً لأن جوانب الكرتونة تكثر بها الفتحات، لذا .. فإنها لا تُسهم كثيراً فى دعم متانتها؛ ومن ثم يتعين دعم الأركان، خاصة وأنها تتحمل معظم الأثقال، حتى لا تنهار الكراتين السفلى تحت ضغط الكراتين التى توجد أعلاها فى الرصة.

ويجب تصنيع الجانبين القصيرين من الكراتين من طبقة مزدوجة من الكرتون لتكسب الكرتونة متانة إضافية تمنع انهيارها، ويعد ذلك ضرورياً، لأن بعض الكراتين لابد وأن توجد فى قاع رصة بارتفاع ١٠-١٢ كرتونة ويؤدى عدم قدرة الكراتين السفلى على تحمل الضغط الواقع عليها إلى انهيارها، ومن ثم ميل باقى الرصة أو سقوطها، الأمر الذى يسبب أضراراً كبيرة للثمار التى توجد بداخلها

كما يجب أن تكون الكراتين عميقة بالقدر الذى يكفى لوجود مسافة ١٠-١٥ سم من الفراغ أعلى البنتس حتى لا ترتكز الكراتين العليا على البنتس التى توجد أسفل منها؛ فالكرتونة هى التى يجب أن تحمل تلك الأثقال، خاصة وأنه كثيراً ما تنبعج الكراتين الضعيفة أثناء الشحن والتداول، مما يؤدى إلى الضغط على البنتس فى الكراتين التى توجد أسفل منها.

ويتعين أن تكون الكراتين التى تستعمل فى تصدير الفراولة ذات بروزات من أعلى فى أجزاء من جدرانها يقابلها فتحات من أسفل، بما يسمح بتهوية الكراتين فوق بعضها البعض عند رصها فى البالتات

تجهيز البالتات Palletization

توضع كراتين الفراولة فى البالتات pallets على قاعدة خشبية تعرف باسم pallets، وذلك لتسهيل تحريك أعداد كبيرة من الكراتين - فى صورة البالتات - باستعمال الرافعات الشوكية forklifts. هذا .. إلا أنه قد يكتفى بتحزيم كل أربع كراتين فقط معاً.

ويعد ثبات البالتات أمراً عاماً وحيوياً فى شحنات الفراولة؛ ولذا يتعين تثبيتها بطريقة مناسبة، مثل: التحزيم strapping، واللف فى غشاء مطاطى stretch film، واستعمال جريد الأركان corner strips

ومن الضرورى عدم زيادة حجم البالطة عما ينبغى، كما لا يجب أبداً بروز الكراتين عن حواف البالطة، علماً بأن أبعاد البالطة الأوروبية القياسية هى ١٠٠ × ١٢٠ سم. وتوضع على قمة البالطة شريحة من الخشب أو الكرتون المقوى - بها فتحات للتهوية - بهدف إحكام تحزيم الكراتين فى البالطة.

معاملات بعد الحصاد لتحسين الجودة والقدرة التخزينية والمقاومة للأمراض

التعرض للضوء

أدى تعرض ثمار الفراولة من صنفى أوفرا Ofra، وأوريت Oriet اللذان يعانىان من

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

سوء التلوين أدى تعريضهما لضوء فلورسنتى أبيض بقوة ١٧.٥ ، أو ١٤.٥ واط/م^٢ - على التوالى - لمدة ساعتين يومياً على حرارة ٢٠°م إلى التغلب على مشكلة ضعف التلوين فى أوفرا، ومشكلة الأكتاف الخضراء فى أوريت، مع إحداث تحسين فى لون الثمار داخلياً وخارجياً هذا ولم تؤثر معاملة التعريض للضوء على جودة الثمار وصلابتها خلال التخزين الذى أجري على ٢٠°م واستمر لمدة ٤٨ ساعة أو ١٢٠ ساعة (لمحاكاة الشحن الجوى والشحن البحرى، على التوالى)، ثم على حرارة ١٨°م لمدة ٧٢ ساعة (لمحاكاة فترة العرض بالأسواق). وقد أدت معاملة التعريض للضوء إلى خفض الإصابة بالأعفان فى كلا الصنفين (Sacks وآخرون ١٩٩٦).

التعريض للأشعة فوق البنفسجية

وجد Baka وآخرون (١٩٩٩) أن تعريض ثمار الفراولة للأشعة فوق البنفسجية UV-C بجرعة مقدارها ٠.٢٥ كيلوجول/ك/م^٢، ثم تخزينها على حرارة ٤°م أدى إلى إبطاء نضج الثمار وشيخوختها

كما وجد Nigro وآخرون (٢٠٠١) أن معاملة ثمار الفراولة بجرعات منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية تراوحت بين ٠.٥، و ١.٠ كيلوجول/م^٢ قللت أعفان الثمار المخزنة على ٢٠°م ± ١°م جوهرياً. وقد أحدثت المعاملة زيادة فى نشاط الإنزيم phenylalanine ammonia-lyase بعد ١٢ ساعة من التعريض للأشعة، وهو ما يعنى تحفيز المعاملة لنشاط أيزى يقود إلى تمثيل مركبات فينولية، وهى التى تتميز غالباً بنشاطها المضاد للفطريات. كذلك تزايد إنتاج الإثيلين فى الثمار بزيادة جرعة التعرض للأشعة فوق البنفسجية (حتى ٤.٠ كيلوجول/م^٢)، وبلغ إنتاج الإثيلين ذروته بعد ٦ ساعات من المعاملة

كذلك أدى تعريض ثمار الفراولة للأشعة فوق البنفسجية UV-C لمدة دقيقة واحدة، أو خمس، أو عشر دقائق (٠.٤٣، و ٢.١٥، و ٣.٠ كيلوجول/ك/م^٢، على التوالى) إلى تحفيز النشاط المضاد للأوكسدة والنشاط الإنزيمى، وإلى خفض تحلل الثمار جوهرياً خلال

الفصل السابع - الفواولة

التخزين على ١٠°م مقارنة بالكنترول، وكانت معاملتا التعريض للأشعة لمدة خمس أو عشر دقائق هما الأفضل في حفظ النشاط المضاد للأكسدة. وقد حفزت تلك المعاملات - كذلك - نشاط كل من الإنزيمات التالية :

glutathione peroxidase
glutathione reductase
superoxide dismutase
ascorbate peroxidase
guaiacol peroxidase
monodehydroascorbate reductase
dehydroascorbate reductase

كذلك أدت جميع معاملات الأشعة فوق البنفسجية إلى زيادة المحتوى الفينولي للثمار، كما ازداد محتواها من الأنثوسيانين أثناء التخزين (Erkan وآخرون ٢٠٠٨).

تغطية الثمار بأغشية صالحة للأكل

لا يتم تغليف ثمار الفواولة - بصورة فردية - في الوقت الحالي بسبب ما يتطلبه ذلك من زيادة في عمليات التداول، مع ما يستتبعها من أضرار ميكانيكية، ولكن ربما نرى في المستقبل نظاماً لحفظ الثمار من التلف بعد الحصاد يتضمن التبريد السريع بالماء البارد، ثم تغليف الثمار بأغلفة صالحة للأكل edible مزودة بالميكروبات المضادة للفطريات المسببة للأعفان (عن Perkins-Veazie & Collins ١٩٩٥).

التغطية بالشيتوسان وحب (القاومة الطبيعية للأضرار)

إن الشيتوسان chitosan مادة عديدة التسكر كاتيونية شبه منفذة semi-permeable ذات وزن جزيئي كبير، فهي β -(1,4)glucosamine polymer. وعلى خلاف الشيتين chitin، فإن الشيتوسان قابل للذوبان في الأحماض العضوية المخففة. وعلى الرغم من أن الشيتوسان يعرف منذ أكثر من ١٠٠ عام، فإن إنتاجه التجاري لم يبدأ إلا في

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

سبعينيات القرن العشرين. ونظرياً .. فإن الشيتوسان يعد مركباً مثاليًا لحفظ الثمار بالتغليف وقد ثبتت فاعليته في تثبيط نمو عديد من الفطريات، وإنتاجه للإنزيم شيتينيز chitinase، وهو إنزيم دفاعي ضد الفطريات ونظرًا لأن الشيتوسان يكون غشاء شبه نفاذ، لذا فإنه يمكن أن يؤثر على تركيب الهواء الداخلي بالثمار، ويتوقع تقليله لفقد الرطوبة بالتبخّر (عن Zhang & Quantick 1998).

ويعتبر الشيتوسان مكونًا هامًا من مكونات الجدر الخلوية لبعض الفطريات المعرضة للنباتات كما أنه ينتج كذلك من الشيتين الموجود بالقشريات بعملية deacetylation

وقد أدى تغليف ثمار الفراولة بالشيتوسان ١٪ أو ٢٪ (وزن/حجم) إلى مكافحة الأعفان والمحافظة على صفات الجودة عند تخزين الثمار على ١٣°م كما أحدث الغلاف زيادة معنوية في نشاط كل من الـ chitinase، والـ β -1,3-glucanase مقارنة بثمار الكنتروول. وكانت فاعلية الشيتوسان في مكافحة الأعفان التي يسببها الفطرين *B cinerea*، و *Rhizopus sp.* على حرارة ١٣°م مماثلة لكفاءة المبيد الفطري ثيوبندازول TBZ وكان للتغليف بالشيتوسان تأثيرات إيجابية على كل من صلابة الثمار، والحموضة المعاييرة، ومحتوى الثمار من حامض الأسكوربيك والأنثوسيانين على ٤°م (Zhang & Quantick 1998)

كذلك أدى الشيتوسان إلى زيادة نشاط إنزيم glucanohydrolase الذي كان مثبطًا للفطر *B. cinerea* (عن Reddy وآخرين ٢٠٠٠).

وفي دراسة أخرى استخدمت ثلاثة أنواع من الأغلفة - المأكولة - لثمار الفراولة تعتمد على الشيتوسان chitosan، هي: الشيتوسان منفردًا، والشيتوسان الذي يحتوى على ٥٪ Gluconal (منتج تجارى)، والشيتوسان المحتوى على ٢،٠٪ DL- α -tocopheryl acetate، مع تخزين الثمار على ٢°م في ٨٨٪ رطوبة نسبية لمدة ثلاثة أسابيع أدت الأغلفة إلى خفض إصابات الأعفان والفقد في الوزن جوهريًا، وآخرت التغيرات في اللون والـ pH والحموضة المعاييرة. كذلك أحدثت أغلفة الشيتوسان

التحلل للسابع - الفراولة

المحتوية على الكالسيوم أو فيتامين هـ (E) زيادة جوهريّة في محتوى هذين العنصرين الغذائيين في الثمار (Han وآخرون ٢٠٠٤).

كذلك أدى غمر ثمار الفراولة في محاليل من الشيتوسان (شيتوسان ذو وزن جزيئي مرتفع بتركيز ٠,٢٥٪ أو ٠,٥٪، أو ذو وزن جزيئي منخفض مستخلص من سرطان البحر بتركيز ٠,٥٪ أو ١٪، أو الجمبري بتركيز ٠,٥٪ أو ١٪) أو كلوريد الكالسيوم بتركيز ٢٪ أو ٤٪ ثم تجفيفها على حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق، ثم تخزينها في صوان مغلفة بال PVC على ٢°م لمدة ١٦ يوماً .. أدت تلك المعاملات مقارنةً بالقمر في الماء المقطر إلى احتفاظ الثمار بصلابتها وبمحتواها من المواد الصلبة الذائبة والحموضة المعيرة وانخفاض تحلل الثمار خلال فترة التخزين (Chaiprasart وآخرون ٢٠٠٦).

أغشية أخرى مأكولة

يؤدي تغليف ثمار الفراولة بأغشية مأكولة edible بالتفريش bruising إلى تقليل فقدها للرطوبة.

وقد تكون أحد الأغشية الموصى بها من ١١ مل (سم ٣) من PEG-400، و ٤٠ جم أحماض دهنية/١٠٠ جم من MC-2000، وكانت الأحماض الدهنية هي الاستياريك stearic، والبالتيك Palmitic، والدودي كائوك dodecanoic (Ayranci & Tunc ١٩٩٧).

كذلك أدى استعمال أغشية من النشا الغني بالأميلوز إلى خفض الفقد الرطوبي واحتفاظ الثمار بصلابتها لفترة أطول عما لو استعملت أغلفة من النشا المتوسط في محتواه من الأميلوز. كذلك أدت أغلفة السوربيتول sorbitol، والجليسرول glycerol إلى خفض الفقد الرطوبي مع المحافظة على اللون. أما التغليف بسوربات البوتاسيوم potassium sorbate فقد قلل العد الميكروبي وأدى إلى زيادة فترة تخزين الثمار - على حرارة ١°م ورطوبة نسبية ٨٤,٨٪ - إلى ٢٨ يوماً مقارنةً بأسبوعين فقط في ثمار الكنترول (Garcia وآخرون ١٩٩٨).

المكافحة الحيوية لأعفان الثمار

أدت معاملة ثمار الفراولة بالبيريولنترين pyrrolnitrin – وهو مركب مستخلص من الفطر *Penicillium cepacia* – إلى منع إصابة الثمار بالعفن الرمادى لمدة خمسة أيام على الأقل.

كذلك ثبتت عزلات من الفطرين *Trichoderma* و *Glitiocladium roseum* نمو الفطر المسبب للعفن الرمادى وتجرثمه (عن Perkins-Weazie & Collins ١٩٩٥).

وفى إحدى الدراسات عوملت ثمار الفراولة بغطاء coating رقيق جداً، يحتوى على *Cryptococcus laurentii* (بتركيز ١٠^٦ cfu/مل)، مع الألجينيت alginate (٢٪ وزن/حجم)، والجليسرول glycerol (٢٪ وزن/حجم)، وحامض البالتيك palmitic acid (٠.٥٪ وزن/حجم)، وأحادى إستياريت الجليسرول glycerol monostearate (٠.٥٪ وزن/حجم)، وبيتا سيكلو دكسترين β -cyclodextrin (٥٪ وزن/حجم) وقد وجد أن حيوية *C. laurentii* لم تتأثر خلال ٢٠ يوماً من التخزين، مما أدى إلى المساعدة فى منع نمو الأعفان والمحافظة على جودة ثمار الفراولة طوال فترة التخزين ولم يؤثر غطاء الـ sodium alginate مع *C. laurentii* جوهرياً على اللون الخارجى أو على المحتوى الأنثوسيانينى أثناء التخزين هذا بالإضافة إلى أن الغطاء قلل جوهرياً من التحلل الميكروبي، وخفض القصد فى الوزن، وحافظ على صلابة الثمار، وحسّن من خصائص جودة الثمار اثناء التخزين (Fan وآخرون ٢٠٠٩).

المعاملة بأبخرة حامض الخليك

أدى تعريض ثمار الفراولة لبخار حامض الخليك بتركيز منخفض لفترة قصيرة مع تعبئتها فى عبوات ذات جو معدل إلى تقليل إصابتها بالأعفان وزيادة قدرتها التخزينية بأكثر من ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يحدث فى الظروف العادية وكان التركيز المستعمل من حامض الخليك هو ٥.٤ ملليجرام لكل لتر. وكانت الثمار قد لقحت أولاً بالفطر *B. cinerea*، ثم عرضت لأبخرة الحامض ثم عبئت وخزنت فى هواء تنخفض فيه نسبة

الأكسجين. وبعد ١٤ يوماً من التخزين كانت الثمار التي عوملت بهذه الطريقة خالية تماماً من الإصابة بالأعفان مقارنة بنسبة إصابة ٨٩٪ في ثمار الكنترول (Moyls وآخرون ١٩٩٦).

وفي دراسة أخرى وجد أن معاملة ثمار الفراولة بأبخرة الخل الأبيض (الذى يحتوى على ٥٪ حامض الخليك) أدت إلى خفض الإصابة بالعفن الرمادى إلى ١,٤٪ مقارنة بنسبة ٥٠٪ عفن في ثمار الكنترول (Sholberg وآخرون ٢٠٠٠).

التبخير بأكسيد النيتريك

قام Wills وآخرون (٢٠٠٠) بتبخير ثمار الفراولة من صنف باخرو بأكسيد النيتريك NO (وهو غاز free radical) لمدة ساعتين على ٢٠ م بتركيزات تراوحت بين ١,٠ و ٤٠٠٠ ميكروليتر/لتر، ثم خزنت الثمار على حرارة ٢٠ أو ٥ م في هواء يحتوى على ٠,١ ميكروليتر من الإثيلين/لتر، وهو تركيز يتواجد بصورة عادية في أسواق الخضار والفاكهة أدت المعاملة إلى زيادة فترة احتفاظ ثمار الفراولة بقدرتها على التخزين، وحصل على أفضل تأثير بالمعاملة بتركيز ٥-١٠ ميكروليتر أكسيد النيتريك/لتر حيث أدت إلى زيادة فترة الصلاحية للتخزين بمقدار ٥٠٪ في كل من ٥، و ٢٠ م.

المعاملة بمتعددات الأمين

أدى غمر ثمار الفراولة في متعدد الأمين البوترسين putrescine بتركيز ٢ مللى مول لمدة خمس دقائق إلى تحسين صفات جودتها أثناء التخزين مقارنة بالنقع في التركيزات الأقل من البوترسين، أو في الماء، أو عدم النقع (Khosroshahi وآخرون ٢٠٠٧).

المعاملة بالمركبات العطرية الطبيعية التى تنتجها الثمار

يفيد تبخير ثمار الفراولة ببعض الغازات والمركبات العطرية القابلة للتطاير والتى تنتجها ثمار الفراولة بصورة طبيعية . يفيد استعمالها في تثبيط نمو الكائنات المسببة للأعفان، ولكن يتعين تحديد التركيز الذى يحقق الهدف دون التأثير على طعم الثمار أو

تكنولوجيا وتكنولوجيا ما بعد حصاد الخضر النمرية – التداول والتخزين والتصدير

نكهتها، ودون ترك أى متبقيات غير مرغوب فيها على المنتج الطازج فمثلاً . وجد أن المعاملة بغاز الأسيتالدهيد acetaldehyde بتركيز ١٥٠٠ جزء فى المليون لمدة ٤ ساعات أدى إلى خفض الإصابة بالعفن الرمادى بنسبته ٢٠٪ مع تحسين طعم الثمار ونكهتها كذلك هذا إلا أن الأسيتالدهيد يمكن أن يقلل من حموضة الثمار ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة، وإلى زيادة محتواها من الكحول الإيثيلى، والإيثيل أسيتيت ethyl acetate، والإيثيل بيوتريت ethyl butyrate. كذلك يمكن للمركبين الطبيعيين اللذان تنتجهما ثمار الفراولة، وهما benzylaldehyde و 2-nonanone يمكنهما تثبيط نمو الفطر *B. cinerea* دون إحداث تأثير سلبى على طعم الثمار أو نكهتها (عن Perkins-Veazie & Collins ١٩٩٥).

كذلك أثبت المركب (E)-2-hexenal فاعلية فى مكافحة أعفان الثمار، وظهر - فى البيئات الصناعية - أن عملية إنبات جراثيم الفطر *B. cinerea* كانت أكثر حساسية للمركب عن عملية نمو الفزل الفطرى. وقد أدت التركيزات المنخفضة من المركب إلى تحفيز النمو الفطرى، وهو الأمر الذى حدث - كذلك - عند معاملة الثمار ذاتها؛ مما يعنى ضرورة زيادة تركيز المركب لكى يكون فعالاً فى تثبيط أعفان الثمار بعد الحصاد (Fallik وآخرون ١٩٩٨).

كذلك أدت معاملة الفراولة بهذا المركب العطرى المتطاير (E)-2-hexenal إلى إحداث نقص جوهري فى الإصابة بالعفن الرمادى عند إجراء المعاملة أثناء تخزين الثمار لمدة ٧ أيام على ٢°م، ثم نقلها - بعد توقف المعاملة - إلى ٢٢°م لمدة ٣ أيام، وذلك مقارنة بثمار معاملة الكنترول وبالمقارنة فإن المعاملة بأى من المركبات العطرية (E)-2-hexenal diethyl acetal، أو benzaldehyde، أو methyl benzoate لم تكن مؤثرة (Ntirampemba وآخرون ١٩٩٨).

وعندما عرضت ثمار فراولة مصابة طبيعياً بالفطر *B. cinerea* لأبخرة عديد من المركبات المتطايرة التى تتواجد طبيعياً فى الثمار، وجد أن الكثير من تلك المركبات، مثل benzaldehyde، و methyl benzoate، و methyl salicylate، و 2-nonanone، و 2-

hexenal diethyl acetal، و hexanol، و E-2-hexen-1-ol تثبط نمو الفطر عند تركيزات منخفضة تقدر بالجزء في المليون كذلك كان لبعض المركبات تأثيرات سلبية على جودة الثمار. وبينما كانت بعض المركبات فعالة بعد فترة قصيرة من المعاملة بها، لزم استمرار المعاملة على الدوام بمركبات أخرى لكي تكون فعالة (Archbold وآخرون ١٩٩٧).

المعاملة بالمثيل جاسمونيت

تفيد معاملة ثمار الفواولة بالمثيل جاسمونيت methyl jasmonate في مكافحة الأعفان. وهذا المركب رخيص نسبياً ولا يلزم للمعاملة به سوى كميات بسيطة، فلا يحتاج الأمر لأكثر من ٢٥ مل (سم^٣) منه لمعاملة حمولة شاحنة كاملة، وهو لا يترك أي أثر متبق.

تجرى المعاملة في حرارة ٢٠°م باستعمال أبخرة المركب، ولهذا السبب فإنها ربما لا تكون مجدية مع محصول التصدير الذي يتعين تبريده أولاً في خلال ساعة واحدة من حصاده، بينما تتطلب المعاملة بالمركب ساعتين على الأقل.

وقد درس Perez وآخرون (١٩٩٧) تأثير المثيل جاسمونيت على نضج ثمار الفواولة المقطوفة وذلك بحصاها وهي خضراء غير مكتملة النمو، وزراعتها في بيئة تحتوي على ٨٨ مللي مولار سكروز في إضاءة مقدارها ٣٠٠ ميكرومول لكل م^٢ في الثانية، لمدة ١٦ ساعة يومياً، مع حرارة مقدارها ٢٥°م نهاراً، و ١٥°م ليلاً، ورطوبة نسبية ٨٥٪ مع إضافة المثيل جاسمونيت إلى البيئة بتركيز ٥٠ ميكرومولار. وقد وجدوا أن إضافة المثيل جاسمونيت أحدثت زيادة معنوية في كل من معدل التنفس وإنتاج الإثيلين بكل من الثمار البيضاء والوردية. كما ازداد نمو الثمار المعاملة بالمثيل جاسمونيت بمقدار ٥٥٪، مقارنة بزيادة مقدارها ٣٣٪ فقط في ثمار الكنترول. وأدت المعاملة كذلك إلى إحداث تأثيرات معنوية في تلوين الثمار، حيث حفزت تمثيل الأنثوسيانين في خلال يومين من المعاملة، مع زيادتها لمعدل تحليل كلوروفيل أ، وكلوروفيل ب، وبدرجة أقل البيتاكاروتين والزانثوفيل xanthophyll.

ويستدل من دراسات Mukkun & Singh (٢٠٠٩) على الفراولة أن المثيل جاسمونيت methyl jasmonate الطبيعي ينظم نضج الثمار؛ حيث وجد أنه يصل إلى أعلى تركيز له في الثمار البيضاء، ثم ينخفض تركيزه تدريجياً مع تقدم النضج، كما أن معاملة الثمار بالمثيل جاسمونيت يزيد من إنتاج الإثيلين، وينشط كلا من الـ ACC oxidase والـ ACC synthase، تبعاً للتركيز المعامل به من المثيل جاسمونيت، ومرحلة تطور الثمار وقت معاملة

المعاملة بالـ 1-MCP

قام Ku وآخرون (١٩٩٩) بتبخير ثمار ٤ أصناف من الفراولة بالمركب 1-methylcyclopropene (اختصاراً 1-MCP) لمدة ساعتين على ٢٠ م بتركيزات تراوحت بين ٥، و ٥٠٠ نانوليتراً/لتر، ثم تخزين الثمار على ٢٠ أو ٥ م في هواء يحتوي على ١ ميكروليتر من الإثيلين/لتر وقد أدى تبخير الثمار بتركيز ٥-١٥ نانوليتراً من المركب/لتر إلى زيادة فترة صلاحيتها للتخزين بنسبة حوالى ٣٥٪ فى حرارة ٢٠ م، و ١٥٠٪ فى حرارة ٥ م، ولكن زيادة تركيز الغاز عن ذلك أضعفت قدرة الثمار على التخزين بنسبة وصلت إلى ٣٠-٦٠٪ عند تركيز ٥٠٠ نانوليتراً/لتر

وأدت معاملة ثمار الفراولة بالمركب 1-MCP بتركيز ٥٠٠-١٠٠٠ نانوليتراً/لتر لمدة ساعتين على ٢٠ م، ثم تركها فى عبوات مغلقة ومهواه لمدة ٣ أيام فى الظلام على ٢٠ م و ٩٥-١٠٠٪ رطوبة نسبية إلى تحفيز الإصابات المرضية، وإلى خفض إنتاج الثمار للإثيلين، وتثبيط نشاط الـ phenylalanine ammonia-lyase، وخفض الزيادة فى محتوى الأنثوسيانين والفينولات، وقد يكون لانخفاض محتواها من الفينولات علاقة بزيادة قابليتها للإصابة بالأعفان (Jiang وآخرون ٢٠٠١).

وبينما تأثر كأس ثمرة الفراولة سلبياً بالتعرض للإثيلين بتركيز ٠,١ إلى ١٠ حجم فى المليون، فإن المعاملة بالـ 1-MCP بتركيز حجم واحد فى البليون أدت إلى حماية كأس الثمرة من تلك التأثيرات ولم تؤثر تلك المعاملة على جودة الثمار، ولكنها رادت قليلاً

من معدل إصابتها بالأعفان، مع تأثير قليل على الصلاحية للتخزين (Bower وآخرون ٢٠٠٣).

المعاملة بالحرارة

يذكر أنه أمكن مكافحة العفن الرمادى فى ثمار خمسة أصناف من الفراولة بعد الحصاد بمعاملة الثمار بالهواء الرطب على حرارة ٤٤°م لمدة ٤٠ دقيقة (عن Garcia وآخرين ١٩٩٦). كما وجد أن معاملة الثمار بالغمر فى الماء الساخن على حرارة ٤٤-٤٦°م لمدة ١٥ دقيقة أدت إلى منع الانتشار السريع للإصابة بالعفن الرمادى وحافظت فى الوقت ذاته على صلابة الثمار وجودتها، فلم تتكون رائحة غير مقبولة أو طعم غير مرغوب فيه (Garcia وآخرون ١٩٩٦).

وأدت معاملة ثمار الفراولة التامة التلون بالأحمر من صنف سلفا بالحرارة على ٣٩-٥٠°م لمدة ١-٥ ساعات، ثم وضعها فى حرارة الصفر خلال الليل، ثم حفظها على ٢٠°م لمدة ٣ أيام .. أدى ذلك إلى تحسين القدرة التخزينية للثمار ومنع الإصابة بالأعفان، وكانت أفضل المعاملات هى التعريض لحرارة ٤٢°م أو ٤٨°م لمدة ٣ ساعات. وقد أدى التعريض لحرارة ٤٨°م إلى تقليل معدل فقد الصلابة مقارنة بما حدث فى معاملة الشاهد، بينما لم تؤثر معاملة التعريض لحرارة ٤٢°م جوهرياً على تلك الخاصية. وقد أدت كلتا المعاملتين إلى خفض تراكم الأنثوسيانين وخفض نشاط الإنزيم phenylalanine ammonia-lyase مقارنة بما حدث فى ثمار الكنترول. وأدت معاملة الحرارة على ٤٢°م أو ٤٨°م إلى تراكم خمسة من بروتينات الصدمة الحرارية heat shock proteins، بالإضافة إلى بروتين سادس ظهر فقط عند المعاملة بحرارة ٤٢°م (Civello وآخرون ١٩٩٧).

كذلك أدى تعريض ثمار الفراولة للهواء الدافئ على ٤٥°م لمدة ثلاث ساعات قبل تخزينها على الصفر المثلوى لمدة ٧ أو ١٤ يوماً إلى احتفاظها بصلابتها بعد ٧ أيام من التخزين بدرجة أفضل من ثمار الكنترول، ولكن اختفى ذلك الفرق بينهما بعد ٧ أيام

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

أخرى، كذلك قللت المعاملة من إصابة الثمار بالأعفان وخفضت من الحمض الميكروبي الذى يوجد بها (Vicente وآخرون ٢٠٠٢).

المعاملة بأشعة جاما

تستخدم معاملة التعريض لأشعة جاما بجرعة تصل إلى واحد kGy - فى الولايات المتحدة - لأجل إبطاء النضج وتقليل الأعفان فى الخضروات والفواكه الطازجة وفى الفراولة أدى تعريض الثمار لجرعة مقدارها ٠.٣-١.٠ kGy إلى نقص محتواها من الأنثوسيانين، دونما تأثير على حموضتها. ووجد أن معاملة قدرها واحد kGy قضت على الفطر *Rhizopus* بثمار الفراولة، ولكن لزم التعريض لجرعة مقدارها ٢ kGy للتأثير على الفطر بوتريتس *Botrytis*

وقد كان الجمع بين التعبئة فى الهواء المعدل مع التعريض للإشعاع أكثر كفاءة فى تقليل الأعفان عن أى من المعاملتين منفردتين (عن Perkins-Veazie & Collins ١٩٩٥). وأدت معاملة ثمار الفراولة من صنف تراى ستار Tristar بالإشعاع (electron-beam irradiation) بجرعات متزايدة من صفر إلى ٢ kGy عند ١٠ MeV إلى إحداث نقص مواز فى كل من شدة إحممرار الثمار وصلابتها، ولكنه أدى فى الوقت ذاته إلى تثبيط النمو الفطرى (*B. cinerea* بصورة أساسية) بالثمار المخزنة، وأدت جرعتا الإشعاع ١، و ٢ kGy إلى زيادة القدرة التخزينية بمقدار يومين وأربعة أيام، على التوالى.

هذا . وتباع فى محلات السوبر ماركت بالولايات المتحدة ثمار الفراولة المعاملة بالإشعاع منذ عام ١٩٩٣ دونما اعتراض من المستهلكين (Gladon وآخرون ١٩٩٧).

سلسلة التبريد وأهميتها

يعنى بسلسلة التبريد cold chain بقاء المنتج (ثمار الفراولة المعبأة) فى حرارة منخفضة تتراوح بين صفر، و ١°م من وقت التبريد الأول إلى حين وصوله إلى المستهلك، مروراً بمراحل التخزين المؤقت، والنقل، والشحن، والتسويق، وما يتطلبه ذلك من

الفصل السابع - القراولة

تحميل المحصول فى مكان مبرد، وتبريد الشاحنة قبل تحميل المحصول فيها، والمحافظة على حرارة الشاحنة منخفضة أثناء النقل إلى الميناء الجوى، وفى الميناء الجوى ذاته، واستخدام مكان مبرد لتفريغ الشاحنات، وأثناء الشحن الجوى، وأثناء النقل البرى بعد ذلك لحين الوصول إلى أماكن التخزين المؤقت، ثم أثناء النقل إلى الأسواق. كما يجب أن يعرض المحصول للبيع فى حرارة منخفضة كذلك، ولكنها تكون - عادة - فى حدود ١٠°م.

وقد أوضحت عديد من الدراسات أن شدة تدهور ثمار القراولة تتناسب طردياً مع فترة تعرض الثمار للحرارة المرتفعة، مع تأثير قليل فقط للتغيرات الحرارية - بالارتفاع والانخفاض - خلال فترة التعرض للحرارة العالية؛ بمعنى أن ثمار القراولة يجب إعادة تبريدها سريعاً فى كل مرة تكتسب فيها حرارة جديدة. وعلى الرغم من أن بخار الماء يتكثف على الثمار فى كل مرة ترتفع فيها حرارة الثمار إلا أن الإصابة بالأعفان التى قد تنجم عن ذلك - على الرغم من خطورتها - أقل من الأضرار التى يمكن أن تحدث عند عدم إعادة تبريد الثمار. وعلى الرغم من أنه يفضل - دائماً - المحافظة على سلسلة التبريد، إلا أن أى تبريد - ولأى فترة - يعد مفيداً، ويتبين ذلك من جدول (٧-٣).

جدول (٧-٣): تأثير التغيرات الحرارية التى تعرض لها ثمار القراولة خلال ٤٨ ساعة من الحصاد على جودتها (عن Mitchell وآخرين ١٩٩٦).

حالة الثمار (%)			المعاملة
متعفة	طرية	جيدة	
١	٤	٩٥	٤٨ ساعة على ٥°م
١٤	١٠	٧٦	٢٤ ساعة على ٥°م، ثم ٢٤ ساعة على ٢٠°م
			١٢ ساعة على ٥°م، ثم ١٢ ساعة على ٢٠°م
٢٣	٧	٧٠	ثم ١٢ ساعة على ٥°م، ثم ١٢ ساعة على ٢٠°م
٥٥	١	٤٤	٤٨ ساعة على ٢٠°م

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ومع الحرارة المنخفضة التي يتعين المحافظة عليها أثناء سلسلة التبريد، فإن الرطوبة النسبية يجب المحافظة عليها - كذلك - بين ٩٠٪ و ٩٥٪، ويفضل أن تكون بين ٩٥٪ و ٩٨٪، وخاصة أثناء التخزين المؤقت للمنتج قبل النقل، وقبل التسويق

وإذا ما أجرى الحصاد بطريقة مناسبة، وتمت عمليات التداول والتعبئة حسب الأصول الموصى بها، وتم الانتهاء من تبريد المحصول أولياً إلى درجة صفر-١ م في خلال ساعتين من الحصاد كحد أقصى، وحافظ على سلسلة التبريد بصورة تامة فإن ثمار الفراولة يمكنها الاحتفاظ بكامل جودتها ورونقها لمدة ٧ أيام بخلاف يومين آخرين للعرض بالأسواق.

ويمكن بإبقاء المنتج في جو هوائي معدل ترفع فيه نسب ثاني أكسيد الكربون إلى ١٠٪-٣٠٪ - مع المحافظة على سلسلة التبريد . يمكن بذلك احتفاظ ثمار الفراولة بكامل جودتها ورونقها لمدة ١٠-١٤ يوماً بخلاف يومين آخرين للعرض بالأسواق

وتنخفض فترة احتفاظ الفراولة بجودتها بالانحراف عن شروط الحصاد والتداول الموصى بها، وتزداد سرعة تدهور الثمار بزيادة الانحراف عن الظروف المثلى

وعموماً فإن فترة احتفاظ الفراولة بجودتها أثناء الشحن والتخزين تتراوح - تحت الظروف الجيدة - ما بين أسبوع واحد وأُسبوعين، ويتوقف ذلك على درجة نضج الثمار عند الحصاد، وطريقة التداول. ويجب دائماً ضبط درجة حرارة مبردات الفراولة ومخازنها على الصفر المئوي قدر المستطاع مع توخى أن تكون التقلبات الحرارية في أضيق الحدود.

وتتوقف درجة تجمد ثمار الفراولة على تركيز المواد الصلبة الذائبة بالثمار، حيث تزداد درجة التجمد انخفاضاً كلما ازداد تركيز المواد الذائبة. وتعد -٨،٠ م هي أعلى حرارة يمكن أن تتجمد عندها ثمار الفراولة (Mitchell وآخرون ١٩٩٦).

ونستعرض - فيما يلي - الطرق والوسائل المثلى للمحافظة على سلسلة التبريد، وعلى جودة الثمار لأطول فترة ممكنة.

التبريد الأولي

يعد التبريد الأولي pre-cooling أفضل وسيلة لحفظ جودة الثمار، لأنه يؤدي إلى إبطاء التنفس، والتحلل الإنزيمي، والنمو الفطري. وتجب إزالة حرارة الحقل بعد الحصاد مباشرة، وقبل تخزين الثمار، أو شحنها، أو تصنيعها.

يجب أن يبدأ التبريد الأولي في خلال ساعة واحدة من الحصاد، ويؤدي التأخير عن ذلك، أو إجراء التبريد الأولي بطريقة غير مناسبة إلى حدوث فقد كبير في كل من صلابة الثمار، وحلاوتها، وبريقها، مع زيادة في إصابتها بالأعفان.

كذلك يعد خفض حرارة الثمار سريعاً بعد الحصاد مع استمرار التخزين البارد بعد ذلك عاملاً أساسياً في المحافظة على مستوى الثمار المرتفع من حامض الأسكوربيك (فيتامين ج)، وبغير ذلك يمكن أن يتدهور محتوى الثمار من الفيتامين إلى أقل من نصف محتواه الأصلي في أقل من أسبوع (Nunes وآخرون ١٩٩٦).

وكقاعدة عامة .. تفقد ثمار الفواولة يوماً كاملاً من قدرتها التخزينية مقابل كل ساعة تأخير في عملية التبريد الأولي بعد مرور ساعتين من الحصاد. ويتطلب الحصول على أكبر قدرة تخزينية إجراء التبريد الأولي بحيث تنخفض درجة الحرارة في مركز الثمرة إلى صفر إلى ١°م في خلال ساعتين من الحصاد كحد أقصى.

كذلك تتأثر الصلاحية للتسويق سلباً بالتأخير في عملية التبريد الأولي (شكل ٧-١).

وقد أدى التبريد الأولي السريع للفواولة (في خلال ساعة واحدة من الحصاد) إلى الصفر المئوي - مقارنة بالتبريد الأولي المتأخر (بعد ٦ ساعات من الحصاد) إلى انخفاض الإصابة بكل من الفطرين *Botrytis cinerea*، و *Rhizopus stolonifer* إلى ٦٠٪ فقط في التبريد الأولي المبكر، مقارنة بـ ٨٥٪ إصابة في التبريد المتأخر (Nunes وآخرون ٢٠٠٥).


وتجدر الإشارة إلى أن فطر البوتريتس *Botrytis cinerea* يستمر في النمو حتى على درجة الصفر المئوي، وإن كان ذلك يحدث ببطء شديد على تلك الدرجة، هذا بينما لا

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ينمو الفطر *Rhizopus stolonifer* (الذى تتواجد جراثيمه فى الهواء) على حرارة تقل عن 5°C (Mitcham وآخرون ٢٠٠٧)

هذا . علمًا بأن تخزين الفراولة يكون على درجة صفر إلى 0.5°C ، مع ٩٠٪-٩٥٪ رطوبة نسبية

⊗ الصالح للتسويق (%)



شكل (٧-١): العلاقة بين مدى التأخير فى التبريد الأولى للفراولة وصلاحية الثمار للتسويق (Mitcham وآخرون ٢٠٠٧).

تبريد الغرفة

لا يجوز تبريد الفراولة أوليًا بتركها فى الغرف المبردة، فيما يعرف باسم تبريد الغرفة room cooling، ذلك لأن تبريدها بهذه الطريقة بشكل كامل - أى لحين وصول حرارة مركز الثمرة إلى صفر أو 1°C - يتطلب حوالى تسع ساعات، تكون الثمار قد فقدت بالفعل خلالها كثيرًا من قدرتها التخزينية.

التبريد الأولى بطريقة الدفع الجبرى للهواء

يعد التبريد بنظام الدفع الجبرى للهواء forced-air cooling أسرع بمقدار ٥-١٠ مرات عن طريقة التبريد بوضع المحصول فى الحجرات الباردة room cooling.

ويسمح التبريد الأولي بطريقة الدفع الجبرى للهواء بالتخلص من حرارة الحقل من الثمار بسرعة وكفاءة عاليتين دون تعريض الثمار للابتلال، وهو أمر لا تتحمله ثمار الفراولة ويجب أن تسمح قوة تبريد الأجهزة المستخدمة بتحقيق $\frac{1}{8}$ تبريد خلال مدة ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين ونصف كحد أقصى.

ويجب أن يسمح تصميم وحدة التبريد الأولى بمرور الكراتين فى اتجاه واحد من مكان التعبئة إلى وحدة التبريد الأولى، ثم إلى التخزين المؤقت، ثم إلى الحاويات.

يجرى التبريد الأولي بطريقة الدفع الجبرى للهواء بوضع صف من البالتات (أو صفين من الكراتين المرصوفة فوق بعضها البعض) على كل جانب من جانبي مروحة ساحبة للهواء، ويفصل بين صفى البالتات مسافة تعادل - عادة - قطر المروحة. تستخدم شريحة بلاستيكية ثقيلة فى تغطية الصف العلوى للكراتين جزئياً بالقرب من حافة النفق (وهو الجزء الذى يفصل بين صفى البالتات)، وكذلك تغطية النفق من أعلى ومن الجانب الأمامى (المقابل للمروحة)، وجانب الكراتين الأمامى. وبذا .. فإن هذا الغطاء لا يسمح بأى حركة للهواء إلا من خلال الجانبين الخارجيين لصفى البالتات؛ فعند تشغيل المروحة الساحبة للهواء، يتولد تفريغ داخل النفق المغطى بشريحة البلاستيك بين صفى الكراتين؛ مما يؤدى إلى سحب الهواء البارد (هواء المخزن المبرد) من خلال فتحات التهوية بالكراتين، ثم من خلال فتحات التهوية بالبنتس - والتي تكون مقابلة لفتحات التهوية بالكراتين - مروراً بالثمار - ثم ليخرج من الكراتين - بعد حمله لحرارة الثمار - إلى داخل النفق، ليسحب بواسطة مروحة الشفط، التى توجه الهواء المسحوب - الدافئ نسبياً - على ملفات وحدة التبريد، ليعود - بعد تبريده - إلى داخل الغرفة المبردة. ويتعين إيقاف المروحة بمجرد انتهاء عملية التبريد الأولى لأجل توفير الطاقة، ولمنع فقد الثمار لرطوبتها، وهو ما يمكن أن يحدث نتيجة لاستمرار تعرضها لتيار الهواء السريع الذى يمر حولها.

ونظراً لأن الهواء المسحوب يُجبر على المرور فى مسار يتخلل الثمار؛ لذا .. يتعين رصّ البنتس فى الكراتين، و رصّ الكراتين فى الصفوف قائمة تماماً دون ترك أية فراغات

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

بينها، لأن الهواء يسلك دائماً في مساره أقل الطرق مقاومة، وهو أمر يؤدي - إن حدث - إلى تقليل كفاءة التبريد

يجب كذلك سد جميع الفتحات التي توجد تحت البالثات إذا ما كانت الكراتين مرصوفة في البالثات، لأن عدم سدها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوقت - الذي يلزم لإجراء التبريد - بنسبة حوالى ٤٠٪ ويمكن سد هذه الفتحات بسهولة بوضع حشو فيها بسلك ١٥ سم، أو بلصق شريط بلاستيكي حول قاعدة البالثة من الخارج

يتعين كذلك التحكم في الرطوبة النسبية، ذلك لأن الهواء المتحرك يعمل على تبخير الرطوبة من الثمار، مما يؤدي إلى ذبولها، وانكماشها، وفقدانها لجودتها ويؤدي رفع رطوبة الهواء إلى ٩٥٪-٩٨٪ إلى تقليل قدرته على تبخير الماء من الثمار وتلك هي الرطوبة النسبية المطلوبة كذلك أثناء تخزين المحصول قبل شحنه.

وإذا ما تم صرف الماء المتكثف على ملفات التبريد خارج حجرة التبريد أو خارج المخزن المبرد، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض الرطوبة النسبية في هواء المخزن بدرجة كبيرة. ويمكن الحد من عملية التكثف تلك - إلى درجة كبيرة - بالمحافظة على فرق في درجة الحرارة - بين الهواء المسحوب الذي يمر على ملفات التبريد والهواء الخارج منها - لا يزيد عن ٢,٥°م. ويتحقق ذلك بزيادة أعداد الملفات أو أحجامها

ويجب دائماً استعمال نظام ملفات التبريد الجافة dry coil system لأنه النظام الوحيد الذى يسمح بخفض درجة الحرارة إلى الصفر المئوى مع المحافظة على رطوبة عالية للهواء، وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملفات المبتلة wet coil system لا يسمح أبداً بالتبريد إلى الصفر المئوى. هذا .. ولا يمكن رفع رطوبة الهواء فوق ٨٠٪-٨٥٪ بأى وسيلة غير إجراء التبريد بنظام ملفات التبريد الجافة مع استخدام أجهزة لرفع الرطوبة النسبية

هذا ويمكن رفع رطوبة الهواء حتى ٩٥٪ باستعمال أجهزة للتضبيب الدقيق aerosol misting تثبت بالجدران قريباً من سقف المخزن، وتتصل بجهاز لقياس الرطوبة

humidistat. ولا يفيد كثيراً وضع أوانٍ أو جرادل مملوءة بالماء فى المخزن بهدف زيادة الرطوبة. كذلك فإن رش الأرضيات بالماء يعد طريقة غير عملية ولا تتفق مع مقتضيات الصحة العامة.

ويجب عدم إيقاف التبريد الأولى إلا بعد قياس درجة الحرارة فى مركز الثمرة باستعمال تومومتر خاص ذات مجس معدنى طويل. ويجب أن يكون القياس فى جوانب الكراتين المواجهة للنفق الذى يفصل بين صفى الكراتين؛ ذلك لأن تلك الجوانب تكون هى الأبطأ فى فقد الحرارة.

ولكى تتم عملية التبريد الأولى وتصل الحرارة فى وسط الثمار إلى صفر أو -1°C فى خلال ساعتين من الحصاد - كحد أقصى - يتعين استخدام مراوح شفط ذات قدرة محددة، ووحدات تبريد ذات كفاءة مناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن سرعة الهواء الدائر فى عملية التبريد الأولى يجب ألا تزيد عن 42 م^2 فى الدقيقة؛ وإلا أدى إلى عدم تجانس الضغط وحركة الهواء وسرعة التبريد بين أول النفق وآخره (Picha 1997).

يجب حساب كمية الطاقة المتولدة (فى صورة وحدات حرارية بريطانية British Thermal Units، أو BTU) من كل من المصادر التالية، ليتمكن حساب قدرة التبريد المطلوبة:

- ١ - حرارة الحقل .. وهى الحرارة الداخلية للثمار عند بداية التبريد.
- ٢ - حرارة التنفس .. وهى الحرارة التى تنشأ عن تنفس ثمار الفواولة والتى تتراوح باختلاف درجة الحرارة - بين 333 وحدة حرارية بريطانية عند الصفر المئوى، و 46400 وحدة حرارية بريطانية عند 27°C ، وذلك لكل طن من الثمار يومياً.
- ٣ - حرارة العيوات والبالقات.
- ٤ - الحرارة المتسربة.
- ٥ - الحرارة الناشئة عن الإضاءة، والمراوح، والعمل، والرافعات الشوكية ... إلخ.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ويقدر عدد الوحدات الحرارية البريطانية التي تلزم لخفض حرارة طن واحد من ثمار الفراولة من 27°C إلى صفر $^{\circ}\text{C}$ بحوالى ٩٨١٣٠ (أو حوالى ١٠٣٥٣٠ كيلو جول لكغ) فى الساعة؛ فإذا ما كان المطلوب خفض حرارة الثمار إلى هذا المستوى فى خلال ساعة واحدة فإن كفاءة التبريد يجب أن تكون ٨.٢ طن تبريد (طن التبريد يمتص ١٢٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية من الحرارة فى الساعة) (أو حوالى ١٢٦٦٠ كيلو جول/ساعة). وإذا ما أضفنا إلى ذلك حوالى ٢٥٪ من احتياجات التبريد لمعادلة مصادر الطاقة الأخرى، فإن كفاءة التبريد اللازمة تصبح حوالى ١٠.٦ طن تبريد لإزالة حرارة الحقل من كل طن من الثمار فى ساعة ومن الطبيعى أن احتياجات التبريد تزداد بزيادة كمية المحصول التى يتعين تبريدها فى وقت واحد، أو إذا كانت غرفة التبريد مستخدمة كذلك فى التخزين المؤقت للمحصول. ويجب أن يخطط لكفاءة التبريد اللازمة بحيث تكفى احتياجات التبريد فى ذروة موسم الحصاد

يتم اختيار المراوح على أساس كلا من قدرتها على سحب الهواء وعلى الضغط الاستاتيكي static pressure (عدد سنتيمترات الماء) المتوقع ويكون الضغط الاستاتيكي فى هذه الحالة هو المقاومة التى تلقاها حركة الهواء بواسطة الكراتين والبنّس ويجب استعمال مروحة قادرة على سحب ما لا يقل عن 3.4 م^3 من الهواء لكل كيلو جرام من الثمار فى الساعة مقابل ضغط استاتيكي مقداره ١.٢٥ سم من الماء

ولتحديد القدرة التى تلزم للمروحة فإن الحسابات يجب أن تبني على أساس أكبر كمية من الثمار يلزم تبريدها فى وقت واحد، والتى تكون فى ذروة الحصاد. وكقاعدة عامة فإن موتورات المراوح التى تكون بقوة $\frac{1}{2}$ حصان (١٥٠ وات) توفر ٤٠٠-٦٠٠ قدم مكعب/دقيقة أو حوالى ١١.٣-١٧.٠ م^3 /دقيقة. ويمكن أن يختلف الضغط الاستاتيكي كثيراً على امتداد نفق التبريد حيث يزداد إلى أقصى معدل له بالقرب من المروحة؛ وبذا تأخذ الكراتين البعيدة عن المروحة وقتاً أطول لكى تبرد.

يعرف سبعة أثمان ($\frac{7}{8}$) وقت التبريد بالوقت الذى يلزم لتبريد الثمار بمقدار $\frac{1}{8}$ الفرق بين حرارتها الابتدائية وحرارة الهواء البارد المستخدم فى التبريد الأولى فمثلاً

الفصل السابع - الفراولة

إذا كانت حرارة المحصول 24°م وحرارة هواء التبريد 1°م ، فإن $\frac{1}{8}$ التبريد يعنى خفض حرارة المنتج إلى 2°م . وفى هذه الظروف يلزم التبريد لأكثر من $\frac{1}{8}$ للوصول بالمنتج إلى درجة التبريد المرغوب فيها، وهى صفر إلى 1°م .

وإذا ما تطلب خفض حرارة المنتج بمقدار $\frac{1}{8}$ للوصول بها إلى 2°م (كما فى المثال السابق) .. إذا تطلب ذلك ساعتين من التبريد، فإن حرارة المنتج تصبح 0.5°م بعد ساعة أخرى إضافية من التبريد الأولى.

وتبنى هذه الحسابات على أساس الوقت الذى يتطلبه تبريد أدفا ثمرة فى البالطة، وهى التى توجد فى نهاية النفق (بعيداً عن المروحة) من جهة الداخل.

ويمكن أن يختلف الضغط الاستاتيكي معنوياً على امتداد النفق، علماً بأن أعلى ضغط يكون قريباً من المروحة، ولذا .. فإن أدفا الثمار تكون هى الأبعد عن المروحة.

ويجب دائماً قياس درجة الحرارة فى أجزاء مختلفة من المنتج المراد تبريده أولئاً للتعرف على أقل الأماكن كفاءة فى عملية التبريد (عن Picha 1997).

ويتحدد الوقت الذى يلزم لتبريد أدفا الثمار بمقدار $\frac{1}{8}$ بكل من سرعة حركة الهواء والضغط الاستاتيكي على جانبي النباتات، كما يلى (عن Mitchell وآخرين 1996).

الوقت اللازم لـ $\frac{1}{8}$ تبريد بالساعة:			
١,٥	٢	٣	٤
٢,٠	١,٤	١,٠٨	٠,٠٤
سرعة تدفق الهواء (بالقدم مكعب فى الدقيقة لكل رطل من الفراولة) ^١			
٠,٤٠	٠,٢٠	٠,٠٨	٠,٠٤
الضغط الاستاتيكي للهواء على جانبي البالطات (أى ما بين داخل النفق وخارجه) بالبوصة ^٢ :			
١ قدم مكعب = 0.0283م^3	١ رطل = 0.454كجم	ب- ١ بوصة = 25.4مم	

التبريد الأولي تحت التفريغ

أمكن تبريد ثمار الفراولة أولياً بطريقة التعريض للتفريغ vacuum cooling وفى هذه الطريقة تمت تعبئة الفراولة أولاً ثم وضعت فى حجرة التبريد بالتفريغ وخفض الضغط تدريجياً من ١١ إلى ٢ كيلو باسكال kPa خلال الدقيقة الأولى، ثم إلى ٠,٤ كيلو باسكال خلال الدقيقة الثانية، وبعد ذلك استمر الضغط عند حوالى ٠,٥٥ كيلو باسكال وفى خلال ٣٠ دقيقة انخفضت حرارة سطح الثمار من ٢٠,٤°م إلى ٣,١°م، وحرارتها الداخلية من ٢١,٢°م إلى ٣°م. ولم يكن للتبريد بهذه الطريقة أية تأثيرات ضارة على خصائص الثمار. وبينما أدى التبريد بالتفريغ إلى فقد الثمار لحوالى ٢,٣١٪ من وزنها، فإن الفقد فى الوزن الذى تلى ذلك عند التخزين على ٥°م، و ٧٥٪-٨٠٪ رطوبة نسبية لمدة ٨-١٠ أيام كان أقل مما فى ثمار الكنتروال التى وضعت مباشرة فى المخزن البارد دونما تبريد أولي (Amigo Martin & Mingot Marcilla ١٩٩٦)

التبريد الأولي بالماء البارد

قارن Ferreira وآخرون (١٩٩٤) تبريد الفراولة أولياً بالماء البارد hydrocooling مع تبريدها أولياً بطريقة الدفع الجبرى للهواء البارد، وبطريقة الترك فى المخزن البارد room cooling، وذلك على ثمار الفراولة المكتملة النضج - عند الحصاد - من صنفى سلفا وسويت تشارلى. خزنت الثمار بعد تبريدها أولياً - وبعد تغليف العبوات بغشاء من البولى فينيل كلوريد PVC أو عدم تغليفها - لمدة ٧-١٢ يوماً على حرارة ١°م أو ٧,٥°م، ثم تركت لمدة يوم واحد على حرارة ٢٠°م لمحاكاة ظروف التسويق. وقد أوضحت الدراسة أن التبريد الأولي بالماء البارد - وسواء أكان مزوداً بالكالورين أو غير مزود - لم تكن له تأثيرات ضارة على الثمار، ولم يؤد إلى زيادة إصابتها بالأعفان. ليس هذا فقط بل إن التبريد بالماء البارد أدى إلى احتفاظ الثمار بلونها بعد التخزين بصورة أفضل عما فى حالة التبريد الأولي بطريقة الدفع الجبرى للهواء، كما جعل الثمار أكثر صلابة وأقل فقداً للوزن سواء أغلفت العبوات بال PVC، أم لم تغلف وكانت الثمار فى العبوات

المغلقة أكثر صلابة، وأقل محتوى من المواد الصلبة الذائبة الكلية، ولكن لم تتغير فيها الحموضة المعايرة أو الـ pH، وذلك مقارنة بعدم التغليف. وقد تراوحت نسبة الإصابة بالأعفان في هذه الدراسة (والتي كانت أساساً بسبب الإصابة بالفطرين *Rhizopus stolonifer* و *Botrytis cinerea*) بين صفر٪، و ٥٪ في حالة التبريد الأولى بالماء البارد، وبين ٢٠،٥٪، و ٧٠،٥٪ في حالة التبريد بطريقة الدفع الجبرى للهواء.

وتبعاً لدراسات Sargent وآخرين (١٩٩٦) .. فقد أمكن تبريد الفواولة أولاً بالماء البارد بسرعة أكبر بكثير من سرعة التبريد بطريقة الدفع الجبرى للهواء، حيث لم يستغرق تحقيق $\frac{1}{8}$ تبريد سوى دقائق معدودة بالماء البارد، بينما استغرق ذلك ساعة كاملة أو أكثر من ذلك بطريقة الدفع الجبرى للهواء. كذلك حافظت الثمار المبردة بهذه الكيفية والمعبأة في عبوات المستهلك (سلال سعة حوالى $\frac{1}{4}$ كيلو جرام) على جودتها دون اختلاف عن تلك التى بُردت بطريقة الدفع الجبرى للهواء. ليس هذا فقط، بل إنه يعد التبريد بالماء البارد والتخزين لمدة أسبوعين على 4°C كانت نسبة الفقد فى الوزن أقل مما فى الثمار التى بردت بطريقة الدفع الجبرى للهواء، كما أمكن مكافحة الفطرين الرئيسيين المسببين لأعفان الثمار بعد الحصاد (وهما: *Botrytis cinerea* و *Rhizopus stolonifer*) بإضافة الكلور الحر إلى ماء التبريد بتركيز ١٢٠ جزء فى المليون، مع ضبط pH الماء عند ٦-٧.

كذلك أدى تبريد الفواولة أولاً بالماء الثلج حتى 4°C إلى احتفاظها بجودتها أثناء التخزين فى حرارة مختلفة لمدة ٨ أو ١٥ يوماً عما كان عليه الحال فى الثمار التى برّدت أولاً بطريقة الدفع الجبرى للهواء، حيث كانت أفضل فى لونها الخارجى، وأقل فقداً للرطوبة، وأقل فى شدة الإصابة بالأعفان (Ferreira وآخرون ٢٠٠٦).

وعلى الرغم مما تقدم بيانه من مميزات للتبريد الأولى بتلك الطريقة، فإنه لا يوصى أبداً فى الوقت الحاضر بتبريد ثمار الفواولة أولاً بالماء البارد أو باستعمال الثلج لأن الثمار المبتلة تكون شديدة الحساسية للإصابة بالأعفان، كما أن الأسواق الأوروبية لا تقبل الثمار المبتلة

التخزين البارد المؤقت

تحتاج ثمار الفراولة المبردة أولاً إلى تخزينها - مؤقتاً - على حرارة الصفر المئوي، مع رطوبة نسبية مقدارها ٩٠٪-٩٨٪ قبل تحميلها في شاحنات أو حاويات مبردة. هذا إلا أنه لا يجوز تخزين محصول الفراولة لأكثر من يوم واحد إذا كان معداً للتصدير، لأن فترة التخزين تلك تستقطع تلقائياً من فترة بقاء الثمار بحالة جيدة خلال عملية الشحن والعرض في الأسواق والتي يجب ألا تقل عن أسبوع كما لا يجب إجراء ذلك لتخزين المؤقت إلا بهدف تجميع قدر كاف من المحصول لأجل شغل الفراغ الخاص بالشحنة في الطائرات، أو إن لم تتوفر فراغات للشحنة في الطائرات ويفضل دائماً وصول المحصول إلى المطار في مساء نفس يوم الحصاد.

ويلزم عادة توفير أجهزة لرفع الرطوبة النسبية إلى ما بين ٩٠٪، و ٩٨٪ ويجب وضع ستائر بلاستيكية ثقيلة على جميع المداخل لأجل الحد من تسرب الهواء الدافئ إلى داخل المخازن.

ويتعين تزويد المخازن المبردة بمراوح داخلية ذات قدره على تحريك الهواء داخل المخزن بمعدل ٠٦-١٢ م^٣/دقيقة لكل طن من الفراولة على أساس الحد الأقصى للسعة التخزينية للمخزن. ويجب تصميم وضع المراوح ومنافذ الهواء بحيث يتحرك الهواء ببطء في جميع أجزاء المخزن لضمان تجانس درجة الحرارة فيه

ويجب أن تتوفر بالمخازن ستائر بلاستيكية سمكية تتدلى على جميع الأبواب وفتحات الممرات لتجنب فقد الرطوبة من المخازن. كذلك يجب أن يستعمل في نقل البالتات المحصول روافع مشعبة forklifts تعمل بالكهرباء، للحد من كمية الطاقة الحرارية التي تخلفها عند التشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن احتياجات التبريد لأجل التبريد الأولى تزيد كثيراً عن الاحتياجات التي تلزم للمخازن المبردة، الأمر الذي يتعين أخذه في الاعتبار عند دراسة احتياجات التبريد لكليهما

كذلك لا تؤثر حركة الهواء السريعة على فقد الرطوبة من الثمار أثناء التبريد الأولي، ولكن استمرار الحركة السريعة للهواء لفترة طويلة أثناء التخزين التالى للتبريد الأولي يمكن أن يؤدي إلى ذبول الثمار وانكماشها. وبينما لا تكون الحاجة ماسة جداً لأن تكون الرطوبة النسبية ٩٥٪ أثناء التبريد الأولي، فإنها تكون ضرورة حتمية أثناء التخزين البارد. هذا .. ويفضل دائماً أن يكون التبريد الأولي فى جزء مستقل من حجرة تبريد كبيرة (عن Picha ١٩٩٧).

التخزين والشحن فى جو هوائى معدل أو متحكم فى مكوناته

تفيد زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون وخفض نسبة الأكسجين فى إبطاء نضج الثمار وتحللها بعد الحصاد، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك بديلاً للتبريد والرطوبة النسبية العالية. وتؤدي زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى ١٠٪-٢٠٪، مع خفض نسبة الأكسجين إلى ٥٪-١٠٪ إلى تثبيط إصابة الثمار بالعفن الرمادى دون أن يلحق بها أضراراً. ولطالما استعمل ثانى أكسيد الكربون فى الماضى كمثبط للنمو الفطرى فى شحنات الفراولة باستعمال الثلج الجاف مع إحكام تغطية البالتات للمحافظة على الغاز الذى ينتج عن تسامى الثلج الجاف.

وعلى خلاف الجو المتحكم فى مكوناته controlled atmosphere - والذى يراقب فيه بدقة تركيز الغازات - فإن الجو المعدل modified atmosphere يتم التوصل إليه من خلال نظام البالتات palletization technique. يستخدم لذلك تقنية تجارية تعرف باسم نظام تكترول Tectrol System، وفيه تغطى البالتات الفراولة بأكيس كبير من البوليثلين بسمك ١٢٥ ميكرون. يتم لحامه جيداً عند القاعدة الخشبية بشرط لاصق، أو حرارياً، ثم يسحب الهواء من داخل البالطة حتى يحدث تفريغ جزئى، ويلي ذلك دفع مخلوط من ١٥٪-٢٠٪ ثانى أكسيد كربون مع الهواء عن طريق فتحة صغيرة توجد فى قمة الكيس، ثم تغلق هذه الفتحة جيداً. وبمقتضى هذه التقنية تتراوح نسبة ثانى أكسيد

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر التمرية - التداول والتخزين والتصدير

الكربون داخل البالطة بين ٤٪، و ٢٦٪ (عن Perkins-Veazie ١٩٩٦)، ولكن بمتوسط قدره ١٢٪-١٥٪، حيث يتساوى تقريباً الفاقد من ثانى أكسيد الكربون بالتسرب مع المنتج منه عن طريق تنفس الثمار (Pichon ١٩٩٧)

ومن أهم المشاكل المحتملة لهذا النظام انهيار العزل الغازى إما بسبب تمزق غطاء البالطة، أو عدم إحكام اللحام مع القاعدة.

ويسمح هذا النظام بشحن الفراولة مع منتجات أخرى قد تتطلب نسبة أخرى من مكونات الهواء على درجة الصفر المئوى (Kader ١٩٩١).

يمكن أن تظهر نكهة غير مرغوب فيها وروائح منفرة بثمار الفراولة فى خلال فترة لا تتجاوز ١٢ ساعة من تخزينها فى الجو المعدل أو فى الجو المتحكم فيه وغالباً ما يحدث ذلك نتيجة لزيادة تركيز الأسيتالدهيد بالثمار، ثم تحلله إلى كحول إثيلى، مكسباً الثمار طعماً كحولياً وتعد خلاص الإثيل أكثر المركبات المتطايرة إسهاماً فى إعطاء الرائحة المنفردة فى مثل هذه الحالات.

ويمكن لثمار الفراولة أن تتحمل تركيزات عالية من ثانى أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى زيادة قدرتها على تحمل التخزين. ويوصى غالباً بزيادة تركيز الغاز إلى ١٥٪ عند التخزين على ١٠°م، وإلى ٢٠٪ عند التخزين على ٥°م وقد كانت استجابة ثمار الفراولة لزيادة تركيز الغاز خطية فيما بين تركيز صفر٪، و ١٨٪.

وتؤدى زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى ٣٪ إلى تكوين طعم غير مرغوب فيه، وتتراوح النسبة المثلى للغاز بين ١٢٪، و ١٥٪. وبينما يؤدي خفض نسبة الأكسجين إلى ما بين ٠.٥٪، و ٢٪ إلى الحد من تنفس الثمار ومن نشاط الكائنات الدقيقة المسببة للعفن، إلا أن ذلك يؤدي - كذلك - إلى تكوين طعم غير مرغوب.

ولم تؤد زيادة تركيز الغاز إلى تثبيط نمو الفطريات المسببة للأعفان فقط، بل إنها أخرت فقد الثمار لصلابتها دون أن تؤثر على طعمها (عن Kim & Wills ١٩٩٨)

وتؤدى زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون عن الحدود الموصى بها إلى ظهور طعم

غير مقبول بالثمار تتوقف شدته على كل من التركيز الذى وصل إليه الغاز ومدة التعرض له، كما تختلف الاستجابة للغاز باختلاف الأصناف (عن Fernández-Trujillo وآخرين ١٩٩٩)

يعد التخزين فى ١٥٪ ثانى أكسيد كربون أفضل وسيلة للحد من إصابة ثمار الفواولة بالفطر *Botrytis cinerea* (Wszelaki & Mitcham ٢٠٠٣).

وتقل الإصابة كثيراً بالعفن الرمادى عند خفض نسبة الأكسجين إلى ٠,٥٪ ولكن هذا المستوى يقترب كثيراً من المستوى الذى يضر بالثمار. كذلك تؤدي زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون عن ١٨٪ إلى تثبيط نمو عديد من الفطريات، ولكن هذه النسبة تحدث أضراراً بعديد من الثمار (عن Moyls وآخرين ١٩٩٦).

ويمكن لثمار الفواولة أن تحتفظ بجودتها لمدة ١٠-١٤ يوماً على حرارة ١°م فى هواء معدل يحتوى على ٣٪-٥٪ أكسجين، و ١٥٪-٢٠٪ ثانى أكسيد كربون.

كما أمكن المحافظة على نوعية ثمار الفواولة لمدة ١٤ يوماً - بصورة جيدة - بتخزينها على الصفر المئوى مع ١٢٪ ثانى أكسيد كربون، و ٦٪ أكسجين (Yang & Lee ١٩٩٩).

واحتفظت ثمار الفواولة التى قطفت فى مرحلة ثلاثة أرباع التلوين بصلابتها ولونها الأحمر الصافى بصورة أفضل من الثمار التى قطفت فى مرحلة اكتمال التلوين بالأحمر، وذلك عند تخزينها على ٤° أو ١٠°م، سواء أكان ذلك فى الهواء، أم فى الـ CA على ٥٪ أكسجين + ١٥٪ ثانى أكسيد كربون، وكانت أفضل جودة للثمار عندما خزنت فى الـ CA على ٤°م. ولقد كان التخزين فى الـ CA أفضل من التخزين فى الهواء فيما يتعلق بالمحافظة على الأنثوسيانين ومحتوى المواد الصلبة للثمار الـ ١/٢ تلوين التى خزنت على ١٠°م؛ حيث لم تصبح كاملة الاحمرار إلا بعد أن نقلت إلى الهواء على ٢٠°م (Nunes وآخرون ٢٠٠٢).

وأدى تخزين الفواولة على ٥°م فى ٢٠٪ ثانى أكسيد كربون، مقارنة بالتخزين على

تكنولوجيا وقسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

نفس الدرجة في الهواء إلى انخفاض في كل من اللون وتركيزات السكر والسكريات المختزلة وحامض الستريك، بينما لم يؤثر التخزين في التركيز المرتفع لثنائي أكسيد الكربون على صلابة الثمار أو محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية أو الـ pH أو الحموضة المعايرة (Pelayo-Zaldivar وآخرون ٢٠٠٧)

ومن الأهمية بمكان عند تحضير البالتات لأجل معاملتها بثنائي أكسيد الكربون أن تكون الثمار مبردة جيداً إلى الصفر المئوي؛ ذلك لأن الغطاء البلاستيكي للبالتة سوف يعيق أي تبريد إضافي كما يتعين إجراء كل خطوات هذه العملية في حجرات مبردة، وقبل الشحن مباشرة

وتتكدف الرطوبة على الغشاء البلاستيكي المغلف للبالتة في أي وقت يكون فيه ذلك الغشاء أبرد من الثمار أو أي سطح آخر بداخل البالتة، ولذا .. يتعين أن تكون الثمار مبردة أولاً بشكل جيد جداً قبل وضعها في البالتات، وأن يتم تغليف البالتات قبل شحنها مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التكدف المائي لا تحفز فقط انتشار الإصابة بالعفن الرمادي، ولكنها تضعف كذلك من متانة الكراتين وتعرض الثمار بداخل البننتس لأضرار جسيمة.

تحدث أكبر فائدة من الشحن والتخزين في الجو المعدل عند حصاد الفراولة بعد الفترات التي كان يسودها جو بارد رطب أو ضباب كثيف، حيث قد يتجمع الماء الحر على الثمار في الحقل، وهي الظروف التي يتوقع على أثرها انتشار الإصابة بالعفن الرمادي (عن Mitchell وآخرين ١٩٩٦).

ويتم بهذه الطريقة شحن كميات كبيرة من الفراولة من كاليفورنيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما أنها صالحة للتطبيق على شحنات النقل البحري من مصر إلى أوروبا، علماً بأن الشحن يستمر على درجة الصفر المئوي. وبهذه الطريقة يمكن أن تحتفظ الثمار بجودتها لعدة أيام بعد خمسة أيام من الشحن البحري

ونظراً للأهمية القصوى للمحافظة على سلسلة التبريد عند اتباع هذه الطريقة، فإنه يصعب تطبيقها بهدف زيادة القدرة التخزينية عند الشحن بطريق الجو، بسبب الحاجة لفتح العبوات لإجراء الفحص الجمركي في كل من الدولتين المصدرة والمستوردة. كذلك فإن مجرد إزالة الغطاء البلاستيكي المحيط بالفراولة لإجراء عملية الفحص يؤدي حتماً إلى تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون.

ولكن يفيد اتباع هذه التقنية في الشحن البحري للفراولة حيث تبقى الشحنة طوال فترة الشحن وهي محكمة الإغلاق؛ وبذا .. تتحقق الاستفادة المرجوة من زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون (عن Picha ١٩٩٧).

وقد ذكر أن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء المحيط بالثمار يجعلها تحتفظ بصلابتها لفترة أطول مقارنة بالتخزين في الجو العادي في الحرارة ذاتها. ليس هذا فقط، بل إن Smith & Skog (١٩٩٢) وجدوا أن تخزين ثمار الفراولة المبردة أولاً إلى ٠,٥ م° لمدة ٤٢ ساعة في ١٥٪ ثاني أكسيد كربون أدى إلى تحسين صلابة الثمار - مقارنة بصلابتها عند بدء التخزين - في ٢١ صنفًا من بين ٢٥ صنف تمت دراستها.

كذلك أدى تخزين الفراولة في هواء يحتوي على ٢٠٪ - ٣٠٪ ثاني أكسيد كربون على حرارة ٢,٢ م° لمدة يومين إلى زيادة صلابتها. وأظهر تحليل الجدر الخلوية أن الثمار المعاملة بهذه الطريقة نقص محتواها من البكتين القابل للذوبان في الماء، بينما ازداد محتواها من البروتين الذائب الخالب chelating soluble protein، مقارنة بالثمار التي خزنت في هواء عادي (Siriphanich ١٩٩٨).

وأعطى تعريض ثمار الفراولة لغاز ثاني أكسيد الكربون بتركيز ٢٠٪ - بصورة مستمرة - أفضل تأثير فيما يتعلق بزيادة صلابة الثمار، كما أن معاملة الثمار بالغاز بتركيز ١٠٠٪ لمدة لا تزيد عن ٣ ساعات كانت - كذلك - فعالة في زيادة الصلابة دون التأثير سلباً على الجودة، إلا أن المعاملة بهذا التركيز لمدة ٤ ساعات أدت إلى تكوين طعم غير

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

مرغوب فيه. وقد أوصى - للحصول على أحسن جودة للثمار - عند المعاملة بالفاز بتركيز ١٠٠٪، أن يجرى ذلك لمدة ساعتين فقط (Hwang وآخرون ١٩٩٩)

كذلك وجد Watkins وآخرون (١٩٩٩) لدى معاملتهم لثمار ٧ أصناف من الفراولة بتركيز ٢٠ كيلو باسكال من ثنائي أكسيد الكربون على حرارة ٢°م لمدة ٧ أيام أن المعاملة أدت إلى زيادة الصلابة في كل الأصناف، ولكن بدرجات مختلفة وكانت الثمار المعاملة بالفاز أضعف لوناً وأقل احمراراً عن الثمار التي خزنت في الهواء غير المعدل تحت الظروف ذاتها كذلك تراكم الأسيتالدهيد، والإيثانول، وخلات الإثيل في الثمار المعاملة بالفاز، ولكن بدرجات مختلفة، وكانت أقل تركيزات لها في الصنف Annapolis وأعلى تركيزات في الصنف Governor Simoe.

ويتأثر مدى الزيادة في صلابة الثمار التي تُحدثها المعاملة بثاني أكسيد الكربون بكل من درجة نضج الثمار ودرجة حرارة التخزين (عن Harker وآخرون ٢٠٠٠)

وقد عامل Harker وآخرون (٢٠٠٠) ثمار صنف الفراولة باخارو بثاني أكسيد الكربون بتركيزات ٥٪-٤٠٪ لمدة ثلاثة أيام، ثم خزّنوا الثمار على حرارة الصفر المئوي لمدة ثلاثة أسابيع، ووجدوا أن الثمار كانت أكثر صلابة في المخزن على حرارة الصفر عما كانت عليه عند الحصاد، وأن الصلابة ازدادت بدرجة أكبر عندما عوملت الثمار بثاني أكسيد الكربون، الذي أحدث زيادة مقدارها ٦٠٪ في شدة التصاق الجدر الخلوية بعضها ببعض. وقد استنتج الباحثون أن زيادة صلابة الثمار التي أحدثتها المعاملة بفاز ثاني أكسيد الكربون ربما تعود إلى التغيرات في pH الجدر الخلوية الذي ربما يحفز ترسيب البكتينات الذائبة، ويزيد من شدة لصق الخلايا بعضها ببعض.

وللشحن في الهواء المعدل تأثيرات أخرى على كل من نكهة الثمار ومحتواها من حامض الأسكوربيك، والصبغات.

فعندما عامل Fernández-Trujillo وآخرون (١٩٩٩) ثمار ٧ أصناف من الفراولة بتركيز ٢٠ كيلو باسكال من ثنائي أكسيد الكربون وجد أن المعاملة أدت إلى زيادة

الفصل السابع - الفراولة

تركيز الأسيتالدهيد، والإيثانول، وخلات الإثيل في ثمار الصنفين Honeoye، و Kent، ولكن ليس في ثمار الصنفين Cavendish، و Annapolis. وقد اعتبر الصنفان الأول والثاني حساسين للتركيز العالي من ثاني أكسيد الكربون، بينما اعتبر الصنفان الثالث والرابع متحملين. كذلك كان نشاط الإنزيمين pyruvate decarboxylase، و alcohol dehydrogenase أعلى في الثمار المعاملة بالغاز عما في ثمار الكنترول في الصنفين المتحملين، ولكن ليس في الصنفين الحساسين. كذلك ازداد تراكم حامض الصكنك succinate في ثمار جميع الأصناف، ولكن تركيزاته كانت أعلى في الأصناف المتحملة عما في الأصناف الحساسة.

وأدى تخزين ثمار الفراولة في هواء يحتوي على ثاني أكسيد كربون بنسب عالية وصلت حتى ٢٠٪ في حرارة صفر إلى ١°م إلى سرعة تحلل حامض الأسكوربيك إلى حامض ديهيدروأسكوربيك dehydroascorbic acid، ثم إلى مركب آخر، ربما كان 2,3-diketogulonic acid، وذلك مقارنة بالتخزين في الهواء العادي في الحرارة ذاتها وبعد ٢٠ يوماً من التخزين كان تحلل حامض الأسكوربيك بدرجة أكبر عندما كان الجو المعدل (الذي يحتوي على تركيز عال من ثاني أكسيد الكربون) يحتوي - كذلك - على ١٪-٣٪ أكسجين مقارنة بتركيز < ١٤٪ (Agar وآخرون ١٩٩٥).

وازداد تركيز الأنثوسيانين في الأنسجة الخارجية والداخلية لثمار الصنف سلفا المخزنة على ٥°م لمدة ١٠ أيام، وكانت هذه الزيادة أقل سرعة عندما عُذِّل الهواء ليحتوى على ١٠ أو ٢٠ كيلو باسكال kPa من ثاني أكسيد الكربون؛ وبذا .. كان لون الثمار أقل دكنة عند زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في هواء المخزن عما في حالة التخزين في الهواء العادي. وقد وجد كذلك أن الـ pH ازداد، بينما انخفضت الحموضة المعايرة بدرجة كبيرة أثناء التخزين، وازدادت هذه التغيرات مع زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الأنسجة الداخلية للثمار، وربما لعبت هذه التغيرات دوراً في التأثير على صبغة الأنثوسيانين التي يتأثر تعبير اللون فيها بالـ pH (Holcroft & Kader ١٩٩٩، و ١٩٩٩ ب).

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ومن الممارسات الشائعة في شحن وتسويق الفراولة تغليف عبوات المستهلك الذى يحقق هدفين رئيسيين، هما

- ١- تقليل فقد الرطوبة من الثمار، ومن ثم احتفاظها بنضارتها لفترة أطول
- ٢- زيادة مستوى ثانى أكسيد الكربون ونقص مستوى الأكسجين فى العبوات نتيجة لتنفس الثمار، ومن ثم الحد من نشاط الفطريات المسببة للأعفان.

وقد وجد أن تغليف عبوات الفراولة الحديثة الحصاد غير المعاملة بالمبيدات الفطرية بأغشية البولي فينيل كلوريد PVC المنفذة لغازات الهواء الجوى أدى إلى المحافظة على صفات الجودة بصورة كبيرة، حيث احتفظت الثمار بصلابتها وقل الفقد فى الوزن، وتأخر جفاف الكأس، وانخفضت جوهرياً الإصابة بالعفن الرمادى. وقد صاحبت عملية التغليف زيادة فى نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء داخل العبوات (Aharom & Barkai-Golan ١٩٨٧)

وعبأ Perez وآخرون (١٩٩٧) ثمار الفراولة من صنف كاماروزا فى بنتس سعة ٢٥٠ جم ثم غلفوها بأغشية البولي فينيل كلورايد، أو البولي بروبيلين، أو لم يغلفوها، ثم وضعوا البنتس فى حرارة ٢°م لمدة ٣ أيام، ثم فى حرارة ١٦°م لمدة ٤ أيام لمحاكاة فترتى الشحن والعرض بالأسواق، على التوالى. وقد وجد الباحثون أن مستوى ثانى أكسيد الكربون ازداد فى اليوم السابع إلى ٥٠٪ عند التغليف بالبولى فينيل كلورايد وإلى ١٥٪ عن التغليف بالبولى بروبيلين وفى هذا اليوم السابع كات ثمار العبوات المغلفة بالبولى بروبيلين أصلب جوهرياً عن كل من الثمار المغلفة بالبولى فينيل كلورايد والكنترول. وعلى الرغم من ازدياد دكنة اللون بصورة غير مرغوب فيها فى جميع المعاملات، إلا أن الثمار المغلفة كانت أفضل لوناً. وقد كان تركيز الكحول الإيثيلى (الذى كان أهم المركبات المسئولة عن الطعم غير المرغوب فيه) فى اليوم السابع ٥٧، و ١٠٧، و ٧٥ جزءاً فى المليون فى الثمار المغلفة بالبولى فينيل كلوريد، والمغلفة بالبولى بروبيلين، وثمار الكنترول غير المغلفة، على التوالى.

وقام Garcia وآخرون (١٩٩٨) بدراسة تغليف عبوات الفراولة بأنواع مختلفة من الأغشية، هى أغشية السيليلوز، والبولى بروبيلين المثقب وغير المثقب، والبولى فينيل

كلورايد، مع التخزين على حرارة ١٨°م لمدة ٤ أيام، ووجدوا أن التغليف فى البولى بروبيلين غير المثقب أحدث أكبر زيادة فى نسبة ثانى أكسيد الكربون وأكبر خفض فى نسبة الأكسجين داخل العبوات، وأن ثمار تلك العبوات كانت أعلى الثمار جودة، ولكن مظهرها لم يكن مرغوباً فيه بسبب التكتف الرطوبى. وبالمقارنة حدث انكماش - بسبب الفقد فى الوزن - عندما غلفت العبوات بالسيليلوز، بينما كانت أفضل الثمار مظهرًا هى التى غلفت عبواتها بالبولى بروبيلين المثقب والبولى فينيل كلورايد، ولكن الثمار التى غلفت بالبولى بروبيلين المثقب تدهورت جودتها سريعاً. وفى دراسة أخرى (Garcia & Olivas ١٩٩٨) خزنت الثمار على حرارة ٢°م لمدة ٣ أيام، ثم على حرارة ١٨°م، ووجد أن العبوات التى غلفت بالبولى فينيل كلورايد احتفظت بجودتها لمدة ٤ أيام على الأقل.

كما قام Nunes وآخرون (١٩٩٨) بدراسة تأثير تخزين ثمار الفواولة لمدة ٨ أيام على حرارة ١ أو ١٠°م، أو لمدة ٤ أيام على حرارة ٢٠°م، مع تغطية العبوات أو عدم تغطيتها بغشاء من البولى فينيل كلورايد على كل من الفقد الرطوبى والفقد فى حامض الأسكوربيك وقد وجدوا أن الفقد فى حامض الأسكوربيك كان منخفضاً ولم يختلف بين معاملتى التغطية أو عدم التغطية على حرارتى ١ و ١٠°م، ولكن الفقد كان أكبر كثيراً على حرارة ٢٠°م. وأدى التغليف إلى خفض الفقد فى حامض الأسكوربيك إلى الخمس على حرارة ١ و ١٠°م، وإلى النصف على حرارة ٢٠°م، علماً بأن ذلك التأثير لم يكن راجعاً إلى حدوث أى تغيرات فى مستوى الأكسجين أو ثانى أكسيد الكربون فى حالة التغليف لأن تلك التغيرات كانت محدودة للغاية؛ بما يعنى أن الفقد الرطوبى كان له تأثيراً أكبر على حامض الأسكوربيك عن درجة حرارة التخزين. وقد أدى التغليف مع التخزين على حرارة ١ أو ١٠°م إلى خفض الفقد فى حامض الأسكوربيك إلى ١٣,٣٪ فقط من الفقد الذى حدث عند عدم التغليف مع التخزين على ٢٠°م.

إمتصاص الإيثيلين المحيط بالثمار أثناء الشحن والتخزين

أدى استعمال المواد الممتصة للإيثيلين - وهى التى تتكون من الفحم المشبع بالبروم،

تكنولوجيا والتسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

أو من برمنجنات البوتاسيوم - إلى امتصاص الإثيلين، وربما إلى زيادة صلابة الثمار قليلاً، ولكنها لم تقلل من الإصابة بأعفان الثمار (عن Perkins-Veazie & Collins ١٩٩٥).

وبينما أدت إضافة الإثيلين بتركيز ٢٠ ميكروليتر/لتر إلى تحفيز نمو الفطريات والإسراع بشيخوخة الثمار، فإن إضافة المركبات الممتصة للإثيلين - مثل برمنجنات البوتاسيوم - أدت - عند تخزين الفراولة على ٢°م - إلى تقليل الأعفان والمحافظة على صلابة الثمار

وأدى تعريض ثمار الفراولة إلى تركيزات متناقصة من الإثيلين ما بين ١٠ و ٠,٠٠٥ ميكروليتر/لتر على ٢°م، وصفر°م إلى المحافظة على صفات الجودة لفترة أطول، وتقليل الإصابة بالأعفان، مع بقاء الثمار أكثر صلابة مما في الكنترول.

وعندما أضيفت برمنجنات البوتاسيوم للثمار المخزنة على ٢°م في ٧٪ ثاني أكسيد الكربون، كانت الثمار أكثر صلابة (عن Kim & Wills ١٩٩٨)

ولقد أوضحت دراسات Kim & Wills (١٩٩٨) أن إضافة ثاني أكسيد الكربون وبرمنجنات البوتاسيوم معاً أدت إلى نقص تركيز الإثيلين في الهواء أثناء التخزين، ونقص معدل تدهور الثمار. وكانت فترة احتفاظ الثمار بجودتها متناسبة عكسياً مع لوغاريتم تركيز الإثيلين، وطردياً مع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وقد أظهرت هذه الدراسة أهمية فعل التركيز العالي لثاني أكسيد الكربون في تثبيط إنتاج الإثيلين.

طرق الشحن

تنقل الفراولة المبردة أولاً بطريق البر إما إلى الدولة المستوردة مباشرة، وإما إلى المطار لأجل الشحن الجوي، وإما إلى الميناء لأجل الشحن البحري كذلك تنقل الفراولة بعد وصولها إلى ميناء الوصول بطريق البر إلى حيث تخزن مؤقتاً لحين تسويقها

الشحن البرى

يمكن شحن الفراولة بطريق البر، وتستخدم لأجل ذلك شاحنات ذاتية التبريد توضع فيها بالتات أو كراتين الفراولة (كل 4 كراتين فى حزمة)، حيث يستمر فيها التبريد بطريقة دفع الهواء من أسفل bottom air-delivery. كما يمكن استخدام الشاحنات المبردة - كذلك - فى نقل البالتات ذات الهواء المعدل، بهدف زيادة فترة احتفاظ الفراولة بجودتها لحين وصولها إلى المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاحنات المبردة ليست وسيلة لتبريد الفراولة وإنما للمحافظة على برودتها فقط، لذا .. يتعين تبريد الشاحنة إلى درجة الصفر المئوى قبل تحميلها بالمحصول الذى يكون قد سبق تبريده - كذلك - إلى درجة الصفر. كما يتعين الاهتمام بكفاءة العزل فى الشاحنة، وسلامة الأبواب، وكفاءة وحدة التبريد، ونظام تقليب الهواء ومساراته.

تضر الاهتزازات التى تتعرض لها الشاحنات أثناء تحركها كثيراً بشمار الفراولة، ويكون الضرر أقل ما يمكن فى مقدمة الشاحنة وفى منتصفها؛ ولذا .. يتعين عندما لا تكون الشاحنة ممتلئة بالمحصول، أو عندما تستخدم فى نقل أكثر من محصول، أن يخصص الجزء الأمامى منها للفراولة.

وقد أوضحت عديد من الدراسات أن جدر الشاحنة يمكن أن تسخن كثيراً أثناء النقل من جراء تعرضها لأشعة الشمس، وأن جزءاً من تلك الحرارة تنتقل للثمار القريبة من الجدر؛ لذا .. يفضل ترك فراغ بين كراتين أو بالتات الفراولة والجدر الداخلية للشاحنة، مع تجنب رص الكراتين بجوار جدر الشاحنة التى تكون مواجهة لأشعة الشمس القوية خلال معظم الطريق.

ويجب ضبط منظم الحرارة بالشاحنة على 1°C بحيث لا تتعرض الثمار للتجمد إذا كانت دقة المنظم فى حدود $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ، حيث يكون أقصى انخفاض للحرارة فى هذه الحالة هو -0.5°C وهى درجة أعلى من أعلى درجة ممكنة لتجمد الفراولة، وهى -0.8°C (عن Mitchell وآخرين ١٩٩٦).

الشحن الجوي ووسائل المحافظة على سلسلة التبريد

تنقل الفراولة المبردة أوليًا إلى المطار - لأجل شحنها بطريق الجو - فى شاحنات مبردة صغيرة يجب تبريد الشاحنات جيدًا قبل تحميلها، كما يجب حفظ الثمار مبردة خلال فترة انتظارها قبل تحميلها على الطائرات وتراعى خلال مرحلة النقل البرى إلى المطار الاحتياطات التى سبقت مناقشتها تحت موضوع الشحن البرى.

ويراعى نقل الفراولة إلى المطار فى مساء نفس يوم الحصاد، علمًا بأن الطائرات تقلع عادة فى الصباح المبكر من اليوم التالى. وفى محطة الوصول يراعى - كذلك - سرعة نقل الفراولة إلى مكان مبرد بمجرد الانتهاء من إجراءات الجمارك.

ونظرًا لأن الفراولة المبردة لا يستمر تبريدها أثناء تواجدها على متن الطائرات وحتى وقت استلامها من قبل الجهة المستوردة؛ الأمر الذى يؤدى إلى قطع سلسلة التبريد. لذا فإن من الضرورى المحافظة على سلسلة التبريد بكل الوسائل المتاحة

ومن أهم وسائل المحافظة على سلسلة التبريد أثناء الشحن الجوى، ما يلى:

(استعمال إيزو كونيترز)

إن ال إى كونيترز E-Containers عبارة عن صناديق كبيرة تتكون من كرتون معرج ذات قدرة على تحمل الضغط حتى حوالى ٢٠ كجم/سم^٢ وتجرى عملية وضع كراتين الفراولة - المعبأة والمبردة - فى داخل هذه الصناديق فى حجرات التخزين المبردة.

تبلغ الأبعاد الداخلية لك E-containers ٩٢,٥ سم طولاً × ٦٨,٥ سم عرضاً × ٦٤,٥ سم ارتفاعاً. أما الأبعاد الخارجية فهى ٩٥,٥ سم × ٧١,٥ سم × ٦٧,٥ سم، ويعنى ذلك أن سمك جميع جدرانها يبلغ ٣ سم، كما يكون غطاؤها وقاعدتها بالسلك ذاته ويرجع ذلك إلى أن ال E-containers تغطى من جميع الجوانب بطبقة مزدوجة من الاستيروفوم يبلغ سمكها ٣٠ سم

يتسع كل E-container لحوالى ٤٠ كرتونة فراولة بكل منها ٢ كجم من الثمار، ويوضع معها حوالى ٤-٦ أكياس جل gel packs للمحافظة على بقاء الثمار المبردة باردة

وتغطى الـ E-containers أحياناً من الخارج بطبقة من رقائق الألومنيوم aluminum foil لعكس الحرارة، ولكن ذلك ليس شرطاً ضرورياً

يجب شحن الـ E-containers المعبأة إلى المطار فى شاحنة مبردة على درجة الصفر المئوى، مع ضرورة تقليص الفترة التى تمر بين تفريغ الـ E-containers من الشاحنات وتحميلها على الطائرة إلى أقل حد ممكن، وكذلك عدم رفع غطاء الـ E-containers من عليها، وإلا انتفى الغرض من استعمالها.

استعمال عبوات الجل

إن عبوات الجل gel packs عبارة عن جل مجمد فى أكياس بلاستيكية، وهى توضع داخل الـ E-containers للمحافظة على برودتها أثناء النقل. ويجب استعمال عبوات الجل بمعدل ١ كجم من المادة الرطبة المجمدة لكل ١٠ كجم من الثمار. ويعنى ذلك أن كل E-containers يحتوى على ٤٠ كرتونة فراولة (٨٠ كجم فراولة) يلزمه حوالى ٨ كجم من الجل باك المجمد، أى حوالى ٨ أكياس من تلك التى تبلغ أبعادها ٢٠ × ١٥ × ٢,٥ سم.

تتوفر الـ gel packs فى صورة تحضيرات تجارية سابقة التجهيز ومعبأة فى أكياس بلاستيكية قوية ومثقبة بثقوب دقيقة لكى تسمح بامتصاص الرطوبة.

هذا .. ويبلغ الوزن الجاف لمادة الـ gel packs فى العبوة الواحدة حوالى ١٨ جم. أما وزنها بعد اكتمال ترطيبها فإنه يختلف باختلاف المادة المستعملة بين ٦٥٠، و ١١٠٠ جم.

ومن أكثر أنواع المواد الخام استعمالاً فى عمل الـ gel packs: كربوكسى مثيل سيليلوز carboxymethyl cellulose (اختصاراً CMC) ونشا الذرة النقى.

ومن بين المصـاـطـر الـتي يـمـكـن العـصـول مـمـا عـلى gel packs ما يلي،
Tekpak Inc , NY, USA.
Peabody, Montana, USA.
Midlands Chemical Co , Omaha, NE, USA.
Topa Co., The Netherlands.

استعمال الإنفروتينرز

إن الإنفروتينرز Envirotainers عبارة عن LD-3 containers ذات جدار عازلة للحرارة توفرها الخطوط الجوية لمن يرغب في الشحن البارد. يتسع كل Envirotainer لحوالي ٣٠٠ كرتونة فراولة، ويحافظ على الحرارة منخفضة بداخلها إما بواسطة التبريد الميكانيكي، وإما بواسطة الثلج الجاف أو الـ gel packs.

ويعد التبريد الميكانيكي أكفأ وسائل التبريد، ولكنه مكلف، ويزيد من تكاليف الشحن بسبب الوزن الزائد لوحدة التبريد. ولا يوصى باستعمال الثلج الجاف لأن طبقة الثمار المجاورة لمكان وضع الثلج الجاف قد تتجمد من شدة انخفاض درجة الحرارة حولها وبذا . فإن استعمال الـ gel packs يعد أنسب الوسائل المتاحة حالياً للمحافظة على برودة الـ Envirotainers.

يفضل نقل الـ Envirotainers إلى مكان التعبئة وتحميلها بالفراولة المعبأة والمبردة أولاً، ثم إضافة الـ gel packs بمعدل كيلوجرام واحد منها (من المادة الرطبة) لكل ١٠ كجم من الثمار. ويمكن استعمال بلوكات أو شرائح من البوليسترين لتثبيت كراتين الفراولة في مكانها داخل الـ envirotainers وإذا تطلبت إجراءات الطيران فتح الـ envirotainers وفحصها قبل تحميلها على الطائرات فإنه يتعين إجراء ذلك داخل حجرات مبردة للمحافظة على سلسلة التبريد.

استعمال الأغشية الحرارية

تستعمل الأغشية الحرارية thermal blankets إما في تغطية الـ E-containers من

الفراولة – السابغ – الفراولة

الخارج، وإما فى تبطين الـ enviroainers من الداخل، وذلك كعازل حرارى، وهى تصنع من مادة إسفنجية عازلة للحرارة مغطاة بغطاء عاكس للحرارة. ويمكن للأغطية الحرارية أن تحافظ على حرارة 3°م داخل العبوات لمدة تصل إلى 36 ساعة. كذلك يمكن تغليف بالثبات للفراولة ذاتها بالأغطية الحرارية، ويلزم فى هذه الحالة تخزينها جيداً مع البالطة.

ومن بين الشركات التى تقوم بتصنيع وبيع الأغطية الحرارية شركة:

IFC, Pomona, CA, USA.

**ومن أهم وسائل مراقبة درجة الحرارة أثناء الشحن الجوى، ما يلى،
(استعمال أجهزة لتسجيل درجة الحرارة)**

يفضل دائماً تسجيل التغيرات فى درجة الحرارة داخل الـ E-containers، والـ Envirotainers سواء أستخدمت معها الأغطية الحرارية، أم لم تستخدم، وذلك لأجل الحصول على سجل لدرجة الحرارة من لحظة الشحن إلى لحظة الاستلام، وهو أمر ذات أهمية كبيرة فى حالات تأخر الشحن وعند وصول الشحنة بحالة غير مرضية للمستورد، كما أنه أصبح أحد متطلبات المشترين الأوروبيين ضمن النظام المعروف باسم HACCP (أو hazard analysis critical control point).

ومن بين المصادر التى يمكن الحصول منها على أجهزة التسجيل الصغيرة لدرجة الحرارة، ما يلى.

Ryan Instruments, Redmond, Washington, USA.

Cox Recorders, Upland, CA, USA.

(استعمال بطاقات اللون الحرارى والتخزينى)

تتوفر بالأسواق بطاقات خاصة توضع على العبوات من الخارج لتبين مدى التعرض لدرجة الحرارة غير المناسبة ومدة التعرض لها، وما إذا كان ذلك التعرض فى الحدود الآمنة أم أنه تخطاها، وذلك خلال فترتى الشحن والتخزين التالى للاستلام توجد على البطاقات نقط تتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر إذا ما زادت شدة الحرارة ومدة التعرض لها عن الحدود الآمنة أثناء الشحن والتخزين التالى له.

وتتوفر هذه البطاقات لدى شركة:

Cox Recorders, Upland, CA, USA.

الشحن البحرى

يتطلب الشحن البحرى الالتزام بما يلى:

- ١- استعمال منتج عال الجودة مبرد أولياً بشكل جيد، وتم تداوله بكفاءة عالية
- ٢- استعمال بالقات ذات جو هوائى معدل.
- ٣- التحميل فى المزرعة فى حاويات مبردة refer containers سبق تبريدها إلى الصفر المئوى
- ٤- نقل الحاويات المبردة على الشاحنات إلى الميناء البحرى، ثم إلى السفينة التى تنقلها إلى ميناء الوصول.
- ٥- نقل الحاويات المبردة على شاحنات أخرى بطريق البر إلى موقع التخزين المؤقت لدى الجهة المستوردة

ويعنى ذلك أن سلسلة التبريد لا تقطع أبداً ما دامت أجهزة التبريد التى توجد بالحاويات تعمل بكفاءة وكما فى حالة الشحن البرى . فإن أجهزة التبريد فى الحاويات المبردة يجب أن تضبط على 1°C حتى يكون المدى الحرارى داخل الحاوية بين -0.5°C و 2.5°C وذلك بافتراض أن دقة المنظم تبلغ $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ، وأن أقل درجة ممكنة لتجمد ثمار الفراولة هى -0.8°C .

ومن الطبيعى أن الشحن البحرى يتطلب حجم إنتاج يتناسب مع حجم الحاويات المستخدمة، ومواعيد لإقلاع البواخر تتناسب مع نظام الحصاد اليومى لحقول الفراولة

التصدير

مواسم وأسواق التصدير

تصدر الفراولة إلى الأسواق الأوروبية من نوفمبر إلى نهاية يناير، وربما إلى نهاية شهر فبراير، ويتوقف ذلك على مدى وفرة الإنتاج الإspanى المبكر.

الفصل السابع - الفراولة

ويُعد تصدير الفراولة إلى الدول الأوروبية أكثر ربحية من تصديرها إلى الدول العربية، إلا أن الأسواق العربية تستقبل حوالى ٧٠٪ من إجمالى كميات الفراولة المصدرة من مصر، وتستقبل الأسواق الأوروبية معظم الكميات المتبقية. وأكثر الدول المستوردة للفراولة المصرية - مرتبة تنازلياً - هى: المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، والمملكة المتحدة. وبينما يتراجع التصدير إلى الدول الأوروبية بداية من شهر فبراير - ونادراً ما يمتد بعد مارس - فإن التصدير إلى الدول العربية يستمر على امتداد موسم إنتاج الفراولة بداية من شهر نوفمبر، ولا يتراجع التصدير إليها إلا فى شهر مايو - وتعد سنغافورة هى الدولة غير العربية وغير الأوروبية الوحيدة التى تصدر إليها كميات ملموسة من الفراولة

رتب الفراولة المصدرة

يتم تدرج محصول الفراولة إلى أربع رتب على أساس أكبر قطر للثمرة (وهو القطر الذى يصنع زاوية قائمة مع الخط الواصل بين عنق الثمرة وقمتها)، كما يلى:

الدرجة	أقل قطر (مم)
إكسترا Extra	٢٥
الأولى I والثانية II	٢٢
الثالثة III	١٥

تتطلب معظم سلاسل السوبر ماركت الأوروبية أن يتراوح وزن ثمرة الفراولة بين ٢٠، و ٣٠ جم، أى حوالى ١٢-٨ ثمرة فى كل بنت سعة ٢٥٠ جم. وعادة .. توجه ثمار الرتبة الثالثة إلى السوق المحلية.

بيانات الكراتين

يتعين ذكر بيانات محددة على الكراتين المستعملة فى تصدير الفراولة، تتضمن: اسم

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

المنتج، واسم وعنوان المصدر، والاسم التجاري، واسم دولة المنشأ، ورتبة المنتج المصدر، والوزن الصافي، ودرجة الحرارة الموصى بها وهي صفر إلى ١°م

ويجب أن تكون جميع العبوات المستخدمة في التصدير جيدة المظهر ومصنوعة من مواد قابلة لإعادة التصنيع

مواصفات فراولة التصدير

ينبغي أن تتوفر في الفراولة المصدرة الصفات التالية:

١- يجب أن تكون الثمار خالية من جميع الأضرار المرضية والحشرية، وتلك التي ترجع إلى أسباب جوية أو فيزيائية.

٢- يجب أن تكون الثمار خالية تمامًا من التلوث بالتربة أو بأى مواد غريبة

٣- يجب أن تكون الثمار خالية من أى رائحة غريبة أو طعم غير مقبول

٤- لا يجب حصاد الثمار أثناء هطول الأمطار أو بعد ذلك مباشرة، حيث يجب أن

تكون الثمار خالية من الرطوبة الحرة وقت حصادها، كما لا يجب غسل الثمار بالماء

٥- يجب أن يكون عتق الثمرة بطول ٠,٥-١,٠ سم.

٦- يجب أن تكون أوراق كأس الثمرة طازجة وخضراء اللون وغير ذابلة أو مصابة

بالأمراض أو ملوثة بأى مواد غريبة.

٧- يجب أن تكون الثمار لامعة وطازجة، وبدون أكتاف أو قمة خضراء أو بيضاء،

وأن تكون محتفظة بروبقها، ولا يوجد بها أية أعقان أو تدهور من أى نوع.

٨- يجب أن تكون الثمار فى درجة مناسبة من النضج، وهى الدرجة التى تسمح

بتداولها، وشحنها، ووصولها إلى الأسواق بحالة جيدة.

٩- يفضل لون الثمار الأحمر البراق المتجانس، أو الأحمر البرتقالى المتجانس على كل

سطح الثمرة. ويدل اللون الشاحب أو اللون الأحمر القاتم على زيادة نضج الثمرة، وهو أمر غير مقبول كذلك لا تقبل الأكتاف البيضاء، وقمة الثمار البيضاء، إلا إذا كانت المساحة البيضاء تقل عن ١٠٪ من سطح الثمرة كما لا يجب أن تزيد أى اختلافات فى

اللون عن ١٠٪ من سطح الثمرة أما القمة الخضراء green tip التي تظهر في ثمار بعض الأصناف - مثل روزالندا - تحت ظروف بيئية معينة فإنها غير مقبولة. كذلك لا يعد اللون الداخلى الأبيض للثمار مقبولا.

١٠- يفضل شكل الثمرة المخروطى، ويجب أن يكون شكل الثمار متجانس فى العبوة الواحدة، ومطابقاً لشكل ثمرة الصنف. ويجب أن تكون الاختلافات فى الشكل فى العبوة الواحدة فى حدود الاختلافات الطبيعية لشكل ثمار الصنف، وألا تتعدى الثمار المخالفة فى الشكل نسبة ١٠٪ من ثمار العبوة بالعدد أو بالوزن.

١١- يجب ألا يزيد الفرق فى القطر بين أصغر الثمار وأكبرها حجماً فى البنت الواحدة عن ١٠ ملليمترات.

١٢- يفضل طعم الثمار الجيد، وعادة يقل سعر الأصناف الفقيرة الطعم - مثل سلفا - عن سعر الأصناف الجيدة الطعم بنحو ٢٠٪-٣٠٪.

١٣- يحسن ألا تقل نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية فى الثمار عن ٧٪، ويفضل أن تتراوح بين ٨٪ و ٩٪.

١٤- يوصى بآلا تزيد الحموضة المعاييرة عن ٠,٨٪ كحد أقصى.

وقد تمكن Hetzroni وآخرون (١٩٩٤) من تطوير آلة إلكترونية يمكنها رصد المركبات المتطايرة التى تنطلق من ثمار الفراولة والاستجابة لها فى أقل من ثانية واحدة، وهى بذلك يمكن أن تستخدم فى مرحلة الفرز بعد الحصاد للتعرف على درجة نضج الثمار وجودتها، وكذلك استعمالها أثناء الفحص عند إجراء اختبارات التحكم فى الجودة لرسائل الفراولة المصدرة.

الفصل الثامن

الفاصوليا

النضج

أولاً: محصول القرون الخضراء

صفات الجودة

إن من أهم الصفات التي تقاس بها جودة محصول القرون الخضراء، ما يلي:

- ١- نسبة وزن البذور.
- ٢- الصلابة *firmness*.
- ٣- المقاومة للقطع *resistence to shear*.
- ٤- اللون.
- ٥- النضارة.
- ٦- نسبة الألياف.
- ٧- نسبة المواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول.
- ٨- نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية.
- ٩- نسبة فيتامين ج.
- ١٠- الحموضة الكلية المعيرة.

هذا .. وتزداد نسبة المواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول، والمواد الصلبة الكلية في القرون مع تقدمها في النمو، بينما تنخفض نسبة الرطوبة والمحتوى الكلوروفيلي (Martinez وآخرون ١٩٩٥).

موعد الحصاد

تكون حقول الفاصوليا الخضراء عادة جاهزة للحصاد بعد نحو ٥٠-٦٠ يوماً من

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الزراعة بالنسبة للأصناف القصيرة، وبعد ذلك بنحو ١٠ أيام أخرى بالنسبة للأصناف الطويلة التي يستمر فيها الحصاد لفترة طويلة. وتكون بداية الحصاد عادة بعد نحو ١٢-١٤ يوماً من تفتح الأزهار الأولى على النبات، علماً بأنه يلزم في المتوسط نحو ٧-١٠ أيام من التلقيح لحين وصول القرون إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد.

علامات النضج للحصاد

يكون حصاد محصول القرون الخضراء على أساس قطر القرون، وليس طولها. هذا وتختلف أقطار القرون بكل فئة من فئات الفاصوليا الخضراء، وهي الفائقة الرفع، والرفيعة جداً، والرفيعة، والبوبي، والرومانو، والمنجوتو.

وفي معظم دول العالم المتقدمة زراعياً يتم حصاد القرون الخضراء البوبى آلياً، ويكون ذلك قبل اكتمال نمو القرون، وقبل أن تكبر البذور إلى الدرجة التي تؤدي إلى إنتفاخ مواضع البذور في القرن كما في حالة الحصاد اليدوي. وتعتبر مرحلة النمو التي تصل فيها البذور إلى ربع حجمها الطبيعي هي أفضل مرحلة للحصاد الآلي. وإذا تركت القرون بدون حصاد بعد بلوغها هذه المرحلة .. فإنها تكبر وتتليف وتقل نوعيتها بدرجة كبيرة، ويكون ذلك مصاحباً بزيادة كبيرة في المحصول تبلغ حوالى ربع طن أو أكثر يومياً وتكون الزيادة اليومية في حجم القرون أكبر بكثير في الجو الدافئ عما في الجو البارد. ونظراً للتباين في موعد تفتح الأزهار في الحقل فمن المحتم ظهور تباين كبير في حجم القرون عند الحصاد ويعد أفضل موعد لإجراء الحصاد هو عندما يمكن الحصول على أكبر كمية، وأعلى نسبة من المحصول ذي الجودة العالية (Thompson & Kelly ١٩٥٧، و Lorenz & Maynard ١٩٨٠).

ويمكن تحديد الموعد المناسب للحصاد الآلي بتقدير نسبة البذور، ونسبة الألياف في القرون، وتتميز هذه الطريقة بدقتها إلا أنها لا تتبع عادة. والطريقة المتبعة لذلك - في الولايات المتحدة - هي بتدريج القرون حسب قطرها، وهي ما تعرف بطريقة sieve size نظراً لاعتمادها على ما إذا كانت القرون يمكن أن تنفذ أو لا تنفذ من

الفصل الثامن - الفاصوليا

مناخل ذات ثقب معلومة الأقطار وتدرج الفاصوليا تبعاً لهذه الطريقة إلى الدرجات المبينة في جدول (٨-١). ويلاحظ من الجدول أن قطر القرن يختلف في الدرجة الواحدة فيما بين الأصناف ذات القرون المستديرة المقطع، والأصناف ذات القرون المبططة. ويرغم أن المستهلك يربط بين القرون الصغيرة والنوعية الجيدة، إلا أن الأصناف ذات القرون الكبيرة بطبيعتها تكون نوعيتها جيدة حتى إذا كانت من قياس (sieve size) ٥، أو ٦.

جدول (٨-١): تدرج الفاصوليا الخضراء حسب معة ثقب المناخل التي يمكن أن تنفذ منها القرون (sieve size).

القياس (أو sieve size)		قطر القرن (٦٤/ من البوصة)	
		القرن المستديرة	القرن المبططة
١	(U. S. No. 1)	أقل من ١٤,٥	—
٢	(U. S. No. 1)	١٤,٥ إلى أقل من ١٨,٥	أقل من ١٤,٥
٣	(U. S. No. 1)	١٨,٥ إلى أقل من ٢١,٥	١٤,٥ إلى أقل من ١٨,٥
٤	(U. S. No. 1)	٢١,٥ إلى أقل من ٢٤,٥	١٨,٥ إلى أقل من ٢١,٥
٥	(U. S. No. 2)	٢٤,٥ إلى أقل من ٢٧,٥	٢١,٥ إلى أقل من ٢٤,٥
٦	(U. S. No. 2)	٢٧,٥ فأكثر	٢٤,٥ فأكثر

وتتخذ نسبة القرون من قياس ٤ أو أقل إلى القرون الأكبر من ذلك كأساس لتحديد الموعد المناسب للحصاد الآلى. ويجرى الحصاد عادة عندما تكون النسبة ٧٠ : ٣٠، أو ٦٥ : ٣٥، أو ٦٠ : ٤٠، ويجرى أحياناً عندما تكون النسبة ٥٠ : ٥٠. وتتبع النسب الواسعة، مثل: ٧٠ : ٣٠، و ٦٥ : ٣٥ مع الأصناف ذات القرون الرفيعة، والنسب الضيقة مع الأصناف ذات القرون الكبيرة بطبيعتها كما تتبع النسب الواسعة فى الجو الحار الذى تزداد فيه نسبة الألياف فى القرون التى من قياسى ٥، و ٦ (Sandsted ١٩٦٦).

ثانياً: محصول البذور الخضراء

إن من أهم علامات النضج لأجل الحصاد الآلى (مرة واحدة) فى أصناف الفاصوليا التى تؤكل فيها البذور الخضراء green-shelled beans ظهور أول قرن جاف على النبات، فحينئذ يمكن إجراء الحصاد بأمان مع الحصول على حوالى ٨٥٪ من محصول القرون الكلى المتوقع. ويؤدى تأخير الحصاد عن هذا الموعد إلى زيادة محصول القرون الكلى حتى يصل إلى ١٠٠٪ من المحصول المتوقع بعد نحو ٦٥-٧٠ يوماً من الزراعة، ولكن يصاحب ذلك ظهور نسبة عالية من القرون الصفراء، والجافة غير المرغوب فيها (Román-Hernández & Beaver ١٩٩٦).

الحصاد

أولاً: محصول القرون الخضراء

يتراوح محصول الفدان من القرون الخضراء بين ٣، و٧ أطنان للفدان، ويتوقف ذلك على الصنف وميعاد الزراعة.

وبينما يجرى الحصاد الآلى مرة واحدة، فإن الحصاد اليدوى قد يستغرق من ١٥ يوماً فى الأصناف البوبى والرومانو فى الجو الدافئ إلى نحو ستة أسابيع عندما يكون الجو معتدلاً أو مائلاً للبرودة. وخاصة فى الأصناف الفائقة الرفع والرفيعة التى يؤدى استمرار حصاد قرونها وهى صغيرة إلى استمرارها فى النمو والإنتاج لفترة طويلة هذا. بينما قد يستمر الحصاد فى الأصناف المتسلقة لمدة ثلاثة أشهر.

لا تزيد - عادة - كمية المحصول من القرون الفائقة الرفع التى يمكن لعامل متمرس على عملية الحصاد جمعها عن ١٥ كجم فى اليوم، ولذا .. يتعين توفر عدد كافٍ من العمال خلال موسم الحصاد. ويلزم عادة حوالى ٦ عمال لحصاد الفدان الواحد يومياً طوال موسم الحصاد الذى يستمر حوالى ٢٥ يوماً، أى أن محصولاً إجمالياً قدرة ٣٦٠٠ كجم/فدان سوف يتطلب ١٢٠ عاملاً على امتداد فترة الحصاد

الفصل الثامن

إن من أهم الأمور التي يتعين مراعاتها عند الحصاد، ما يلي:

١- إجراء الحصاد في الصباح الباكر بعد زوال الندى، أو في المساء، والهدف من ذلك هو أن تكون درجة حرارة القرون منخفضة نسبياً عند الحصاد، فلا يكون معدل التنفس فيها شديد الارتفاع، وذلك إلى حين تبريدها، كما يعمل الحصاد بعد زوال الندى على تجنب انتشار الأمراض.

٢- الحصاد كل يوم إلى يومين في الأصناف الفائقة الرفع، وكل يومين إلى ثلاثة أيام في الأصناف الرفيعة، وكل ثلاثة إلى سبعة أيام في الأصناف البوبى، وتكون الفترة الأقصر - من كل فئة صنفية - في الجو الحار (٢٥-٣٠°م)، والفترة الأطول في الجو المعتدل (١٨-٢٠°م)، والهدف من ذلك هو تجنب زيادة حجم القرون عما ينبغي للصنف، علماً بأن معدل نموها يكون أسرع في الجو الحار عما في الجو البارد. وتجدر الإشارة إلى أن إطالة الفترة بين الجمعات عن الحدود المبينة أعلاه تعنى زيادة نسبة المحصول من الفئات ذات القرون الأسك، مع زيادة احتمالات تليف القرون وزيادة طولها عما ينبغي للصنف.

٣- جمع القرون بجزء من العنق.

٤- لا يحتفظ بالقرون التي يتم حصادها في اليدين، ولا يتم الضغط عليها، وإنما توضع مباشرة في عبوات القطف.

٥- عدم وضع أى قرون غير صالحة للتسويق في عبوات القطف.

٦- عدم حصاد أى قرون صغيرة أكثر مما ينبغي، وحصاد جميع القرون الصالحة للحصاد بالنبات قبل الانتقال إلى نبات جديد.

٧- نقل المحصول من عبوات القطف إلى عبوات الحقل بلطف حتى لا تجرح القرون، وتفضل أن تكون عبوات الحقل سعة ٥ كجم فقط.

٨- نقل عبوات الحقل سريعاً إلى محطة التعبئة، مع مراعاة تغطيتها أثناء تجميعها ونقلها لتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، حتى لا ترتفع حرارتها ويزداد فيها معدل التنفس الطبيعي، ولخفض فقدانها للرطوبة.

نقص الآلى

لا يجرى الحصاد الآلى إلا مع الأصناف المناسبة لذلك، التى تتميز بالعقد المركز خلال فترة زمنية قصيرة، وسهولة فصل القرون من النبات بآلة الحصاد. وتتراوح سرعة الحصاد الآلى - عادة - من ثلاثة أرباع فدان إلى فدان واحد فى الساعة ويعاب على الحصاد الآلى أنه يحدث أضراراً كثيرة بجميع قرون النبات؛ مما يؤدى إلى زيادة سرعة فقدما للرطوبة (Hoffman ١٩٧١).

وقد جرت محاولات لإسقاط أوراق النباتات قبل الحصاد برشها بالإيثيفون، بتركيزات تراوحت بين ٢٥٠ و ٤٠٠ جزء فى المليون وبرغم أن المعاملة أسقطت نسبة كبيرة من الأوراق إلا أنها تسببت أيضاً فى نقص المحصول واصفرار بعض القرون، وسقوط بعضها وقد كان الضرر أقل عند استعمال التركيزات المنخفضة، وعند تأخير المعاملة حتى قبل الحصاد بفترة قصيرة، كما كانت المعاملة أكثر فاعلية صيفاً عنها فى الخريف (Palevitch ١٩٧٠).

تقوم آلة الحصاد بتجريد النبات من جميع القرون والأوراق، ولا تبقى إلا على السيقان، ويتم فصل القرون عن مختلف الأجزاء النباتية المختلطة بها أثناء المرور على أجزاء مختلفة من الآلة وعلى الرغم من ذلك فإن المحصول الذى يصل إلى محطة التعبئة يكون مليئاً بشتى أنواع القرون غير الصالحة للاستهلاك، ذلك لأن آلة الحصاد لا يمكنها التمييز بين القرون الجيدة والقرون غير الصالحة، فضلاً عما يكون مختلطاً بالقرون من أجزاء السيقان. ولذا.. فإن الأمر يتطلب إجراء فرز لجميع القرون فى محطة التعبئة، وهو أمر مكلف، بالإضافة إلى أن هذه العملية الإضافية تعنى مزيداً من التداول للقرون التى تكون أصلاً مثخنة بالجروح من جراء عملية الحصاد الآلى

إن الحصاد الآلى للفاصوليا يتسبب فى إحداث جروح كثيرة بالقرون، الأمر الذى يؤدى إلى سرعة تلفها، ويجعل عملية الحصاد الآلى غير مناسبة لأجل الاستهلاك الطازج وقد وجد أن معاملة القرون بالـ sodium dehydroacetate يؤخر التغيرات

اللونية في القرون التي تنتج من عملية الحصاد الآلى. ولكن إلى جانب التجريح فإن المحصول يبقى فى الحقل لمدة تصل إلى خمس ساعات إلى حين امتلاء سيارات الفقل (الذاتية التفريغ) التي يكون أبعادها - عادة $2,2 \times 2,0 \times 1,0$ م، مع تأخير يصل إلى ساعتين لحين التفريغ عند محطة التعبئة. ومع الخطوات الكثيرة التي تمر عليها القرون فى محطة التعبئة، وما يعقب ذلك من نقل إلى أسواق الجملة فى مدة تصل إلى ١٢-٢٤ ساعة على حرارة ٣-٦°م، وبقاء المحصول فيها على نفس المدى الحرارى لمدة يوم إلى ثلاثة أيام قبل نقله إلى أسواق البيع حيث يبقى فيها على حرارة ٥°م - وربما فى حرارة الغرفة - لحين بيعه فى خلال ٣-٤ أيام، أو عرضه للبيع السريع بأسعار منخفضة .. كل ذلك يجعل قرون الفاصوليا الخضراء فى حالة سيئة قبل أن تصل إلى يد المستهلك، وأوضح علامات التدهور تكون: الذبول وفقدان النضارة، وبهتان اللون، والتغيرات اللونية، كما أن محتوى القرون من حامض الأسكوربيك (فيتامين ج) ينخفض بانتظام من بعد الحصاد حتى الاستهلاك (Shewfelt وآخرون ١٩٨٦).

وباختصار .. فإن آلة حصاد الفاصوليا يمكن أن تقوم بعمل ١٠٠ عامل بالإضافة إلى ملاحظيهم، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الحصاد، ولكن مع حدوث بعض الانخفاض فى الجودة. وتصلح كثير من الأصناف للحصاد الآلى، وهى تتميز بالنضج المبكر وتحمّل القرون لمختلف مراحل الحصاد الآلى. تقوم تلك الآلات - وهى قد تكون بقدرة خط واحد أو عدة خطوط - بتجريد النباتات من القرون والأوراق تاركة وراءها السيقان فقط. وعلى ذلك مرور القرون وما يختلط بها من أوراق ومخلفات نباتية على عدة مراحل لأجل فصل القرون وحدها. وعلى ذلك - فى محطة التعبئة - فصل القرون الصغيرة جداً أو الزائدة النضج والمصابة بالأمراض يدوياً (Boyette وآخرون ١٩٩٤).

ثانياً: محصول البذور الخضراء

عند حصاد الفاصوليا التي تزرع لأجل بذورها الخضراء، فإن القرون تترك حتى يكتمل حجمها، ويكتمل تكوين بذورها، وتحصد قبل أن يبدأ جفاف القرون أو البذور.

ثالثاً: محصول البذور الجافة

لا تزرع لأجل البذور الجافة سوى أصناف الفاصوليا القصيرة. يجرى الحصاد بعد جفاف أغلب القرون وقبل انشطار القرون السفلى، ويتم بقطع النباتات من تحت سطح التربة إما يدوياً أو آلياً، على أن يكون ذلك في الصباح الباكر أثناء وجود الندى على النباتات لتقليل انتشار البذور. وقد تترك النباتات في مكانها معرضة للشمس والهواء حتى تجف أو تنقل إلى أماكن خاصة لذلك وأنسب موعد لقطع النباتات هو عندما تتراوح نسبة الرطوبة في البذور من ١٦٪-٢٠٪ (Hawthorn & Pollard ١٩٥٤).

ويفيد التخلص من أوراق النبات في تسهيل إجراء عملية الحصاد الآلى، ويستخدم لذلك بعض التحضيرات، مثل Shed-A-Leaf الذى تعامل به النباتات، بمعدل ٨ لترات في ٦٠-١٢٠ لتر ماء للقدان. وأنسب موعد للمعاملة هو عندما يبدأ تغير لون الأوراق السفلى. وتتميز هذه المرحلة بأن فترات بذور الأصناف ذات البذور البيضاء تصبح عاجية اللون، وأن ٨٠٪-٩٠٪ من بذور الأصناف من مجموعة الرد كدنى Red Kidney تصبح حمراء اللون ولا تفقد المعاملة إذا كانت الحرارة السائدة أقل من ١٦°م، أو إذا كان من المتوقع مطول أمطار فى خلال ست ساعات من المعاملة (Minges وآخرون ١٩٧١).

ومن المركبات الأخرى التى استخدمت لهذا الغرض .. مركب الإثيفون، وقد استخدم بتركيز ٦٠ جزءاً فى المليون قبل موعد الحصاد الطبيعى - للصنف كاليفورنيا رد لايت California Red Light بأسبوع واحد. وأدت هذه المعاملة إلى إسقاط نحو ٩٠٪ من أوراق النبات دون أن تؤثر على المحصول. ولكن إجراءها مبكراً قبل موعد الحصاد الطبيعى - بخمسة وعشرين يوماً - أدى إلى نقص المحصول بنسبة ٢٥٪، كما لم تكن المعاملة فعالة عندما أجريت فى حرارة ١٠°م حتى مع رفع التركيز المستعمل إلى ٢٣٥ جزءاً فى المليون.

واستخدمت كذلك - لأجل إسقاط أوراق النباتات قبل الحصاد - بعض مبيدات الحشائش، مثل الداينوسب Dinoseb، والإندوثال Endothal، والديكوات Diquat وتحرى المعاملة بهذه المركبات بعد نضج معظم البذور، وبعد آخر رية بفترة كافية على

الفصل الثامن - الفاصوليا

أن يكون الحصاد بعد الرش بنحو ٥-١٠ أيام ويؤدي الرش قبل الحصاد بفترة طويلة إلى انتشار بعض البذور، كما قد يؤدي الرش عند وجود نسبة عالية من الرطوبة في القربة إلى ظهور نموات خضرية جديدة قبل الحصاد (Whitesides ١٩٨١).

التنفس وإنتاج الإثيلين

يتباين معدل تنفس قرون الفاصوليا حسب كلا من درجة الحرارة وطراز الفاصوليا، كما يلي:

معدل التنفس (بالمليتر ثاني أكسيد كربون/كجم في الساعة) في كل من	الفاصوليا الخضراء الطويلة الرفيعة	الفاصوليا الخضراء العادية	الحرارة (°م)
	٢٠	١٠	منفر
	٢٣	١٧	٥
	٤٦	٢٩	١٠
	١٠١	٤٦	١٥
	١١٠	٦٥	٢٠

وتنتج قرون الفاصوليا الخضراء الإثيلين بمعدل ٠,٠٥ ميكروليتر/كجم في الساعة على ٥°م.

ويؤدي تعرض القرون لمصدر خارجي من الإثيلين وهي في حرارة التخزين الموصى بها إلى فقدانها للونها الأخضر وتلونها بالبني. ويؤدي تعرضها للإثيلين بتركيز يزيد عن ٠,١ جزءاً في المليون إلى تقصير فترة صلاحيتها للتخزين بنسبة ٣٠٪-٥٠٪ على ٥°م (Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

التداول

تجرى مختلف عمليات التداول في محطات التعبئة التي يجب أن ينقل إليها المحصول سريعاً بعد الحصاد، ولكن يوصى بإجراء التعبئة في الحقل لمحصول الفاصوليا الفائق الرفع، والرفيع جداً، والرفيع، لكي يقتصر تداوله على مرة واحدة قبل تبريده

تكنة ١- حيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

أولياً. وفي هذه الحالة، يتم جمع المحصول، وفرزه، وتعبئته في عبوات التصدير في عملية واحدة

الفرز

يجرى فرز الفاصوليا الخضراء إما يدوياً، وإما آلياً. ويعد تقسيم الفاصوليا إلى رتب تجارية مختلفة من بين عمليات التداول الهامة وقد سبقت الإشارة إلى التقسيم المستخدم في الولايات المتحدة بنظام ال sieve size.

الفرز اليدوي

يجرى الفرز في محطات التعبئة - أثناء التعبئة - وذلك باستبعاد القرون الصغيرة جداً، والزائدة النضج، والمصابة بالأمراض والآفات والشوكة، والمجروحة، والذابلة، وغير المثلة للصف، والخشنة اللمس، والمختلفة اللون ... إلخ.

ويراعى دائماً توحيد قطر الثمار في العبوة الواحدة

الفرز الآلي

يجرى الفرز الآلي في محطات التعبئة، حيث تمر قرون الفاصوليا التي تم حصادها آلياً على آلات تقوم بإزالة الأوراق والبقايا النباتية الأخرى، ثم تمر على سير متحرك لاستبعاد القرون غير الصالحة للتسويق، وما يبقى من أجزاء نباتية يدوياً.

وتكون تفاصيل عمليات الفرز الآلي، كما يلي،

١- التفريغ على سير متحرك offloading conveyor belt

٢- المرور على جزء لفصل القرون عن كتل التربة، والحجارة، وغيرها من الأجزاء الصلبة المختلطة بالقرون، وهو الجزء الذي يعرف باسم gravity separator نظراً لاعتماده في الفصل على خاصية الجاذبية الأرضية

٣- المرور على جزء لفصل القرون عن الأوراق، وأجزاء السيقان، والأجزاء الأخرى

الفصل الثامن - الفاصوليا

الصغيرة المختلطة بالقرون بواسطة تيار قوى من الهواء، وهو الجزء الذى يعرف باسم trash eliminator.

٤- المرور على برميل دوار للتخلص من القرون الصغيرة من خلال فتحات، ويعرف هذا الجزء باسم pin-bean eliminator.

٥- المرور على برميل دوار ذات انخفاضات ضحلة فنجانية الشكل للتخلص من القرون المكسورة، وهو الجزء الذى يعرف باسم broken-bean eliminator.

٦- تمر القرون بعد ذلك على مناوئد هزازة vibrating tables للتخلص من بقية الشوائب.

٧- يلى ذلك مرور القرون على سيور هزازة حيث تتعرض للغسيل بالماء vibrating washer، للتخلص من التربة العالقة بالقرون، وكذلك التخلص من جزء من حرارة الحقل.

٨- يعقب ذلك مرور القرون على مناوئد لأجل فرزها يدوياً grading tables، حيث تزال القرون الزائدة النضج، والمتعفنة، والمشوهة ... إلخ.

٩- تمر القرون بعد ذلك بالإهتزاز إلى كراتين التعبئة المشبعة، حيث توزن، ثم تغلق آلياً، ويعرف هذا الجزء باسم carousel-type automatic box filler.

١٠- التبريد cooling بالدفع الجبرى للهواء، ثم التخزين البارد لحين الشحن.

التعبئة

(التعبئة للتسويق المحلى)

يفضل تعبئة الفاصوليا - لأجل التسويق المحلى - فى صناديق بلاستيكية، أو فى أقفاص الجريد المبطنة بالكرتون المضلع المثقب، مع تجنب استعمال أجولة الجوت أو البولي بروبيلين، ذلك لأنها تزيد كثيراً من نسبة الجروح والأضرار الميكانيكية التى تحدث بالقرون، فضلاً عن أنها لا تسمح بالتهوية الجيدة، وترفع كثيراً من الرطوبة النسبية داخل العبوة؛ مما يؤدي - مع غياب التبريد فى حالات التسويق المحلى - إلى زيادة أعفان القرون.

تكملة - جيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ويراعى أن تكون العبوات ممتلئة، ولكن دون كبس أو ضغط وألا يزيد مستوى القرون في العبوة عن ارتفاع العبوة ذاتها، لكي لا يحدث ضغط على القرون عند وضع العبوات فوق بعضها البعض

التعبئة والتصدير

تعبأ الفاصوليا لأجل التصدير فى عبوات كرتون مضلع مشمع سعة ٣ أو ٥ كجم، تكون أبعادها ٣٠ × ٢٠ × ١٢ سم، أو ٤٥ × ٣٠ × ١٢ سم، على التوالي، وبها فتحات طولية جانبية للتهوية لا تقل نسبتها عن ٥٪ من السطح الخارجى للعبوة لكي تكون التهوية جيدة، ولا تزيد عن ٧٪ لكي لا تتأثر مقاديرها

يتم اختيار القرون الصالحة للتصدير بعناية، وتعبأ بطريقة منتظمة، بحيث توضع القرون فى العبوة فى صفين أو ثلاثة، مع توحيد اتجاه أعناق القرون فى كل صف منهم. ويفيد تبطين عبوات الكرتون بورق السوليفان فى تقليل فقد الرطوبة من القرون.

كما يمكن التعبئة فى عبوات المستهلك، وهى عبارة عن أكياس من ورق السوليفان المثقب تتسع لنحو ٢٥٠، أو ٥٠٠ جم من القرون، ثم توضع هذه العبوات داخل الصناديق الكرتونية

التبريد الأول

التبريد الأول

يجرى التبريد الأول precooling فى خلال ساعتين من الحصاد أو ثلاث ساعات كحد أقصى، حيث تؤدى سرعة التبريد إلى:

- ١- إبطاء معدل تنفس القرون
- ٢- خفض الفقد الرطوبى من القرون.
- ٣- تقليل نشاط الكائنات المسببة للأعفان.
- ٤- منع تلون أطراف القرون باللون البنى.
- ٥- المحافظة على نضارة القرون.

الفصل الثامن - الفاصوليا

هذا وتفقد القرون حوالى ٢٪ من رطوبتها فى خلال ساعة واحدة من الحصاد، وترتفع هذه النسبة إلى حوالى ٣٪ فى خلال ساعتين إضافيتين، ولكن نسبة الفقد تزيد إلى حوالى ١٠٪ إذا تأخر التبريد الأولى إلى خمس ساعات بعد الحصاد.

طرق التبريد الأولى

لا يمكن الاعتماد على غرف التخزين البارد فى تبريد الفاصوليا إلى الدرجة المطلوبة، لأن التبريد فيها يكون بطيئاً وقد يستغرق أكثر من ١٦ ساعة، ويقتصر دور المخازن المبردة على المحافظة على برودة المحصول المخزن والذى سبق تبريده أولاً.

ويجرى التبريد الأولى فى الفاصوليا إما بالماء البارد hydrocooling، وإما بالدفع الجبرى للهواء البارد forced-air cooling.

التبريد الأولى بالماء البارد

يعتبر التبريد الأولى بالماء البارد hydrocooling أفضل وسيلة لتبريد الفاصوليا نظراً لأن الماء يعد أسرع وسيلة لانتقال الحرارة، وبذا .. يمكن تبريد كميات كبيرة من المحصول خلال فترة زمنية قصيرة. كما أن هذه الطريقة تحدد من الفقد الرطوبى أو تمنعه أثناء التبريد.

لكن لا يفضل التبريد بتلك الطريقة إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك، ذلك لأن عملية النقع فى الماء تساعد على انتشار مسببات الأمراض، كما توفر الرطوبة الحرة بيئة مناسبة لنموها وإذا ما استعمل الماء المكلور فإنه يجب أن يكون بتركيز ٥٥-٧٠ جزءاً فى المليون من الكلورين الحر عند $\text{pH} = ٧$ ، مع خلو الماء من العوالق العضوية. أما عند ارتفاع الـ pH عن ذلك فإنه يحسن زيادة تركيز الكلورين الحر إلى ١٥٠ جزءاً فى المليون، مع ضبط التركيز إلكترونياً على فترات متقاربة. ويتعين غسيل القرون بالماء أولاً لأجل التخلص من الأتربة والمخلفات العضوية التى تقلل من فاعلية الكلورين. وقبل البدء فى تركيب أجهزة الغسيل بالماء المكلور يتعين التخطيط للوسيلة التى سيتم عن طريقها التخلص من ماء التطهير بأمان (Boyette وآخرون ١٩٩٤).

تكس، جيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ويجرى التبريد إما بمرور القرون على سير متحرك يتعرض "لدش" قوى من الماء البارد، وإما بغمرها في قناة flume أو خزان tank ممتلئان بالماء البارد.

ويعد تبريد الفاصوليا أولياً بغمرها في قناة ممتلئة بالماء البارد طريقة حديثة نسبياً، وفيها تغمر القرون المغروزة والدرجة مباشرة في قناة طويلة تحتوى على ماء مضاف إليه الكلور (مكلور) على حرارة ١-٣°م، حيث يمكن خفض حرارة المنتج بصورة متجانسة من ٣٠°م إلى ٧°م في خلال حوالى ٦ دقائق. ويفيد التبريد السريع فى منع حدوث القلون البنى فى أطراف القرون

ومن أهم عيوب التبريد بهذه الطريقة ابتلال القرون، وهو ما يمكن أن يتسبب فى خسائر كبيرة - بسبب الأعفان - إذا ما سمح للمحصول بأن يدفأ من جديد بعد تبريده أولياً، أو إذا ما لم يكن الماء مكلوراً بصورة جيدة وتجدر الإشارة إلى أن القرون الدافئة المبتلة تكون شديدة القابلية للإصابة بعدد من الأعفان، مثل أعفان البثيم *Pythium*، والريزويس *Rhizopus*، والعفن الرمادى الذى يسببه الفطر *Botrytis cinerea*، والعفن المائى الطرى الذى يسببه الفطر *Sclerotinia* ولذا لا يجب إجراء التبريد الأولى بالماء البارد ما لم تتوفر مخازن باردة كافية لاستمرار التبريد بعد ذلك.

وعلى الرغم من أن جدر قرون الفاصوليا توفر لها حماية جيدة ضد الإصابات المرضية، إلا أن الكائنات الممرضة يمكن أن تصيبها من خلال الجروح، والخدوش، والأعناق. وتزداد احتمالات الإصابات المرضية كلما كثرت الجروح وازداد تعمقها فى القرن، وكلما ازدادت فترة الغمر فى الماء، وارتفعت حرارته.

ومن أهم ما تجب مراعاته لأجل نجاح عملية التخلو، ما يلى:

١- ضرورة استمرار معاينة تركيز الكلور فى ماء التبريد باستعمال أوراق الاختبار الخاصة بذلك، أو بالأجهزة الإلكترونية.

٢- تجنب زيادة فترة بقاء المحصول فى الماء المكلور عما ينبغى.

التشطيل الثامن - الفاصوليا

٣- تغيير الماء كلما دعت الضرورة نظرًا لأن كفاءة الكلورة تنخفض كثيرًا كلما كثرت الشوائب في ماء التبريد ولذا يفضل إذا كان المحصول مُتربًا أن يغسل بالماء النظيف أولاً قبل أن يبرد أوليًا بالماء المكثور.

٤- ضرورة التخلص من الماء المكثور بطريقة آمنة لا تضر بالصحة العامة (عن جامعة ولاية نورث كارولينا - الخدمات الإرشادية بالإنترنت، تحت عنوان: Postharvest cooling and handling of green beans and field peas، إعداد: M. D. Boyette وآخرون ٢٠٠٠).

يعاب على هذه الطريقة في التبريد الأولى أنها تؤدي إلى زيادة الإصابة بالعيب الفسيولوجي الذي يعرف باسم الاحمرار الصدئي russeting بعد إخراج الفاصوليا من المخازن (Redit & Hamer ١٩٦١). وهو يشبه إلى حد كبير أعراض الإصابة بلفحة الشمس (Ramsey & Wiant ١٩٤١).

التبريد الأول بالرفع الجبرى للهواء

إن أفضل وسيلة لإجراء التبريد الأولى هي طريقة الدفع الجبرى للهواء، وتجرى برص الكراتين وهي في البالتات - في صفين متقابلين أمام مروحة شفط على أن يفصل بينهما مسافة ١,٥م تقريبًا ترص باليتات الكراتين بحيث تكون الفتحات الجانبية للكراتين متقابلة بين داخل النفق - الذى يفصل بين صفى البالتات - وخارجه يغطى النفق ببلاستيك ثقيل من أعلى ومن الجانب المفتوح المقابل لمروحة الشفط. يؤدي تشغيل المروحة إلى توليد فرق ضغط فى الهواء بين داخل النفق وخارجه، مما يؤدي إلى اندفاع الهواء البارد - من خلال فتحات التهوية فى الكراتين - من خارج النفق إلى داخله، ثم يسحب إلى خارج النفق مرة أخرى بواسطة مروحة الشفط ... إلخ.

يجب أن يكون الهدف من التبريد المبدئى هو التخلص من حوالى ٩٠٪ من حرارة الحقل فى خلال ساعة واحدة إلى ساعتين من بداية التبريد.

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتأثير العناية التبريد الأولى بالصدع الجبرى للصواء بالعوامل التالية،

- ١- فتحات التهوية vent holes فى العبوات التى يجب ألا تقل مساحتها عن ٥٪ من مساحة السطح الخارجى للعبوة
- ٢- ضرورة أن تكون الفتحات فى مواجهة النفق وخارجه.
- ٣- ضرورة عدم تواجد ممرات للهواء بين العبوات أو البالتات، أو تحت البالتات؛ حيث إن تواجدها يمكن أن يتسبب فى زيادة فترة التبريد الأولى بنسبة تصل إلى ٤٠٪.
- ٤- ضرورة عدم زيادة طول النفق عن ست بالتات لتجنب الاختلافات الكبيرة فى ضغط الهواء بين أول النفق وآخره.

المعاملة بالـ 1-MCP

أدت معاملة الفاصوليا الخضراء بالـ 1-MCP بمعدل ٠,٥ ميكروليتر/لتر قبل تخزينها على ٧°م إلى تأخير التغير اللونى، وتكون البقع البنية، وإلى خفض معدل التنفس؛ إلا أن إنتاج القرون للإثيلين ازداد فى مرحلة متأخرة من التخزين استجابة لمعاملة الـ 1-MCP. لقد أخرت المعاملة ظهور البقع البنية - التى هى أحد أعراض التعرض للحرارة المنخفضة - بنحو خمسة أيام. كذلك قل تكون المساحات المائية المظهر بنسبة ٥٠٪ فى القرون التى سبقت معاملتها. ويعنى ذلك أن المعاملة بالـ 1-MCP قللت من أعراض الشيخوخة والبرودة فى الفاصوليا الخضراء خلال فترة التخزين الطويلة؛ مما يدل على وجود دور للإثيلين المنتج داخلياً بالقرون (وهى غير كلايمكتيرية) فى شيخوختها (Cho وآخرون ٢٠٠٨).

التخزين

التخزين البارد العادى

تحتفظ قرون الفاصوليا الخضراء بنضارتها لمدة أسبوع إذا خزنت فى ٦-٧°م، ورطوبة نسبية حوالى ٩٥٪-١٠٠٪، حيث يمكن تخزينها لمدة ٨-١٢ يوماً بحالة جيدة. هذا إلا أن بقاء الفاصوليا على ٥°م لمدة ٧-٨ أيام قد يعرضها للإصابة بأضرار البرودة

الفصل الثامن - الفاصوليا

وإذا خزنت القرون فى حرارة ٤°م، أو أقل - لمدة ثلاثة أيام أو أكثر - فإنها تتعرض للإصابة بأضرار البرودة على صورة نقر سطحية، وظهور لون أحمر صدئ، وهى التى تكون - كذلك - شديدة الحساسية للإصابة بالفطريات الممرضة، مع زيادة فى معدل تنفس القرون. وتشاهد هذه الأضرار بعد إخراج القرون من المخزن المبرد بيوم أو يومين وتزداد حدة الاحمرار عند وجود رطوبة حرة على القرون، وهو ما يشاهد وسط العبوات حيث يتكثف بخار الماء عادة.

ولا ينصح بإضافة الثلج المجروش لعبوات الفاصوليا إذا كان من المتوقع أن تبقى فى درجة حرارة عالية بعد إخراجها من المخزن.

ومن الممكن حفظ الفاصوليا الخضراء بحالة جيدة لمدة يومين فقط على ١°م، ولمدة أربعة أيام على ٢,٥°م، ولمدة ٨-١٠ أيام على ٥°م قبل أن تظهر عليها أضرار البرودة، وذلك إذا استعملت الفاصوليا بعد انتهاء مدة التخزين مباشرة، وهو ما يحدث مثلاً عند التخزين المؤقت للمحصول المعد للتصنيع.

وأياً كانت درجة حرارة التخزين .. فإنه يجب الاهتمام بتوفير تهوية جيدة فى المخازن حتى لا ترتفع درجة الحرارة فى مركز العبوات، ويزداد فيها العفن (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨).

هذا .. وتوجد اختلافات معنوية بين أصناف الفاصوليا فى مدى حساسيتها لأضرار البرودة (Watada & Morris ١٩٦٦ ب).

ويعد فقد الرطوبة أحد أهم مشاكل ما بعد حصاد الفاصوليا الخضراء؛ حيث يؤدى فقد القرون لـ ٥٪ من وزنها إلى ذوبولها وطراوتها، وتصبح غير صالحة للتسويق بعد فقدها لنحو ١٠٪-١٢٪ من وزنها.

ويمكن تقدير الفقد الرطوبى للفاصوليا بالمعادلة التالية:

النسبة المئوية للفقء فى أى يوم = ٠,٧٥٤ × الفرق فى ضغط بخار الماء.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

هذا مع إمكان الحصول على قيمة الفرق في ضغط بخار الماء من اللوحة السيكرومترية psychrometric chart إذا ما عُلِّمت درجة الحرارة والرطوبة النسبية

ويزيد الفقد في الوزن في القرون الصغيرة عما في تلك الأكثر تقدماً في التكوين

وتحدث أضرار التجمد لدى تعرض الفاصوليا لحرارة -7°C أو أقل وتكون على صورة مساحات مائية المظهر بالقرون (Cantwell & Suslow 2007).

التخزين في الهواء المتحكم في مكوناته

أمكن حفظ قرون الفاصوليا بحالة نضرة، ومنع حدوث أى تلون في مواضع الأضرار الميكانيكية بها لمدة ثلاثة أسابيع بتخزينها في جو يحتوى على 3٪ أكسجين مع 8٪ CO_2 على 4°C ، و 18٪ على حرارة 8°C ، وذلك حسب درجة حرارة التخزين (8٪ CO_2 على 4°C ، و 18٪ على 8°C) وقد أحدث ثانى أكسيد الكربون بتركيزات أعلى من 20٪ أضراراً شديدة بالقرون ظهرت على صورة تحلل، وكان أعلى مستوى من ثانى أكسيد الكربون تحمّلته القرون على 1°C هو 8٪، بينما أحدث تركيز 18٪ أضراراً على 4°C ، ولم يحدثها على 8°C (Costa وآخرون 1994).

ويوصى Saltvent (1997) بأن يكون تخزين الفاصوليا الخضراء على حرارة 8°C (يمدّى من 5 إلى 10°C) في هواء يحتوى على 2٪-3٪ أكسجين، و 4٪-7٪ ثانى أكسيد الكربون.

ويؤدى تخزين الفاصوليا الخضراء في 2٪-5٪ أكسجين إلى خفض معدل تنفسها وتحمل الفاصوليا تركيزات من ثانى أكسيد الكربون تتراوح بين 3٪، و 10٪ وتستفيد منها وتعد الفائدة الرئيسية لذلك المحافظة على اللون الأخضر وإبطاء التغيرات اللونية في الأجزاء المضارة من القرون (Cantwell & Suslow 2007).

وأمكن تخزين الفاصوليا الخضراء بحالة جيدة لمدة 3 أسابيع على 4°C في جو 2٪ أكسجين، و 6٪ ثانى أكسيد كربون ويمكن بدلاً من ذلك وضع الفاصوليا فى عبوات

معدلة للجو، حيث يؤدي تنفس القرون إلى رفع نسبة ثانى أكسيد الكربون داخل العبوات أو الباقات. ويفيد هذا الإجراء - كذلك - فى المحافظة على رطوبة نسبية مرتفعة حول القرون.

كذلك أمكن تخزين القرون الخضراء بحالة جيدة فى الهواء على حرارة ٨°م لمدة ١٨ يوماً، وزادت تلك الفترة إلى ٢٢ يوماً عندما كان التخزين فى هواء يحتوى على ١٪ O_2 ، و ٣٪ CO_2 (Cano وآخرون ١٩٩٧، و Monreal وآخرون ١٩٩٨). وقد كانت تلك الظروف - مقارنة بعدد من المعاملات الأخرى - هى الأفضل - كذلك - للمحافظة على أعلى مستوى من حامض الأسكوربيك فى القرون، كما لم يحدث معها أية تغيرات معنوية فى محتوى القرون من فيتامينات B القابلة للذوبان فى الماء: B_1 ، و B_2 ، و B_6 (Camara وآخرون ١٩٧٧، و Torija-Isasa وآخرون ١٩٩٨).

ومن المعتقد أن بقاء مستوى الأكسجين أقل من ٥٪، وثانى أكسيد الكربون أعلى عن ٧٪ يؤدي - على المدى الطويل - إلى تكوين طعم غير مرغوب فى قرون الفاصوليا (عن Loughheed ١٩٨٧).

وقد ازداد نشاط إنزيم البيروكسيداز peroxidase والبولى فينول أكسيداز polyphenol oxidase تدريجياً فى قرون الفاصوليا المخزنة فى الهواء وفى الجو المتحكم فى مكوناته (١٪ O_2 ، و ٣٪ CO_2) على ٨°م. وأدى نقل القرون إلى ٢٠°م إلى زيادة نشاط الإنزيمين فى كل المعاملات التى كانت مخزنة فى حرارة منخفضة، وخاصة فى تلك التى كانت فى مستوى منخفض من الأكسجين (Monreal وآخرون ١٩٩٨).

التخزين فى الجو المعدل

أمكن تخزين أربعة أصناف من الفاصوليا (درى Derby، وبرونكو Bronco، وهياليه Hialeah، وبروسبرتي Prosperity) فى أكياس من أغشية البوليوليفين polyolefin بصورة جيدة لمدة ثلاثة أسابيع على حرارة ٥°م، ولكن ظهرت أضرار البرودة على صنف خامس (91 G) بعد أسبوع واحد من التخزين على ٧°م. وقد توازن تركيب الهواء داخل

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

الأكياس واستقر في جميع الأصناف عند حوالي ٤٪ CO_2 ، و ٥٪ O_2 هذا إلا أن الأصناف اختلفت في مدى التغيرات اللونية التي حدثت بها، وكان أفضلها بروسبرتي، وهياليه وكان الفقد في الوزن بعد ٢١ يوماً من التخزين أقل من ٣٪ في جميع الأصناف (Mekwatanakarn & Richardson ١٩٩٧).

أهمية التخلص من الإثيلين

يجب عدم تخزين الفاصوليا مع المنتجات الأخرى المنتجة للإثيلين، مثل الكنتالوب، وذلك بسبب حساسية الفاصوليا للإثيلين الذي يؤدي إلى سرعة اصفرار القرون، كما لا يجب تخزين الفاصوليا مع البصل الأخضر أو الفلفل لأنها يمكن أن تكتسب الرائحة منهما، وكذلك من كافة المنتجات الأخرى التي تنبعث منها روائح مميزة

وقد أدى خفض تركيز الإثيلين في الهواء المحيط بالقرون المخزنة حتى ٠,٠٠٥ ميكروليتر/لتر إلى مضاعفة فترة احتفاظها بجودتها أيًا كانت حرارة التخزين، وذلك مقارنة ببقاء الإثيلين عند تركيز ٠,١-١,٠ ميكروليتر/لتر، علماً بأن تركيز الغاز الموجود طبيعياً في هواء محلات البيع (السوبر ماركت) التجارية يتراوح - عادة - بين ٠,١٧ و ١,١٧ ميكروليتر/لتر (Wills & Kim ١٩٩٦).

تنفس القرون أثناء التخزين

وجد Watada & Morris (١٩٦٦) أن فترة احتفاظ قرون الفاصوليا بجودتها بعد الحصاد كانت أطول ما يمكن في حرارة ٥°م. وقد تساوى إجمالى تنفس القرون (ثانى أكسيد الكربون المنتج المتراكم) طوال فترة التخزين المناسبة (التي استمرت خلالها القرون محتفظة بجودتها) سواء أكان التخزين على ٥°م، أم على حرارة أعلى من ذلك وأمكن تخزين قرون الفاصوليا من صنف تندر كروب Tendercrop على حرارة ٥,٠°م لمدة يومين، وحرارة ٢,٥°م لمدة ٤ أيام، وحرارة ٥°م لمدة ١٢ يوماً، وذلك قبل أن تتعرض للإصابة

الفصل الثامن - الفاصوليا

بأضرار البرودة، علمًا بأن نقل الفاصوليا من الحرارة الشديد الانخفاض إلى حرارة أعلى أسرع من ظهور أضرار البرودة، وتحفيز معدل تنفس القرون.

ونجد في معظم الثمار التي تحدث بها ظاهرة الكلايمكتريك التنفسي أن البذور والأنسجة الثمرية تكمل نموها في آن واحد، بينما نجد في الفاصوليا أن البذور لا تبدأ في الزيادة في الحجم إلا بعد أن يكمل البيريكارب معظم نموه. وقد لاحظ Watada & Morris (١٩٦٧) أن القرن الكامل أظهر كلايمكتريك تنفسي، نتج عنه زيادة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون بواسطة البذور النامية، أعقبها نقص باء في معدل إنتاج الغاز بواسطة نسيج البيريكارب، ولكن لم تصاحب ذلك زيادة في معدل إنتاج الإثيلين؛ مما يعني أن الكلايمكتريك التنفسي الظاهري الذي لوحظ لا يقارن بالظاهرة المعروفة في الثمار الناضجة.

التغيرات المصاحبة للتخزين

إن أهم صفات الجودة في قرون الفاصوليا، والتي يمكن أن تحدث فيها تغيرات بعد الحصاد وأثناء التخزين، ما يلي:

١- اللون:

يتغير اللون تدريجيًا من الأخضر البراق إلى الأخضر المصفر غير المقبول. لا يحدث هذا التغير في لون القرون عند تخزينها في أكياس من البوليثلين ذي الكثافة المنخفضة على ٥°م لمدة ١٦ يومًا، ولكنه يحدث بعد ٥ أيام فقط من التخزين على ١٠°م (Trail وآخرون ١٩٩٢).

٢- الفقد الرطوبي، وما يترتب عليه من فقد في نضارة القرون وخاصية انقصاصها crispness بسهولة، مع ذبولها.

٣- التلون البني:

تتعرض قرون الفاصوليا أثناء حصادها آليًا وتداولها - بالجملة - بعد ذلك إلى التقطيع والإصابة بالخدوش. وهذه الأسطح المقطوعة والخدوشة سرعان ما تتلون باللون

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

البنى خلال ثماني ساعات أثناء نقلها إلى مصانع التعليب أو التجميد، أو إذا لم تبرد سريعاً قبل تصنيعها، مما يجعلها غير مقبولة للتصنيع ويرتبط ذلك التلون البنى بصورة مباشرة بزيادة أكسدة المركبات الفينولية بواسطة إنزيم الكاتيكوليز catecholase (Buescher وآخرون ١٩٧٤).

وقد أدت زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء المحيط بالقرون إلى ٣٠٪ إلى منع حدوث التلون البنى بأطراف القرون، ولكن ذلك لم يؤثر في نشاط إنزيم الكاتيكوليز

كذلك وجدت اختلافات معنوية بين أصناف الفاصوليا في سرعة تلون الأجزاء المقطوعة والمخدوشة من القرون باللون البنى، وكان من أقلها تلوناً بلوكروب Bluecrop، و NCX8005، ومن أشدها تلوناً بروفيدر Provider، و GP72-122، وكانت ظاهرة التلون البنى مرتبطة بزيادة مستوى المركبات الفينولية بعد حدوث الأضرار الميكانيكية أيًا ما كان مستوى نشاط الفينوليز Phenolase، والبيروكسيداز peroxidase (Henderson وآخرون ١٩٧٧)

كذلك أمكن منع حدوث التلون البنى بالأجزاء المكسورة من القرون بمعاملة القرون قبل تخزينها بثاني أكسيد الكبريت SO_2 بتركيز ٧٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جزء في المليون لمدة ٣٠ ثانية، أو بتخزينها في هواء يحتوى على ٢٠٪ أو ٣٠٪ ثاني أكسيد الكربون لمدة ٢٤ ساعة قبل تصنيعها. هذا علماً بأن خصائص الجودة في المنتج المصنع (اللون، والقوام، والطعم) لم تتأثر بتلك المعاملات ولم يكن للتركيز العالي لثاني أكسيد الكربون أية تأثيرات سلبية على طعم الفاصوليا ما لم تقل نسبة الأكسجين عن ١٠٪ (Henderson & Buescher ١٩٧٧).

إن زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء المخزن - مع التخزين لمدة ٢٤ ساعة على ٢٧°م - ساعد على نقص تلون الأطراف المقطوعة للقرون، وازداد تحسن الحالة مع زيادة تركيز الغاز حتى ٣٠٪ وقد أرجع النقص في التلون البنى لأطراف

الفصل الثامن - الفاصوليا

القرون إلى ضعف نشاط إنزيم الفينوليز ونقص المحتوى الفينولى وبالمقارنة بالكنترول، فإن وضع القرون فى الجو الغنى بثانى أكسيد الكربون أدى إلى تحسين اللون والطعم، وانخفاض امتراء نسج البشرة فى المنتج المعب، بينما لم يتأثر قوام المنتج بمعاملة التخزين، ولم يترتب عليها أية تأثيرات ضارة. وقد أجريت هذه الدراسة فى نظام متدفق flowing system للتخزين لا يسمح بتراكم المركبات التى تكسب الفاصوليا طعماً غير مرغوب فيه، كما كانت نسبة الأكسجين ١٦٪، وهى ظروف يصعب توفيرها على نطاق تجارى (Bueschner & Henderson ١٩٧٧، و Loughheed ١٩٨٧).

ويوصى Saltveit (١٩٧٧) بأن يكون تخزين الفاصوليا التى تنتظر دورها فى التصنيع فى حرارة ٨°م (بمدى من ٥-١٠°م) فى هواء يحتوى على ٨٪-١٠٪ أكسجين، و ٢٠٪-٣٠٪ ثانى أكسيد الكربون.

وحتى بالنسبة للفاصوليا الطازجة السابقة التجهيز - بالتقطيع (pre-cut) والتقصيف (pre-snapped) - فإنها تحتفظ بجودتها بشكل جيد عند حفظها فى أكياس محكمة الإغلاق من البوليثلين غير المثقب، ويرجع ذلك إلى تراكم غاز ثانى أكسيد الكربون داخل الأكياس نتيجة لتنفس القرون، وكان ذلك كافياً لمنع التدهور فى اللون، والطعم، والقوام وغيرها من صفات الجودة خلال ١٤ يوماً من التخزين (Buescher & Adams ١٩٧٩).

وبالنظر إلى أن المحصول السابق التجهيز يتعرض للتلف والتدهور السريعين؛ فإنه يتعين أن تكون جميع عمليات التداول متكاملة، ويتضمن ذلك قصر التجهيز المسبق على المحصول الطازج ذى النوعية الجيدة، مع المحافظة على النظافة العامة المستمرة أثناء الإعداد، والتداول والتخزين فى حرارة منخفضة، والتعبئة فى عبوات تسمح بتوفير الرطوبة والجو المعدل حول القرون.

التصدير

يمتد موسم تصدير الفاصوليا الفائقة الرفع، والرفيعة جداً، والرفيعة، والبوبى خلال

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

العام كله فيما عدا شهرى أغسطس وسبتمبر، علماً بأن نوعية القرون تنخفض كلما ازداد الارتفاع فى درجة الحرارة وقت الحصاد (خلال شهرى يونيو ويوليو)، أما الفاصوليا الهلدا فيمتد موسم تصديرها من ديسمبر إلى مارس

ويمكن التصدير إلى الدول الأوروبية حسب نوعيات الفاصوليا، كما يلي،

الفئة	قطر القرن (سم)	طول القرن (سم)	الأسواق التى تتطلبها
الفاتنة الرفع extra fine	٦,٥-٥,٥	١٣-٩	فرنسا
الرفيعة جداً very fine	٨,٠-٧,٠	١٣-٩	فرنسا - بلجيكا - سويسرا - المملكة المتحدة - السويد - النرويج - فنلندا
الرفيعة fine	٨,٥-٨,٠	١٤-٩	فرنسا - بلجيكا - سويسرا - المملكة المتحدة - هولندا - ألمانيا
البوبى bobby	٩ فأكثر	١٦-١٣	جميع الدول الأوروبية فيما عدا فرنسا

يجب تبريد الحاويات التى تستخدم فى شحن الفاصوليا الخضراء إلى ٤°م على ألا تزيد عن ٧°م، مع توفير تهوية بمعدل ٣٠م³/ساعة (٢٠ قدم³/دقيقة) فى الحاويات الـ ٢٠ قدم، وبمعدل ٦٠م³/ساعة (٣٥ قدم³/دقيقة) فى الحاويات الـ ٤٠ قدم، ومع رطوبة نسبية ٩٠٪-٩٥٪، حيث تحتفظ الفاصوليا بجودتها لمدة ٧-١٤ يوماً تحت هذه الظروف. هذا مع العلم بأن الفاصوليا تتجمد على -٠,٧°م (Optimal Fresh ٢٠٠١ - الإنترنت).

نبات الفاصوليا

يقدر معدل التنفس فى نبوت الفاصوليا bean sprouts الحديث الحصاد بنحو مللى مول واحد من ثانى أكسيد الكربون لكل كيلوجرام واحد فى الساعة على ١٠°م،

الفصل الثامن - الفاصوليا

ويتضاعف ذلك المعدل بمقدار ١٠ مرات مع كل ارتفاع في درجة الحرارة قدره ١٦,٥°م. وتبقى نبوت الفاصوليا بحالة جيدة لمدة ٧-٩ أيام على الصفر المئوى مع ٩٥٪ إلى ١٠٠٪ رطوبة نسبية. وتصل نبوت الفاصوليا إلى حدها الأدنى من الصلاحية للبيع بعد ٨,٥ و ٥,٥ و ٤,٥ و ٢,٥ و ١,٥ و ١٠°م عند تخزينها على حرارة صفر، و ٢,٥ و ٥ و ١٠°م على التوالي (عن DeEll وآخرين ٢٠٠٠).

الفصل التاسع

البسلة

النضج والحصاد

يتوقف موعد النضج المناسب للحصاد، وطريقة الحصاد على الغرض الذى يزرع من أجله المحصول كما يلى:

أولاً: البسلة التى تزرع لأجل البذور الخضراء

من أهم علامات وصول القرون إلى طور النضج المناسب للحصاد ما يلى:

١- امتلاء القرون ونمو البذور بصورة جيدة - وهى مازالت غضة - بحيث يؤدى الضغط عليها إلى دهكها دون أن تنزلق الفلقتان.

٢- بدء تحول البذور من اللون الأخضر القاتم إلى الأخضر الفاتح.

٣- الاعتماد على قراءة جهاز التندروميتر tendrometer، وهو جهاز يقدّر درجة صلابة البذور الخضراء - بقياس مقدار الضغط اللازم لدفع حجم معلوم من البذور من خلال شبكة قياسية standard grid - وترتبط جودة البذور ونسبة السكر بها ارتباطاً وثيقاً مع قراءة الجهاز كما هو مبين فى جدول (٩-١)، حيث تزداد الجودة مع انخفاض القراءة، ويصاحب ذلك انخفاض المحصول (جدول (٩-٢)، ولكن يزيد سعر البيع. وعندما تتراوح قراءة الجهاز من ٩٠٪-٩٥٪ .. فإن ذلك يعنى أن المحصول يقل عما يمكن الحصول عليه بمقدار ٢٥٪ (Shoemaker ١٩٥٣).

ويرتبط النقص فى نوعية البطور، أو الزواحة فى قراءة التندروميتر بالتغيرات التالية أيضاً،

أ- زيادة نسبة النشا، والمواد عديدة التسكر، والبروتين، وهى المواد الصلبة التى لا تذوب فى الكحول .. ويعنى ذلك ارتباط النوعية سلبياً بنسبة هذه المواد، ويبلغ معامل الارتباط ٠,٩٥٪ (Idle ١٩٥٠).

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ب- زيادة الكثافة النوعية للبذور.

ج- نقص نسبة السكر

د- انتقال الكالسيوم إلى أغلفة البذور، مما يزيد من صلابتها.

هـ- زيادة حجم البذور

جدول (٩-١): قراءة جهاز التندروميتر tendrometer للرتب المختلفة من بذور البسلة الخضراء.

الرتبة	القراءة
فاخرة جداً	Extra fancy ١٠٠
فاخرة	Fancy ١١٥-١٠٠
فوق القياسية	Extra standard ١٣٠-١١٦
القياسية	Standard ١٥٠-١٣١
تحت القياسية	Substandard ١٥٠


جدول (٩-٢): تأثير التأخير في الحصاد على محصول البسلة الخضراء ونوعيته (Salunkhe & Dasi ١٩٨٤).

عدد الأيام بعد أول حصاد	الحصول (طن/فدان)	قراءة التندروميتر	البذور الصغيرة (رقم ٢، ٣) (%)	النشا (%)
صفر	١,٥٨	٩٠	٣٢,٠	٢,٤٤
٢	٢,٠٢	٩٦	٢٨,٢	٢,٧٣
٤	٢,٣٦	١٠٢	٢٢,٥	٢,٩٩
٦	٢,٦٢	١٠٩	١٦,٨	٣,٢٢
٨	٢,٨٩	١١٨	١٣,٦	٣,٥٠
١٠	٣,١٨	١٣٥	٥,٥	٤,٤٤
١٢	٣,٦٤	١٦٠	٢,١	٥,٨٢

الفصل التاسع: البسلة

وتؤثر درجة الحرارة السائدة أثناء النضج تأثيراً كبيراً على سرعة نضج البذور وعلى الرغم من أن درجة الحرارة ليس لها أى تأثير على نوعية البذرة طالما أنها تحصد فى الوقت المناسب، إلا أن نوعيتها تتدهور بسرعة كبيرة بعد وصولها إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد إذا سادت الجو درجات حرارة مرتفعة خلال تلك الفترة، حيث تزداد قراءة التندوميتر بمقدار ١٥-٣٠ وحدة يومياً.

وتتأثر كمية المحصول بدرجة النضج التى يجرى عندها الحصاد كما هو مبين فى شكل (٩-١). ويمثل هذا الشكل متوسط محصول سبعة من أصناف التعليب فى خمسة مواسم زراعية. يتضح من الشكل أن الحصاد فى الوقت المناسب للتعليب يعنى نقصاً قدره حوالى ١٣٪ عن أعلى محصول متوقع. وعلى الرغم من ذلك .. فإن بسلة التعليب تحصد فى وقت مبكر عن الموعد المناسب بنحو يومين؛ مما يعنى أن النقص عن أعلى محصول متوقع يصل إلى ٢٥٪. وتجدر الإشارة إلى أن النقص المشاهد فى المحصول بعد أربعة أيام من وصول البذور إلى مرحلة النضج المناسبة للتعليب يرجع إلى نضج البذور، وبدء فقدانها لרטوبتها (Arthey ١٩٧٥).



شكل (٩-١): تأثير التقديم أو التأخير فى موعد حصاد البسلة عن الموعد المثالى على المحصول كنسبة مئوية من أعلى محصول متوقع.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتحصد حقول البسلة الخضراء يدوياً بعد ٥٠-٧٠ يوماً من الزراعة فى الأصناف القصيرة ويستمر الحصاد لمدة ١-١,٥ شهراً، وبعد ٧٠-٩٠ يوماً فى الأصناف المتوسطة الطول ويستمر لمدة شهرين، وبعد ٨٠-٩٠ يوماً فى الأصناف الطويلة ويستمر لمدة شهرين ونصف. ويجرى الحصاد كل خمسة أيام فى الجو البارد، وكل ثلاثة أيام فى الجو الحار، ويفضل أن يجرى فى الصباح الباكر أو قرب المساء. كما قد يجرى الحصاد آلياً مرة واحدة بالنسبة لمحصول التصنيع.

تحصد البسلة الخضراء لأجل التصنيع (التجميد والتعليب) آلياً على نطاق واسع فى عديد من دول العالم، حيث تقوم آلة الحصاد بتجريد النباتات من القرون. ويعتمد تحديد موعد الحصاد على تجمع العدد اللازم من الوحدات الحرارية بالنسبة لكل صنف وقد وجد أن حرارة أساس مقدارها ٣م كانت مناسبة لعدة أصناف من البسلة (Bourgeois وآخرون ٢٠٠٠).

وفى دراسة شملت سبعة أصناف من البسلة، وأربعة أنواع (موديلات) من آلات الحصاد بلغت نسبة البقايا النباتية التى مرت من آلة الحصاد بين ٤٪ و ٣٣,٧٪ من وزن المحصول، بمتوسط قدره ١٥,٢٪. كما تراوح مقدار الفقد فى المحصول بسبب عملية الحصاد الآلى بين ٢٤، و ١٤٠٨ كجم/هكتار (أى بين ٨، و ٤٤٠ كجم/فدان)، بمتوسط قدره ٥٥٥ كجم/هكتار (٢٣٣ كجم/فدان)، أو نحو ٠,٥٪ إلى ٣٤٪ من محصول القرون، بمتوسط قدره ١٠,٤٪. وكان معظم هذا الفقد عند مقدمة (رأس) آلة الحصاد، حيث بلغ ٧٠,٣٪ من الفقد الكلى وعلى الرغم من تباين الأصناف كثيراً فى نسبة الفاقد عند حصادها آلياً فإن الأنواع المختلفة من آلات الحصاد المستعملة لم تختلف فى هذا الشأن. وقد أمكن خفض كمية البقايا النباتية - التى تتجمع مع المحصول - ونسبة الفاقد فى القرون بالتحكم فى سرعة آلة الحصاد، وارتفاع مقدمة (رأس) الآلة التى تقوم بالتقاط عروش النباتات، وإجراء الحصاد قبل أن تصبح نسبة عالية من القرون زائدة النضج (Glancey وآخرون ١٩٩٦).

ثانيًا: البسلة النتى تزرع لأجل البذور الجافة

تُحصد البسلة النتى تزرع لأجل البذور الجافة آلياً بعد نضج وجفاف القرون السفلى تماماً، ويكون ذلك بعد نحو ٤-٦ أشهر من الزراعة. ويمكن زيادة المحصول الجاف بجمع القرون التى تجف أولاً حتى لا تنشط وتسقط منها البذور، ثم تقلع النباتات بعد جفافها وتدرس لاستخلاص البذور منها.

ثالثاً: البسلة السكرية

تُحصد البسلة السكرية التى تزرع لأجل قرونها الكاملة بمعدل ٣-٤ مرات أسبوعياً على مدى ٢-٣ أشهر. ويجب أن يستمر الحصاد حتى إذا كانت الأسعار منخفضة لكى تستمر النباتات فى النمو.

ويكون حصاد طراز المنجتوه (أو الـ snow peas) فى مرحلة مبكرة جداً من النمو، وبمجرد التعرف على مواضع البذور فى القرن، وهى مازالت صغيرة جداً. ويمكن من خلال التعرف على خصائص نمو القرن فى كل صنف تحديد الموعد المناسب للحصاد، وهو الذى يصل فيه القرن إلى أقصى نمو طولى وعرضى له قبل أن تبدأ البذور فى الزيادة فى الحجم.

أما حصاد طراز البسلة المتقصفة snap peas (السكرية) فإنه يكون عند امتلاء القرن بالبذور بعد بلوغ البذور نصف حجمها الكامل، ولكن قبل أن تصل إلى حجمها الكامل. ومن الطبيعى أن المحصول يزداد كلما تأخر الحصاد، ولكن يصاحب ذلك احتمال تخطى القرون للمرحلة المناسبة للحصاد.

التنفس وإنتاج الإثيلين

يتباين معدل تنفس البسلة العادية والسكرية حسب درجة الحرارة، كما يلى:

معدل التنفس (مليلتر ثانى أكسيد كربون/كجم فى الساعة)	الحرارة (م°)
٢٤-١٥	صفر

معدل التنفس (ملليتر ثاني أكسيد كربون/كجم في الساعة)	الحرارة (م°)
٢٧-٣٨	٥
٣٤-٥٩	١٠
٨٩-١٠١	١٥
١٢٣-١٨٠	٢٠

يقال إنتاج قرون البسلة السكرية من الإثيلين عن ٠.١ ميكروليتر/كجم في الساعة على ٢٠ م°

وتعد البسلة السكرية متوسطة الحساسية للإثيلين الذي قد تتعرض له من مصادر خارجية ويؤدي استمرار تعرض القرون لتركيز منخفض من الإثيلين أثناء التخزين والشحن إلى اصفرار القرون وتحللها. ويعد كأس القرن أكثر حساسية للإثيلين عن القرن ذاته ، حيث يبدأ في الجفاف (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧).

التداول

يتم أولاً استبعاد القرون الزائدة النضج ذات اللون الأصفر، والقرون الخالية من البذور والتي تكون مسطحة، وكذلك القرون المصابة بالأمراض والحشرات، ثم تُعرض باقى القرون لتيار من الهواء لإزالة البقايا النباتية المختلطة بها. ويلى ذلك إجراء عملية التبريد الأولى للتخلص من حرارة الحقل، وذلك بغمر القرون في الماء المثلج. وتبرد البسلة السكرية بطريقة الدفع الجبرى للهواء البارد.

يمكن تبريد البسلة مبدئياً من حرارة ٢١ م° إلى ١ م° فى خلال حوالى ١٢ دقيقة بغمرها فى ماء مثلج على حرارة الصفر المئوى. كذلك يمكن إجراء التبريد الأولى بالتفريغ، ولكن يتعين بلّ القرون بالماء أولاً حتى لا تفقد رطوبتها. ومتى كانت القرون مبتلة (بسبب التبريد الأولى بالماء المثلج، أو بسبب إضافة الثلج المجروش إلى القرون فى العبوات)، فإن حرارة التخزين يجب ألا ترتفع أبداً عن ١ م° وإلا تعرضت القرون للإصابة بالأعفان. ويمكن إجراء التبريد الأولى بطريقة الدفع الجبرى للهواء، وتعد تلك هى الطريقة المفضلة لتبريد البسلة السكرية (Morris & Jobling ٢٠٠٧)

الفصل التاسع: البسلة

ويتم في الولايات المتحدة تدريج البسلة الخضراء إلى سبع رتب حسب حجم البذور كما هو مبين في جدول (٣-٩)، كما يتم في المملكة المتحدة تدريج البسلة إلى الرتب الخمس التي سبق بيانها في جدول (١-٩) على أساس قراءة التندروميتر. وعلى الرغم من وجود علاقة مؤكدة بين حجم البذور وقراءة جهاز التندروميتر في الصنف الواحد، إلا أن هذه العلاقة لا وجود لها لدى مقارنة أصناف مختلفة من البسلة كما هو مبين في جدول (٤-٩).

جدول (٣-٩): قطر البذور في الرتب المختلفة من البسلة (Shoemaker ١٩٥٣).

الرتبة	قطر البذرة ($\frac{1}{16}$ من البوصة)
١	$9.9 >$
٢	$9.0 > 10.0$
٣	$10.0 > 11.0$
٤	$11.0 > 12.0$
٥	$12.0 > 13.0$
٦	$13.0 > 14.0$
٧	14.0 فأكثر

جدول (٤-٩): العلاقة بين قراءة التندروميتر، وحجم البذرة في عدد من أصناف البسلة (Arthey ١٩٧٥).

الرتبة	قراءة التندروميتر	متوسط حجم البذرة ^(١)
ميزار Myzar	١٠٠	٦.٠
	١٢٠	٨.٠
سباركل Sparkle	١٠٠	٦.٠
	١٢٠	٨.٠
سبايت Spite	١٠٠	٥.٠
	١٢٠	٧.٠
دارت Dart	١٠٠	٢.٠
	١٢٠	٣.٥

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

تابع جدول (٩-٤).

الرتبة	قراءة التندروميتر	متوسط حجم البذرة ^(١)
سربراير Surprise	١٠٠	٤٠
	١٢٠	٤٥
دارك سكنديرفكش Dark Skinned Perfection	١٠٠	٦٠
	١٢٠	٨٠
بوجت Puget	١٠٠	٤٠
	١٢٠	٥٥

(١) متوسط حجم البذور على مقياس من صفر (= بذور صغيرة جدًا) إلى ٩ (= بذور كبيرة جدًا).

التخزين

تفقد بذور البسلة الخضراء جزءاً كبيراً من محتواها من السكر إن لم تخزن سريعاً في درجة حرارة منخفضة وأفضل ظروف للتخزين هي الصفر المئوي مع رطوبة نسبية من ٩٥٪-٩٨٪. تحتفظ البذور بوجودها تحت هذه الظروف لمدة ٧-١٤ يوماً، وتزداد مدة التخزين نحو سبعة أيام أخرى إذا خلطت القرون مع الثلج المجروش أثناء التخزين ويفضل دائماً تخزين قرون البسلة كاملة؛ أي بدون تقشير (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨). وتخزن قرون البسلة السكرية في نفس الظروف لمدة أسبوعين وبعدها تذبل، القرون وتصفّر، وتفقد طراوتها، ويتكون بها النشا وتظهر بها الأعفان، ويزداد معدل ظهور تلك الأعراض في الحرارة التي غالباً ما تسوق عليها البسلة والتي تتراوح بين ٥، و ١٠ م°.

وقد أمكن تخزين قرون البسلة السكرية المتقصفة صنف مانوا شوجر Manoa Sugar على ١٠ م° لمدة ١٤ يوماً في الهواء العادي دون أن تحدث تغيرات تذكر في خصائص الجودة التي تم قياسها (التغيرات في المظهر العام، والوزن، وتركيز الكلوروفيل، ونسبة السكريات الكلية، ونسبة المواد غير الذائبة، ونسبة البروتين الذائب)، ولكن المظهر العام كان أفضل في الهواء المتحكم في مكوناته (٢٤٪ أكسجين + ٢،٦٪ ثاني أكسيد

الفصل التاسع: البسلة

كربون) مقارنة بالتخزين فى الهواء العادى، بينما ظهر الفرق واضحاً عندما استمر التخزين تحت هذه الظروف لمدة ٢١ يوماً، حيث كان مظهر البسلة المخزنة فى الهواء المتحكم فى مكوماته أفضل عما فى حالة التخزين فى الهواء العادى، واستمر مستوى الكلوروفيل والسكريات الذائبة عالياً بينما انخفض تركيز المواد الصلبة غير القابلة للذوبان. أما عندما كان التخزين فى ١ م، فقد احتفظت القرون بوجودها سواء أكان التخزين فى الهواء العادى، أم فى الهواء المتحكم فى مكوناته (Ontai وآخرون ١٩٩٢).

وتستفيد البسلة العادية قليلاً من التخزين فى ٢٪ إلى ٣٪ أكسجين + ٢٪ إلى ٣٪ ثاني أكسيد كربون.

وقد أدت تعبئة البسلة المنجته snow peas (السكرية الجلدية) فى أغشية بوليميرية من الـ polymethyl pentene بسمك ٢٥ أو ٣٥ ميكرون، مع التبريد الأول والتخزين على ٥ م إلى تعديل الهواء فى العبوات إلى حوالى ٥٪ أكسجين، و ٥٪ ثاني أكسيد كربون، والمحافظة على جودة القرون خارجياً (المظهر واللون)، وداخلياً (محتوى الكلوروفيل وحامض الأسكوربيك والسك)، وكذلك جودة القرون الأكلية. وقد توافقت تلك النتائج مع نتائج دراسة خزنت فيها البسلة فى جو متحكم فى مكوناته يحتوى على ٥٪ إلى ١٠٪ أكسجين _ ٥٪ ثاني أكسيد كربون، حيث كانت التغيرات فى محتوى القرون من الأحماض العضوية، والأحماض الأمينية الحرة، والسكريات تحت هذه الظروف قليلة، كما كان مظهر القرون فيها أفضل بكثير من مظهرها فى حالة التخزين فى الهواء العادى على ٥ م. وقد ظهر طعم غير مرغوب فى القرون التى خزنت فى ٢,٥٪ أو ٥٪ أكسجين + ١٠٪ ثاني أكسيد كربون، ولكن ذلك الطعم اختفى جزئياً بعد تهوية القرون (Pariasca وآخرون ٢٠٠٠).

وتبدأ البسلة السكرية فى التجمد على حرارة -٠,٦ م؛ فتصبح القرون مائية المظهر وسريعاً ما تتحلل بواسطة بكتيريا العفن الطرى البكتيرى (Suslow & Cantwell ٢٠٠٧)

التصدير

يمتد موسم تصدير البسلة بنوعيها - الخضراء العادية والسكرية - من أكتوبر إلى أبريل.

ويتعين تبريد الحاويات التي تستخدم في شحن البسلة إلى الصفر المئوي مع عدم ارتفاع حرارتها عن ١°م، ومع توفير تهوية بمعدل ١٥م^٣/ساعة (١٠ قدم^٣/دقيقة) في الحاويات الـ ٢٠ قدم/ وبمعدل ٣٠م^٣/ساعة (٢٠ قدم^٣/دقيقة) في الحاويات الـ ٤٠ قدم، ومع توفير رطوبة نسبية ٩٠٪-٩٥٪ تبقى البسلة تحت هذه الظروف بحالة جيدة لمدة ٧-١٤ يومًا ويراعى أن البسلة تتجمد على -٠,٦°م (Optimal Fresh ٢٠٠١ - الإنترنت)

الفصل العاشر

الخضر الثمرية الأخرى

يتضمن هذا الفصل الخضر الثمرية غير تلك التي ورد بيانها في الفصول التسعة الأولى من هذا الكتاب.

الباذنجان

يبدأ نضج ثمار الباذنجان عادة بعد ٢,٥-٣ أشهر من الشتل، ويستمر الحصاد لمدة معاشلة. تصبح الثمار في مرحلة النضج الاستهلاكي عندما تصل إلى ثلثي حجمها الكامل، ويكون ذلك بعد ١٥-٤٠ يوماً من التلقيح حسب الصنف ودرجة الحرارة، وتقطف فيما بين وصولها إلى ثلثي حجمها الكامل، ووصولها إلى حجمها الكامل، ولكن قبل أن تبدأ بذورها في التصلب.

ويمكن التعرف على مرحلة النضج المناسبة للحصاد بالضغط على الثمرة بالإبهام، فإذا اندفع جلد الثمرة إلى مكانه الأول بسرعة بعد رفع الإصبع، دل ذلك على أنها مازالت غير ناضجة، أما إذا عاد الجلد لوضعه الأول ببطء شديد، دل ذلك على أنها زائدة النضج. وتعد الثمار المناسبة للاستهلاك وسطاً بين الحالتين (Sims وآخرون ١٩٧٨، Ware & MaCollum ١٩٨٠).

وإذا تعدت الثمار مرحلة النضج المناسبة للاستهلاك، فإنها تتحول إلى اللون البرونزي، وتتصلب قشرتها وبذورها، وتكتسب طعماً لاذعاً.

ويتناسب محصول الباذنجان طردياً مع التأخر في حصاد الثمار، إلا أن ذلك صاحبه احتمالات تعدى الثمار لمرحلة النضج المناسبة للاستهلاك. وإذا حدث ذلك .. فلا بد من حصاد هذه الثمار والتخلص منها، وذلك لأن تركها على النبات يُعجل من شيخوخته، ويؤدي إلى نقص المحصول

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

وتحصد الثمار بأعناقها كل ٣-٥ أيام فى الأصناف ذات الثمار الطويلة، وكل ٥-١٠ أيام فى الأصناف ذات الثمار الكروية والبيضية، حيث تقصر المدة بين الجمعات فى الجو الحار وتطول فى الجو البارد يقطع عنق الثمرة بالسكين، أو باستعمال مقص تقليم نظراً لأنه يكون متصلباً عند وصول الثمرة إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد

التغيرات الكيميائية الحيوية المصاحبة لنمو الثمار ونضجها

تكون نسبة المواد الصلبة الكلية فى الثمار أعلى ما يمكن عند الإزهار (فى ميايض الأزهار)، وتقل سريعاً لعدة أيام، ثم تبقى عند مستوى ثابت حتى النضج وتكون نسبة السكريات الكلية منخفضة وفى حدود ٢٪-٣,٥٪.

أما الطعم القابض فيكون أعلى ما يمكن عند الإزهار، ثم ينخفض بعد ذلك، ويكون الانخفاض سريعاً فى البداية، ثم بطيئاً فى المراحل التالية (Nothmann ١٩٨٦)

كان تركيز البولى أمينات: بوترسين putrescine، واسبرميدين spermidine منخفضاً ومتساوياً (١,٦٧ نانومول/جم نسيج طازج) عند بداية تكوين الثمرة (بعد ٣-٥ أيام من سقوط البتلات). ولم تلاحظ أية تغيرات جوهرية فى تركيز الاسبرميدين أثناء نمو الثمرة، ولكن ازداد تركيز البوترسين ووصل إلى أعلى مستوى له، وهو ١٧,٤ نانومول/جم فى اليوم التاسع بعد سقوط البتلات، ثم انخفض بعد ذلك إلى مستواه الابتدائى. وبداية من اليوم التاسع لسقوط البتلات حدثت زيادة سريعة فى وزن الثمرة وحجمها، وكان تركيز السكر فى أعلى مستوياته. أما إنتاج الإثيلين فقد انخفض - مع تطور تكوين الثمرة - من ١٤,٢٣ إلى ١,٥ ميكروليتر/كجم فى الساعة، وظل منخفضاً خلال المراحل المتأخرة من تكوينها (Rodriguez وآخرون ١٩٩٩).

التنفس وإنتاج الإثيلين

تباين معدل تنفس ثمار الباذنجان (بالليجرام ثانى أكسيد كربون لكل كيلوجرام

الفصل العاشر: الخضر الثمرية الأخرى

فى الساعة) كما يلى :

الطراز	معدل التنفس
الأمريكى	٣٩-٣٠
الأبيض البيضى	٦١-٥٢
اليابانى	٦٩-٦٢

أما معدل إنتاج الإثيلين من ثمار الباذنجان فيبلغ ٠,٧-٠,١ ميكروليتر لكل كيلوجرام من الثمار فى الساعة.

وتعد ثمار الباذنجان متوسطة إلى عالية الحساسية للإثيلين الذى تتعرض له. ويؤدى تعرض الثمار لتركيز من الغاز يزيد عن جزء واحد فى المليون أثناء الشحن أو التخزين إلى انفصال الكأس والتلون البنى والتدهور العام فى الجودة (Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

التداول

يتطلب تصدير الباذنجان تعبئته فى صناديق كرتونية، وتبريده أولياً بطريقة الدفع الجبرى للهواء، قبل شحنه على حرارة ١٠°م ورطوبة نسبية ٨٥٪-٩٠٪.

ولا يوصى بتبريد الباذنجان أولاً بطريقة الماء البارد hydrocooling لأن الماء قد يترك بقعاً على سطح الثمرة، ولأن هذه الطريقة قد تكون قليلة الكفاءة بالنظر إلى اتساع مسطح الثمرة الخارجى بالنسبة إلى حجمها. وقد يكون التبريد فى الغرف المبردة كافياً إن أمكن خفض درجة حرارة لب الثمرة إلى ١٣-١٥°م فى خلال ٢٤ ساعة من الحصاد (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

التخزين المبرد العادى

إن الظروف المثلى لتخزين ثمار الباذنجان هى حرارة ١٠-١٢°م، مع رطوبة نسبية ٩٠٪-٩٥٪. وتقل فترة تخزين الباذنجان - عادة - عن ١٤ يوماً، حيث تتدهور

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

جودته بعد ذلك، فيصاب بالأعفان غالباً، وخاصة بعد نقله من المخزن إلى أسواق البيع. ويؤدي تخزين الباذنجان لفترة قصيرة على حرارة أقل من ١٠°م - بهدف الحد من الفقد في الوزن - إلى إصابة الثمار بأضرار البرودة (Thompson ٢٠٠٣)

ويزداد الفقد الرطوبي من الباذنجان الياباني كثيراً عن الباذنجان الأمريكي القياسي، حيث تبلغ سرعة فقده للماء ثلاثة أضعاف سرعة فقد الباذنجان الأمريكي، ويترتب على ذلك سرعة فقده للمعان الجلد الذي يتكرمش، ويصبح اللب أسفنجياً والكأس بنياً

هذا مع العلم بأن الطراز الأمريكي هو الباذنجان القياسي (الكروى إلى البيضاضى) ذات اللون القرمزى الداكن، والياباني ذات ثمار مطاوله ورفيعة لونها قرمزي فاتح إلى داكن وسريع التلف، والصيني ذات ثمار مطاوله ورفيعة لونها قرمزي فاتح (Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

لا يجب أبداً تعريض ثمار الباذنجان للتلج، كما لا يجب وضعه في نفس المكان مع المنتجات ذات الروائح النفاذة مثل البصل لامتناعه لتلك الروائح (Siller-Cepeda ٢٠٠٤).

يبدأ تجمد ثمار الباذنجان على حرارة -٠.٨°م ومن أبرز أعراض أضرار التجمد - بعد تفكك الثمار - اللب المائي المظهر الذي يكتسب لوناً بنياً، والذي يفقد رطوبته بسرعة ملحوظة (Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

أضرار البرودة

ظهرت أعراض أضرار البرودة على ثمار الباذنجان بعد ٣٢ يوماً من التخزين على ٧.٢°م، وذلك على صورة تلون بني داخلي واحتراق (انسحاق) وتلون بني سطحي، وتنقيير وأعفان، وكلها أعراض قد لا تظهر إلا بعد إخراج الثمار من المخزن المبرد ويمكن أن تختلط تلك الأعراض بأعراض الإصابة بأضرار التركيزات العالية لثاني أكسيد الكربون

الفصل العاشر: الخضر للثمرة المخزنة

أما على ٥°م، فإن أضرار البرودة تظهر في خلال ٦-٨ أيام.

وتتباين طرز المظاهر في الفترة التي تبداً بعدها أضرار البرودة في الظهور لدى تعرضها لدرجة مختلفة، كما يلي:

الطرز/الحرارة (°م)	صفر	٢,٥	٥	٧,٥
الأمريكي	٢-١	٥-٤	٧-٦	١٢
الياباني	—	٦-٥	٨-٩	١٤-١٢
الصيني	٣-٢	٦-٥	١٢-١٠	١٦-١٥

(عن Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

ومن أهم مظاهر إصابة الثمار بأضرار البرودة، ما يلي:

- ١- تكون النقر السطحية.
- ٢- التلون البني الداخلي لنسيج المشيمة، واكتساب البذور والحزم الوعائية لوناً بنياً.
- ٣- ظهور أعراض الانسحاق Scalding، وهي ظاهرة تكون مساحات أو بقع بنية على سطح الثمرة، تصبح غائرة بمرور الوقت.
- ٤- في النهاية تكتسب الثمار لوناً برونزياً.
- ٥- تزداد حساسية الثمار للإصابة بفطر الألترياريا *Alternaria* بعد إخراجها من المخزن.

وتزداد الحساسية للبرودة في الثمار التي تتكون في الجو البارد نسبياً عما في تلك التي تتكون في الجو الدافئ. فمثلاً.. كانت الثمار التي حصدت خلال فصل الشتاء (ديسمبر ويناير) أكثر حساسية للإصابة بأضرار البرودة عند تخزينها على ٦° أو ٨°م (مع ٨٧٪-٩٠٪ رطوبة نسبية) عن تلك التي حصدت في الربيع (مارس وأبريل) (Fallik وآخرون ١٩٩٥). هذا.. مع العلم بأن للحرارة المنخفضة تأثير متجمع، وقد يبدأ من الحقل.

وقد أجريت بعض المعاملات بهدف الحد من ظهور أضرار البرودة، فمثلاً . أدت التدفئة المتقطعة intermittent warming لثمار الباذنجان بالتخزين لمدة ٣ أيام على حرارة ٢,٥ + ٣ أيام على حرارة ١٢,٥ م° + ٣ أيام على حرارة ٢٠,٥ م° + ٣ أيام على حرارة ٢٠ م° . أدت إلى تأخير ظهور أعراض أضرار البرودة بنحو أسبوع مقارنة بموعد ظهورها في ثمار الكنتروال التي خزنت على حرارة ٢,٥ م° لمدة ٩ أيام ثم لمدة ٣ أيام على حرارة ٢٠ م° (Mancarelli وآخرون ١٩٩١). وقد حصل Kluge وآخرون (١٩٩٨) على نتائج معاكسة عندما عرضت ثمار الباذنجان التي خزنت تخزيناً بارداً لمدة ٢١ يوماً للتدفئة كل ٣، أو ٤، أو ٥، أو ٦ أيام، حيث لم تُصب الثمار بأضرار البرودة

وأدى تخزين الثمار التي عوملت بالمطهرات في أكياس بلاستيكية قليلة الكثافة وغير مثقبة (بمعدل ١٢-١٤ ثمرة/كيس في طبقتين) إلى إمكان تخزينها على ٨ م° لأكثر من ثلاثة أسابيع دون أن تصب بأضرار البرودة، بينما ظهرت على الثمار التي طهرت سطحياً ولم توضع في الأكياس أضراراً شديدة من جراء البرودة بعد ثلاثة أسابيع من تخزينها على ٨ م°، هذا مع العلم بأن حرارة الثمار التي وضعت في الأكياس كانت دائماً أعلى بمقدار ٠,٥-١,٠ م° عن حرارة المخزن (Fallik وآخرون ١٩٩٥).

التغيرات المصاحبة للثمار أثناء تخزينها وشحنها

إن من أهم التغيرات التي تطرأ على الثمار بعد حصادها، ما يلي:

- ١- يبدأ تدهور ثمرة الباذنجان بعد الحصاد بفقدانها للمعانة وصلابتها، ثم انكماشها بسبب فقدانها للرطوبة، وفقدانها للونها بسبب تحليل صبغاتها.
- ٢- تتأثر ثمار الباذنجان سلبياً بالإيثيلين، الذي يؤدي إلى انفصال الكأس عن الثمار وتعفنهما (عن Nothmann ١٩٨٦).
- ٣- ظهور أضرار البرودة إذا تعرضت الثمار أثناء تخزينها أو شحنها لحرارة ٧ م° أو أقل من ذلك

التخزين في الجو المعدل والجو المتحكم في مكوناته

تغلف الثمار في أغشية من البوليثلين أو البولي فينيل كلورايد، بهدف الحد من فقدتها للرطوبة، وخفض معدل تنفسها، بتكوين الأغشية لجو معدل modified atmosphere يحيط بالثمار.

ونظرًا لأن المستوردين الأوروبيين لا يفضلون تغليف ثمار الباذنجان - كل على انفراد - بأغشية البولي فينيل كلورايد المطاطة التي تلتصق بالثمار، لأنه يتعين إزالتها قبل عرض الثمار للتسويق، فقد أمكن استبدال هذه الطريقة بأخرى عولمت فيها الثمار بمبيد فطري مع NAA ثم وضعت كل ١٠-١٥ ثمرة معًا في أكياس من البوليثلين غير المثقب داخل الكراتين، ووضع معها داخل الكيس - الذي يكون مبطّنًا للكرتونة - ١٠ طبقات من المناديل الورقية لمنع تكثف الرطوبة. وقد منعت هذه الطريقة لتخزين الباذنجان فقد الوزن وحافظت على نوعية الثمار خلال فترة تخزينها التي دامت لمدة ١٤ يومًا على ١٢°م، ثم لمدة ٣ أيام إضافية على ٢٠°م (Fallik وآخرون ١٩٩٤ ب).

كذلك كان تخزين الثمار وهي مغلقة في أغشية الـ PVC المثقبة أو غير المثقبة على حرارة ١٢°م أفضل من عدم التغليف في حرارة ٤°م، أو ٨°م، أو ٢٤°م، وأفضل من التغليف في حرارة ٤°م، أو ٨°م. خزنت الثمار بهذه الطريقة لمدة ١٦ يومًا دون أن تظهر عليها أى أعراض للتدهور أو أضرار البرودة، وكان الفقد في الوزن خلال فترة التخزين ١,٨٪ فقط (١,٧٩٪ في الأغشية المثقبة، و ١,٨١٪ في الأغشية غير المثقبة) (Henz & Silva ١٩٩٥).

وعلى الرغم من أن ثمار الباذنجان التي عُبئت في أغشية من البوليثلين ذات الكثافة المنخفضة LDPE داخل صناديق كرتونية على حرارة ٢٠°م احتفظت بنضارتها لمدة ٧-١٤ يومًا حسب الصنف، إلا أن كؤوس الثمار أصيبت بنسبة أعلى من الأعفان التي سببتها فطريات *Cladosporium spp.* و *Alternaria sp.* مقارنة بما حدث في الثمار التي لم تعبأ في أغشية البوليثلين (Diaz-Perez ١٩٩٨).

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضو الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ويؤدى بقاء الثمار فى مستوى منخفض من الأكسجين (٣٪-٥٪) إلى تأخير تدهورها وتعفنها لأيام قليلة ويتحمل الباذنجان زيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون حتى ١٠٪، ولكنه لا يفيد فى زيادة فترة صلاحيته للتخزين لأكثر مما يوفره نقص الأكسجين (Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

وقد أدت زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون إلى ٥٪ أو ٨٪ أو ١٢٪ إلى تلون الثمار خارجياً باللون البنى، ولكن لم تفقد الثمار صلابتها وقد كانت الثمار الكروية والبيضية الشكل أكثر تحملاً لزيادة تركيز الغاز عن الثمار الطويلة (Mencarelli وآخرون ١٩٩١).

وقد قام Kaynas وآخرون (١٩٩٥) بتخزين ثمار الفلفل على حرارة ١٢°م لمدة ٤٢ يوماً فى الهواء العادى، أو فى هواء معدل فى عبوات modified atmosphere packages (اختصاراً: MAP) باستعمال أغشية مثقبة أو غير مثقبة من البولييثيلين ذات الكثافة المنخفضة LDPE والبولى فينايل كلوريد PVC، أو فى الهواء المتحكم فى مكوناته controlled atmosphere (اختصاراً: CA) يحتوى على ٣٪ O_2 + ٣٪ CO_2 ، أو ٥٪ O_2 + ٥٪ CO_2 ، أو ١٠٪ CO_2 + ٥٪ O_2 ، وقيمت حالة الثمار بعد أسبوعين، وأربعة، وستة أسابيع، بعد انتهاء فترة التخزين البارد مباشرة، وبعد ثلاثة أيام إضافية على ٢٠°م، وكانت النتائج كما يلى:

١ - ازدادت معدلات زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة، ومعدلات نقص الحموضة، ونسبة النشا، ونسبة حامض الأسكوربيك فى الثمار التى خزنت فى الهواء العادى عما فى تلك التى خزنت فى الـ MAP أو فى الـ CA.

٢ - كان الفقد فى الوزن أعلى جوهرياً فى حالة التخزين فى الهواء عما فى جميع معاملات التخزين الأخرى.

٣ - كان الفقد فى الوزن أعلى جوهرياً عندما كان التخزين فى الـ MAP عما كان عليه الحال فى الـ CA بعد أسبوعين من بداية التخزين، ولكن هذا الفرق اختفى بعد

٤. و ٦ أسابيع

الفصل العاشر: الخسران الترمية الأخرى

- ٤ - أضرَّ التخزين في ١٠٪ CO_2 لمدة أكثر من أسبوعين بشدة بثمار الباذنجان حيث تغير لون الثمار الخارجى وظهر اصفرار على الكأس، ولكن تلك الأعراض كانت أقل وضوحاً عندما كانت نسبة CO_2 ٥٪.
- ٥ - كانت أفضل نوعية للثمار عندما كان التخزين فى الـ MAP باستعمال الـ PVC، أو فى الـ CA فى وجود ٣٪ O_2 + ٣٪ CO_2 ، حيث احتفظت الثمار بجودتها لمدة ٦ أسابيع.

وسائل إطالة فترة صلاحية الثمار للتخزين

أجريت محاولات عديدة، بهدف زيادة فترة صلاحية ثمار الباذنجان للتخزين، نذكر منها ما يلى:

- ١ - محاولات الحد من أضرار البرودة، وقد أسلفنا بيانها.
- ٢ - المعاملات الكيميائية (المبيدات الفطرية ومنظمات النمو)، بهدف الحد من إصابة الثمار بالأعفان وتأخير وصولها إلى مرحلة الشيخوخة، فمثلاً:
- أ - أدى غمس ثمار الباذنجان فى محلول ٠,٥٪ سانوسيل ٢٥ Sanosil-25 (الذى يحتوى على ٤٨٪ فوق أكسيد الأيدروجين H_2O_2) إلى تقليل أعفان الثمار بعد الحصاد وأثناء التخزين مع إطالة فترة صلاحيتها للتخزين مقارنة بثمار الكنترول التى لم تعط هذه المعاملة (Fallik وآخرون ١٩٩٤).
- ب - أدى غمس كأس ثمرة الباذنجان فى محلول يحتوى على ٢٠٠ جزء فى المليون من نفضالين حامض الخليك NAA، و ٩٠٠ جزء فى المليون من البروكليوراز prochloraz إلى تأخير شيخوخة الكأس وعفن الثمرة، وكان غمس الثمرة كلها أفضل من غمس كأسها فقط. وأمكن بهذه الطريقة تخزين الثمار لمدة ١٤ يوماً على حرارة ١٢ م°، ثم لمدة ٣ أيام على حرارة ٢٠ م° ظل خلالها كأس الثمرة محتفظاً برواقه واخضراره، واحتفظت خلالها الثمرة بصلابتها، بينما لم تتعد نسبة الإصابة بالأعفان ٥٪. وكان المتبقى من المبيد فى الثمار التى غمست بأكملها - بعد فترة التخزين - ٠,٣٤ مجم/لتر (Temkin-Gorodeiski وآخرون ١٩٩٣).

الباذنجان المجهز للمستهلك

أدت تعبئة الباذنجان المجهز للمستهلك fresh-cut فى MAP إلى زيادة فترة احتفاظ الشرائح بجودتها، حيث أدت زيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون إلى نقص نشاط الإنزيمات polyphenol oxidase، و pectin methylesterase، و β -galactosidase، بينما أدت المعاملة بحامض الستريك إلى خفض نشاط إنزيم البولي فينول أو كسيديز فقط (Catalano وآخرون ٢٠٠٧).

البامية

النضج والحصاد

يبدأ حصاد البامية بعد ٤٥-٥٠ يوماً من الزراعة فى العروة الخريفية، و ٦٠-٧٥ يوماً فى العروة الصيفية المتأخرة، و ٨٠-١٠٠ يوماً فى العروتين. الصيفية المبكرة، والشتوية ويستمر الحصاد لمدة ٢-٥ أشهر حسب الحالة الجوية.

تجمع القرون - وهى مازالت صغيرة - قبل أن تتخشب وقبل أن تبلغ البذور نصف حجمها الطبيعى، ويكون ذلك بعد ٤-٦ أيام من التلقيح فى الأصناف الأمريكية التى تؤكل ثمارها وهى كبيرة، وبعد فترة أقل من ذلك فى الأصناف المصرية التى تؤكل ثمارها وهى صغيرة. وأياً كان الصنف المزروع .. فإن تأخير حصاد الثمار عند مرحلة النضج المناسبة للاستهلاك يؤدى إلى سرعة تليفها، خاصة فى الجو الحار ولذا .. فإن الحصاد يجرى يومياً فى الجو الحار، وكل يومين فى الجو الدافئ، وكل ٤-٥ أيام فى الجو البارد. ونظراً لأن الأزهار تتكون يومياً؛ لذا فإن الثمار تتفاوت فى الحجم عند الحصاد، مما يستدعى ضرورة تقسيمها إلى رتب مختلفة.

تكون صفات الجودة لقرون البامية عالية نسبياً فى اليوم الرابع من تفتح الزهرة، وتزداد جودة الثمار حتى اليوم السادس، ثم تنخفض حتى اليوم العاشر إلى الثانى عشر، وبعد ذلك تكون القرون متليفة ولا تصلح للاستهلاك. ويكون المحصول الصالح

الفصل العاشر: الخضر للتمدية الأخرى

للتسويق والقيمة الغذائية للقرون أعلى ما يمكن عند حصاد القرون بين اليوم السادس والتاسع من تفتح الأزهار. هذا مع العلم بأن الثمار الصغيرة جداً تكون عشبية الطعم grassy (عن Salunkhe & Kadam ١٩٩٨).

ويؤدى تأخير حصاد البامية عن الموعد المناسب للنضج الاستهلاكى إلى ضعف النمو والإزهار التالى. وقد تأكد ذلك من دراسات Harvey (١٩٣١) الذى قام بقطع البراعم قبل تفتحها بأربع وعشرين ساعة، وقطع الثمار بعد تفتح الأزهار بأربع وعشرين ساعة، أو ٤-٥ أيام، أو ١٠-١٢ يوماً فى معاملات مختلفة، ووجد علاقة عكسية واضحة بين نمو الثمار والنمو الخضرى. وكان التأثير المضعف للإثمار على النمو الخضرى أقوى فى مراحل النمو الثمرى الأولى عما بعد ذلك.

كما تبين من دراسات Perkins وآخرين (١٩٥٢) أن لنضج بذور البامية تأثيراً مثبطاً قوياً على نمو النبات، حيث توقف تكوين ثمار جديدة إلى أن اكتمل تكوين ونضج البذور فى القرون التى تركت بدون حصاد. وتميزت هذه النباتات التى تركت فيها القرون بدون حصاد بأن إثمارها كان فى موجات، وذلك بسبب توقف النمو الخضرى لحين نضج القرون الجديدة المتكونة. هذا .. بينما استمرت النباتات التى حصدت ثمارها وهى صغيرة فى النمو، وإنتاج ثمار جديدة. ولهذا السبب يجب حصاد جميع القرون التى تتخطى مرحلة النضج المناسبة للاستهلاك والتخلص منها، وعدم تركها على النبات.

وتعرف القرون التى تخطت مرحلة النمو المناسبة للاستهلاك بأن أطرافها لا تنقص - ولكن تلتوى - عند محاولة ثنيها بالأصابع.

وبينما تحصد الثمار لأجل التصنيع بدون أعناق، فإن ثمار محصول الاستهلاك الطازج تزال منها الأعناق يدوياً بالسكين.

ونظراً لوجود بعض الأشواك على قرون البامية، فإن استعمال القفازات عند الحصاد قد يكون ضرورياً لمن يكون لديهم حساسية منها.

تكنولوجيا وقسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر النمرية - التداول والتخزين والتصدير

كما يفيد ارتداء القائمين بالحصاد قمصان بأكمام طويلة في حمايتهم من الأشواك الكثيرة التي توجد بنموات البامية الخضرية، والتي قد تسبب للبعض منهم حساسية جلدية

ويتراوح المحصول الجيد للبامية التي تحصد لأجل الاستهلاك الطازج بين ٤، و ١٠ أطنان للفدان.

التنفس وإنتاج الإثيلين

تتباين البامية في معدل التنفس حسب درجة الحرارة، كما يلي:

معدل التنفس (ملليمتر ثاني أكسيد كرون / كجم في الساعة)	الحرارة (م)
٣٠-٢٧	٥
٤٧-٤٣	١٠
٧٢-٦٩	١٥
١٣٧-١٢٤	٢٠

تنتج قرون البامية الإثيلين بمعدل منخفض يقل عن ٠,٥ ميكروليتر/كجم في الساعة. كما أن تعرض البامية للإثيلين من مصدر خارجي بتركيز يزيد عن ميكروليتر واحد/كجم لمدة ٣ أيام يؤدي إلى زيادة سرعة اصفرار القرون (عن Cantwell & Suslow ٢٠٠٧).

التداول

يجب تداول البامية بعد الحصاد بحرص شديد لأن أي كدمات أو جروح تحدث بها أثناء التداول تتحول في خلال ساعات قليلة إلى اللون الأسود. ولهذا السبب يتعين ارتداء القائمين بعمليات الحصاد والتداول قفازات قطنية ناعمة.

(تفصيل)

تد يمكن غسل البامية بالرش أو بالغمر في الماء في أحواض، ويوصى باستعمال

الفصل العاشر: الخضر البامية الخضراء

ماء مضاف إليه الكلورين الحر بتركيز ٧٥-١٠٠ جزء في المليون، مع ضرورة التخلص من الماء الزائد على سطح الثمار بعد الغسيل.

التدريب

يتعين تدريب القائمين بعملية الحصاد على تدريب ثمار البامية أثناء حصادها، واستبعاد المتليفة منها (وهي التي تخطت مرحلة النمو المناسبة للحصاد) أولاً بأول.

وتدرج البامية - في الولايات المتحدة - إلى ٣ أحجام، كما يلي:

- ١ - فاخرة fancy .. وهي التي لا يزيد طولها عن ٩ سم.
- ٢ - المختارة بعناية Choice .. وهي التي يتراوح طولها بين ٩، و ١١ سم.
- ٣ - الضخمة jumbo .. وهي التي يزيد طولها عن ١١ سم، ولكنها تكون ما زالت غضة.

التعبئة في عبوات المستهلك

يفيد تعبئة القرون في أغشية مثقبة في خفض فقد الرطوبة، وتجنب إصابتها بالأضرار الفيزيائية.

التبريد الأولي

يؤدي ترك قرون البامية في سلال كبيرة لمدة ٢٤ ساعة بعد الحصاد - دون تبريد - إلى فقدتها لجزء كبير من لونها الأخضر.

ونظراً لسرعة تدهور البامية بعد الحصاد - بسبب ارتفاع معدل تنفسها - فإنه يتعين سرعة تبريدها أولاً إلى ١٢°م للتخلص من حرارة الحقل. ولا يوصى بالتبريد الأولي باستعمال الماء الثلج لأنه قد يحدث أضراراً وتبقعات بالثمار، ويفضل بدلاً عن تلك الطريقة إجراء التبريد الأولي بالدفع الجبرى للهواء أو تحت تفريغ، علماً بأن الطريقة الأخيرة تتطلب بلل الثمار بالماء قبل تعريضها للتفريغ للحد من فقدتها للرطوبة (عن Salunkhe & Desai ١٩٨٤).

التخزين

تعتبر البامية من الخضروات السريعة التلف؛ ولذا فإنها لا تخزن عادة إلا لفترات قصيرة لحين تحسن الأسعار وأهم مظاهر فقد الجودة في قرون البامية بعد الحصاد، هي الذبول، وفقد الغضاضة، وتحلل الكلورفيل.

التخزين (ثمار وثمار)

يمكن تخزين ثمار البامية لمدة ٧-١٠ أيام بحالة جيدة في حرارة ١٠-١٢°م، ورطوبة نسبية ٩٥٪-١٠٠٪ بشرط أن تكون الثمار بحالة جيدة أصلاً قبل بداية التخزين وتعتبر الحرارة المنخفضة ضرورية لخفض معدل تنفس الثمار، والرطوبة العالية ضرورية لمنع انكماشها.

وتتعرض قرون البامية للإصابة بأضرار البرودة - خاصة عندما تكون القرون صغيرة جداً - إذا انخفضت حرارة التخزين إلى أقل من ١٠°م، وأعراض ذلك هي: ظهور تغيرات في اللون، مع تحلل القرون، وتكون نقر سطحية بها. ويزداد ظهور النقر بدرجة كبيرة إذا تعرضت الثمار لدرجة الصفر إلى ٢°م لمدة ثلاث أيام كما تظهر أعراض البرودة في خلال ٢٤ ساعة من تعرض القرون لحرارة ٢٠°م بعد ٧ أيام من تخزينها على ٢-٥°م ولا يجوز وضع الثلج على الثمار أو خلطة بها، لأن ذلك يؤدي إلى تكون بقع مائية بها (عن Lutz & Hardenburg ١٩٨٦)

ويجب عدم تخزين البامية مع الثمار المنتجة للإثيلين، مثل الكنتالوب، والموز، والتفاح، وذلك نظراً لحساسيتها للغاز.

كما يتعين تجنب تخزين أو شحن البامية مع الكنتالوب والبصل والبطاطس نظراً لأن قرون البامية تكتسب الروائح التي تنبعث من تلك المنتجات (Perkins-Veazie ٢٠٠٤)

التخزين في (البصل) والتمك في مكوناته

تفيد تعبئة البامية في أغشية مثقبة - بما يسمح برفع نسبة ثاني أكسيد الكربون

الفصل العاشر: الخضر للتمدية الأخوية

إلى ما بين ٥٪، و ١٠٪ - فى زيادة فترة احتفاظها بجودتها أثناء التخزين لمدة أسبوع إضافى، إلا أن زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون عند تلك الحدود يؤدى إلى ظهور طعم غير مرغوب بالقرون.

وقد فقدت قرون البامية التى خزنت فى ٥٪ أكسجين + ١٠٪ ثانى أكسيد الكربون على $10 \pm 1^\circ\text{C}$ قدرًا أقل من وزنها، واحتفظت بمحتواها من المواد الصلبة والكلورفيل بدرجة أكبر، وكانت لزوجة الهلام النباتى فيها أعلى، مقارنة بتلك التى خزنت فى الهواء العادى فى الحرارة ذاتها. كذلك قلّ فى الثمار المخزنة فى الهواء المتحكم فى مكوناته التغير نحو الصلابة toughness، والتليف fibrousness، والتحلل الميكروبي، وإنتاج الإثيلين. كما احتفظت القرون المخزنة فى الهواء المتحكم فى مكوناته بمحتواها من السكريات، والبروتينات الذائبة، والأحماض الأمينية بدرجة أكبر، وكان فقدها لكل من حامض الستريك والماليك والأسكوربيك أقل مما فى الثمار التى خزنت فى الهواء العادى على درجة الحرارة ذاتها (Baxter & Waters ١٩٩٠).

الحرنكش

التغيرات المصاحبة لنضج الثمرة

خلال فترة ثمانى أسابيع من نمو وتطور ثمرة الحرنكش husk tomato أو tomatillo (الاسم العلمى *Physalis ixocarpa*) صنف Rendidora، انخفض محتوى الثمار من كل من الكلورفيل والكاروتين، بينما ازداد محتواها من السكر إلى ٧٪ بسبب تراكم السكريات غير المختزلة، وازدادت كذلك الحموضة المعايرة إلى أن وصلت إلى ١,٣٪ فى الأسبوع الثامن. أما محتوى البكتين الكلى فقد وصل إلى أعلى مستوى له - وهو ١,١٪ - بنهاية الأسبوع السادس. ولقد كان محتوى حامض الاسكوربيك منخفضاً وتراوح بين ٣، و ٤ مجم/١٠٠ جم دون أن تحدث فيه تغيرات أثناء تطور الثمرة (Cantwell وآخرون ١٩٩٢).

الحصاد

تحصد ثمرة الحرنكش بعد اكتمال نضجها وهى برتقالية اللون، ولكنها تحصد لأجل الاستعمال فى الدول الناطقة بالإسبانية وهى مكتملة التكوين، ولكن وهى مازالت خضراء، وقبل أن تتلون بالأصفر (بين الأسبوعين الخامس والثامن من تطور الثمرة، أو عندما تكون الثمرة قد شغلت معظم غلافها)؛ ذلك لأنها تستعمل أساساً بإضافتها إلى المربوبات لتكسيبها طعماً خاصاً.

التنفس وإنتاج الإثيلين

يقدر تنفس ثمار الحرنكش الناضجة بالملليجرام ثانى أكسيد الكربون لكل كيلو جرام من الثمار فى الساعة بنحو ٦-٧ مجم على ٥°م، و ٧-١٠ مجم على ١٠°م، و ١٥-٢٠ مجم على ٢٠°م. ويزداد معدل التنفس فى الثمار المكتملة التكوين غير الناضجة بنحو ٢٥٪ عما فى الثمار الناضجة.

وتنتج الحرنكش الإثيلين بمعدل منخفض يبلغ ٠,٥-٢ ميكروليتر لكل كيلو جرام فى الساعة على ١٠-٢٠°م فى الثمار غير المكتملة التكوين، يرتفع إلى ١-١٠ ميكروليتر فى الثمار المكتملة التكوين، وإلى ٢٠-٤٠ ميكروليتر فى الثمار الناضجة. ويؤدى تعرض الثمار الخضراء للإثيلين إلى سرعة تلونها.

التداول والتخزين

تُبرد الحرنكش أولاً بالدفع الجبرى للهواء؛ بهدف المحافظة على المظهر الطازج للغلاف husk المحيط بالثمرة، علماً بأن ذلك الغلاف سريعاً ما يجف فى حرارة الغرفة على الرغم من بقاء الثمرة بحالة جيدة لمدة أسبوع. وللمحافظة على نضارة كلا من الغلاف والثمرة يكون التخزين فى حرارة ٥-١٠°م ورطوبة نسبية بين ٨٠٪ و ٩٠٪، علماً بأن أضرار البرودة تظهر على ٥°م بعد ثلاثة أسابيع، وعلى ٢,٥°م بعد أيام قليلة (Cantwell ٢٠٠٤، و ٢٠٠٧، و Cantwell وآخرون ١٩٩٢).

القرع العسلى وقرع الشتاء

عمليات التداول

المعالجة

تجرى لثمار القرع العسلى، وقرع الشتاء عملية العلاج Curing بعد الحصاد، وذلك بتركها لمدة أسبوعين فى حرارة ٢٧-٢٩°م، ورطوبة نسبية ٨٠٪-٨٥٪ فى مكان مظلل جيد التهوية. تؤدى عملية العلاج إلى تصلب جدار الثمرة؛ مما يجعلها تتحمل عمليات التداول، والتخزين (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨).

ويستفاد من الدراسات الحديثة أن عملية العلاج التى تجرى لثمار القرع العسلى وقرع الشتاء قبل تخزينها ليست ضرورية، كما أنها ليست ضارة فى غالبية الأصناف (مثل: البترنط، والهبارد)، ولكنها تؤثر سلباً على لون الجلد وقوام الثمرة وطعمها فى الـ Table Queen.

التصنيف والفرز

تدرج الثمار على أساس الحجم، والشكل، واللون. ويتم آنذاك فرز الثمار المجروحة، والمصابة بالأعفان، والزائدة النضج واستبعادها.

المعاملات الحرارية السابقة للتخزين

يؤدى غمر ثمار القرع العسلى وقرع الكوسة فى الماء الساخن على حرارة ٥٧-٦٠°م لمدة ثلاث دقائق إلى زيادة فترة احتفاظها بجودتها أثناء التخزين، ولكن يتعين سرعة تجفيف الثمار وتبريدها إلى درجة الحرارة التى سوف تخزن عليها بعد المعاملة مباشرة. هذا .. وتؤدى هذه المعاملة إلى التخلص من مسببات الأعفان التى قد توجد على سطح الثمار.

وقد أمكن تقليل شدة أضرار البرودة فى ثمار صنف قرع الشتاء Chungang (التابع للنوع *Cucurbita moschata*) المخزنة على ٤°م لمدة ٢٠ يوماً، وذلك بغمر الثمار فى ماء

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

ساخن على حرارة ٤٠°م لمدة ٣٠ دقيقة، أو بتهيئة الثمار للتخزين البارد بوضعها على ١٥°م لمدة يومين. أدت أى من المعاملتين إلى المحافظة على صفات جودة الثمار وزيادة قدرتها على التخزين، وبخاصة معاملة التهيئة على ١٥°م، التى لم تظهر بثمارها - التى خزنت بعد ذلك على ٤°م - أية أعراض لأضرار البرودة (Lee & Yang ١٩٩٩)

التخزين

يعتبر القرع من الخضر التى تتحمل التخزين لفترات طويلة، ولكن لا يجوز تخزينه إلا بعد إجراء عملية العلاج ويمكن أن تفرز الثمار أولاً، ثم تجرى عملية العلاج فى المخزن، ثم تخفض درجة الحرارة لبدء التخزين بعد انتهاء فترة العلاج.

وأفضل ظروف للتخزين هى: حرارة ١٠-١٣°م، ورطوبة نسبية تتراوح من ٥٠٪- ٧٠٪، مع المحافظة على الثمار جافة أثناء التخزين. ويمكن تحقيق ذلك بالتهوية الجيدة، مع عدم زيادة الرطوبة النسبية عن الحدود المذكورة؛ لأن زيادتها تؤدي إلى تعرض الثمار للإصابة بالأعفان. تخزن الثمار فى طبقة واحدة، ويراعى فرز واستبعاد الثمار المصابة بالأعفان أولاً بأول.

ويمكن حفظ ثمار القرع العسلى - تحت هذه الظروف - لمدة ٢-٦ شهور حسب الصنف.

وتبقى ثمار مجموعة الهبارد Hubbard - وهى من قرع الشتاء - بحالة جيدة - لمدة ٦ شهور، لا تفقد خلالها سوى حوالى ١٥٪ من وزنها.

أما ثمار مجموعة الأيكورن Acorn، مثل: تيبيل كوين Table Queen (من أصناف قرع الشتاء كذلك) .. فإنها تخزن بحالة جيدة لمدة ٥-٨ أسابيع فى حرارة ١٠°م وتنفذ ثمار هذا الصنف لونها الأخضر المرغوب عند تخزينها فى حرارة ١٣°م، أو أعلى من ذلك، وتكتسب لوناً أصفر، كما يتغير لون لب الثمرة فى خلال خمسة أسابيع من التخزين ورغم أنه لا يحدث اصفرار معادل عند تخزين الثمار فى درجة الصفر المئوى

الفصل الخامس: الخضر النورية المخزنية

.. إلا أنها تصاب بأضرار البرودة، وتتعرض للإصابة بالعفن لدى إخراجها من المخزن (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨).

ويخزن قرع الشتاء الـ Butternut بحالة جيدة لمدة ٥-٨ أسابيع على حرارة ١٠°م. ورطوبة نسبية ٥٠٪، مع مراعاة ألا تزيد نسبة الفقد في الوزن عن ١٥٪.

وفى الظروف الجيدة تحتفظ ثمار قرع الشتاء الكابوشا Kabocha، والتوربان Turban، والبتركب Buttercup بجودتها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويناسب تخزين ثمار قرع الشتاء من طراز الإسباجيتي Spaghetti (الذى ينتمى إلى النوع *C. pepo*) رطوبة نسبية منخفضة لتحقيق أعلى جودة وأقل إصابة بالأعفان. كما تزداد الإصابة بالأعفان في حرارة ٤°م عما في حرارة ١٠°م بسبب تعرض الثمار في الحرارة المنخفضة لأضرار البرودة (Lin & Saltveit ١٩٩٧).

ولا يجب تخزين ثمار قرع الشتاء ذات الجلد الأخضر اللون (مثل الهيارد) بالقرب من الثمار المنتجة للإيثيلين مثل التفاح حتى لا يتغير لون جلدها إلى اللون الأصفر البرتقالي بفعل الإيثيلين.

التغيرات المصاحبة لنضج الثمار، ومعالجتها، ومعاملتها حرارياً، وتخزينها

تمر ثمار القرع العلى وقرع الشتاء بعدد من التغيرات الفسيولوجية والفيزيائية أثناء نضجها، ومعالجتها، وتخزينها، وبعد معاملتها حرارياً، الأمر الذى يؤثر على جودتها وصفاتها الأكلية، وتتضح تلك التغيرات من استعراضنا لبعض الدراسات التى أجريت فى هذا المجال على طرز صنفية مختلفة، كما يلى:

⊙ من أهم أصناف طراز قرع الشتاء من طراز الإسباجيتي spaghetti (وهو: *Cucurbita pepo*) كلا من: Vegetable Spaghetti، و Go-Getti، و Orangetti. وبمقارنة هذه الأصناف عند حصادها وهى نصف ناضجة (٣ أسابيع بعد العقد) أو

مكتملة النضج (٦ أسابيع بعد العقد)، مع طهيها في درجة غليان الماء لمدة ١٠، أو ٢٠، أو ٣٠ دقيقة، إما بعد الحصاد مباشرة وإما بعد شهر أو شهرين من التخزين .. وجد أن الثمار النصف ناضجة غير المخزنة كانت ذات شرائط noodles اقل سمكاً وصلابة، وأسرع فقداً لقوامها بالطهي عن شرائط الثمار المكتملة النضج. وأدى تخزين الثمار النصف ناضجة إلى تحسين جودة الشرائط إلى مستوى مماثل لمستوى الجودة في شرائط الثمار المكتملة النضج. وقد كانت شرائط الصنف Orangetti أرفع من شرائط الصنفين الآخرين وتطلبت وقتاً أقل لطهيها (Edelstein وآخرون ١٩٨٩).

٥ قام Nagao وآخرون (١٩٩١) بمعالجة ثمار قرع الشتاء من صنف Ebisu (الذى ينتمى للنوع *Cucurbita maxiam*) على حرارة ٢٠، أو ٢٥، أو ٣٠ م° لفترات مختلفة، وذلك قبل تخزينها على حرارة تراوحت بين ٧,٥ و ١٥ م°. وقد وجدوا أن محتوى الثمار من النشا انخفض أياً كانت حرارة التخزين، بينما ارتفع محتوى السكر إلى حد أقصى ثم انخفض. وكانت صفات الثمار الأكلية في أفضل حالاتها عندما تساوى محتوى النشا مع محتوى السكر. كما كانت معاجة الثمار في الحرارة العالية ولفترات طويلة أكثر كفاءة في تحويل النشا إلى سكر، وفي منع حدوث الأعفان. هذا في الوقت الذى ازداد فيه محتوى الثمار من كل من السكريات المختزلة والسكريات الكلية عندما كان التخزين في الحرارة المنخفضة. وفي كل درجات حرارة التخزين وصل تركيز البيتا كاروتين إلى أعلى مستوى له بعد ٤٣ يوماً، حيث بلغ حينئذ ٢-٣ أمثال تركيزه عند الحصاد. هذا . ولم تظهر أية أعراض لأضرار البرودة في الثمار التى خزنت على ٧,٥ م°. وقد ازداد الفقد الرطوبى بزيادة حرارة التخزين. وكانت الحرارة المثلى للتخزين هي $10 \pm 2,5$ م°.

٥ عامل Arvayo-Ortiz وآخرون (١٩٩٤) ثمار صنف قرع الشتاء Delica (التابع للنوع *C. maxima*) بعد حصادها بالفسيل، ثم بالتخزين على ٢٢ م°، و ٦٧٪ رطوبة نسبية لمدة ١٠ أيام، ثم بالغمر في الماء الساخن على ٥٠ م° لمدة صفر، أو ٣، أو ٦، أو ٩، أو ١٢ دقيقة، ثم بالتخزين على ١٠ أو ٢٠ م° و ٧٥٪ رطوبة نسبية لمدة ٤، أو ٨،

الفصل العاشر: الخصائص الفيزيائية المخزنية

أو ١٢ أسبوعًا. وقد حدث أعلى فقد في الوزن - وهو ١١,٣٪ - في الثمار التي لم تعامل بالماء الساخن عندما خزنت على ٢٠°م لمدة ١٢ أسبوعًا. وقد قدر متوسط الفقد في الوزن (أيًا كانت مدة معاملة الغمر في الماء الساخن) في الثمار التي خزنت على ٢٠°م لمدة ٤، و ٨، و ١٢ أسبوعًا بنحو ٣,٦٪، و ٧,٢٪، و ١٠,٢٪، على التوالي، مقارنة بمتوسط فقد في الوزن قدره ٣,٤٪، و ٦,٨٪، و ٧,٦٪ في الثمار التي خزنت على ١٠°م. كذلك ازداد محتوى الثمار من البيتا كاروتين من ٣٦,٢ مجم/كجم بعد ٤ أسابيع من التخزين إلى ٥٤,٢ مجم بعد ٨ أسابيع، ولكنه انخفض إلى ٤٢,٨ مجم بعد ١٢ أسبوعًا، وذلك كمتوسط عام لكل المعاملات وحرارة التخزين. هذا بينما انخفض محتوى الثمار من الكلوروفيل بارتفاع حرارة التخزين وزيادة مدته. ولم تؤثر مدة معاملة الغمر في الماء الساخن على أي من الفقد في الوزن، أو محتوى الثمار من البيتا كاروتين والكلوروفيل أو الإصابة بالأعفان بأي من الـ *Aspergillus* ssp. أو الـ *Rhizopus* spp. ولكن الأعفان المتسببة عن الإصابة بأي من هذين الفطرين كانت أقل، كما كان مظهر الثمار أفضل عندما كان التخزين على ١٠°م مقارنة بالتخزين على ٢٠°م.

• قام Harvey وآخرون (١٩٩٧) بمتابعة التغيرات في صفات الجودة لثمار صنف قرع الشتاء Delica، وذلك أثناء نموها وبعد حصادها. وقد وجد أن ترك الثمار لفترة أطول دون حصاد كان مصاحبًا بزيادة في صلابة القشرة، وشدة احمرار اللب، ومحتوى الثمار من كل من المادة الجافة (ولكنها انخفضت بعد وصولها إلى حد أقصى)، والمواد الصلبة الذائبة والسكر، وخصائص الطعم الأكلية. وبعد الحصاد استمرت الزيادة في كل من لون اللب الأحمر، ومحتوى الثمار من كل من المواد الصلبة الذائبة والسكر، ولكن مع انخفاض في محتواها من كل من النشا والمادة الجافة. ولم تحدث زيادة جوهريّة في محتوى الثمار من النشا والمادة الجافة بعد ٤٠ يومًا من الإزهار. وقد بدا أن صلابة القشرة والساعات الحرارية المتراكمة كانتا أفضل الدلائل لتقدير الموعد المثالي للحصاد، حيث لزم ما بين ٢٤٠، و ٣٠٠ وحدة حرارية يومية من

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضار الثموية - التداول والتخزين والتصدير

الإزهار حتى موعد القطف. وتطلب قطف الثمار فى تلك المرحلة مرور فترة تستكمل فيها نضجها بعد الحصاد لحدوث التغيرات المطلوبة فى الحلاوة والقوام.

○ أكملت ثمار صنف قرع الشتاء Delica (وهو من طراز الـ Buttercup) نموها وتراكم النشا والمادة الجافة بها خلال الشهر الأول بعد العقد، وشهدت تلك الفترة تناقصاً مستمراً فى معدل تنفس الثمار أما خلال مرحلة اكتمال نمو الثمار - والتي استمرت لمدة شهر آخر بعد ذلك (من اليوم الثلاثين إلى اليوم الستين بعد العقد) - فقد ظل محتوى الثمار من النشا والمادة الجافة ثابتاً تقريباً خلالها، بينما بدأ تراكم السكروز. وشهدت مرحلة نضج الثمار (التي استمرت بعد ذلك من اليوم الستين حتى حوالى اليوم المائة بعد العقد) تحلل النشا فى الثمار، وزيادة معنوية - ظلت ثابتة - فى نشاط الإنزيمين sucrose synthase، و sucrose phosphate synthase، مع استمرار تراكم السكروز (Irving وآخرون ١٩٩٧) وقد أوضحت دراسة لاحقة (Irving وآخرون ١٩٩٩) أن تحلل النشا فى قرع البتركب يتم إنزيمياً، وأن الألفا أميليز α -amylase هو الإنزيم الأول المسئول عن بدء التحلل.

○ تناسب شدة الإصابة بأضرار البرودة فى ثمار قرع الشتاء (*Cucurbita moschata*) عكسياً مع درجة الحرارة أثناء فترة التخزين التى استمرت لمدة ٢٠ يوماً، وذلك من أكثر من ٩٠٪ عند التخزين على ٢°م إلى ٤٥٪ فى ٥°م وإلى أقل من ٥٪ عند التخزين على ١٠°م، بينما لم تظهر أية أعراض للإصابة بأضرار البرودة على الثمار التى خزنت على ١٢°م لمدة ٢٠ يوماً. وبالنسبة للتخزين على ٢°م، و ٥°م. أدى وضع الثمار فى هواء يحتوى على ١٪، أو ٣٪ ثانى أكسيد كربون مع ١٪ أكسجين إلى تقليل أضرار البرودة إلى ٥٪ بعد ٢٠ يوماً من التخزين وكانت الثمار صالحة للتسويق. وقد ازداد إنتاج ثانى أكسيد الكربون، والإيثيلين، وازداد التسرب الأيونى مع الإصابة بأضرار البرودة. كما لوحظ تواجد الأسيتالدهيد والكحول الإيثيلى بتركيزات منخفضة فى ثمار جميع المعاملات، وازداد تركيزهما بعد نقل الثمار إلى ٢٠°م لمدة يوم واحد، هذا إلا أن التخزين فى الهواء المتحكم فى مكوناته أدى إلى تثبيط تلك الزيادة فى

الفصل العاشر: الخضر للثمرة الأخرى

تركيزهما. وقد كان الهواء المعدل الذى يحتوى على ١٪ أو ٣٪ ثانى أكسيد كربون + ١٪ أكسجين هو الأفضل للمحافظة على صفات جودة الثمار المخزنة على ١٢°م (Lee & Yang ١٩٩٨).

٥٠ قام Wright & Grant (١٩٩٩) بدراسة تأثير تخزين ثمار قرع الشتاء من صنف Delica فى حرارة ٥، و ١٠، و ١٥، و ٢٠، و ٢٥°م لمدة ٧ أيام، أو ١٤، أو ٢١، أو ٢٨ يوماً، ثم بعد ذلك قاموا بتخزين الثمار على ١٢-١٤°م لمدة ١٤ يوماً لمحاكاة الشحن البحرى (من نيوزيلندا إلى اليابان)، ثم وضعها لمدة ٧ أيام فى الحرارة العادية (١٥-٢٠°م) قبل تقييمها. وقد وجدوا أن أعفان الثمار المتسببة عن فطرى الـ *Botrytis cinerea*، والـ *Penicillium*، لم تظهر إلا فى الثمار التى خزنت على ٥°م أو ١٠°م قبل فترة محاكاة الشحن بسبب أضرار البرودة التى حدثت فى تلك الظروف، وظهرت درجات مختلفة من إصابات الأعفان على جميع الثمار التى خزنت على ٥°م لمدة ٢٨ يوماً. وباستثناء تلك التى خزنت على ٥°م فإن معدل الفقد فى وزن الثمار ازداد بزيادة فترة التخزين على أى من درجات الحرارة الأخرى، وبارتفاع درجة الحرارة. وقد بقيت نسبة المادة الجافة ثابتة نسبياً (٢٩,٠٪-٣٣,٥٪) فى جميع المعاملات. وبينما بقيت نسبة المواد الصلبة الذائبة ثابتة كذلك بين ١٠٪ و ١١٪ فى كل المعاملات الحرارية بين ٥، و ١٥°م، فإنها ارتفعت إلى ١١,٥٪ عندما كان التخزين على ٢٠°م، وإلى ١٣٪ عندما كان التخزين على ٢٥°م. كذلك أصبح لون لب الثمار البرتقالى أكثر دكنة خلال التخزين، وازدادت سرعة التغير اللونى بارتفاع درجة حرارة التخزين ومدته. وبينما لم يتغير لون جلد الثمار التى خزنت على ١٠°م قبل فترة محاكاة الشحن، فإنه أصبح أقل اخضراراً وأكثر اصفراراً فى درجات الحرارة الأخرى مع زيادة فترة التخزين.

٥١ قام Bycroft وآخرون (١٩٩٩) بتدفئة ثمار صنف قرع الشتاء Delica فى الهواء على حرارة ٣٠ أو ٣٣°م لمدة ١-٧ أيام، ثم تخزينها على حرارة ١٢°م حتى ٧ أسابيع، بينما بقيت ثمار الكنترول على حرارة ١٢°م من وقت حصادها. وقد وجدوا

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية – التداول والتخزين والتصدير

أن محتوى الثمار من السكر (على أساس الوزن الجاف) كان أعلى بنسبة ٢٥٠٪ في الثمار التي أعطيت المعاملة الحرارية عما في ثمار الكنتروال كذلك ازداد تراكم السكر بزيادة فترة المعاملة الحرارية، واستمر تراكمه خلال فترة التخزين التي أعطيت المعاملة الحرارية. وقد وجد ارتباط قوى بين محتوى الثمار من السكر ودرجة الجودة والقبول في اختبارات التذوق. كذلك أدت المعاملة الحرارية إلى زيادة التلون الأحمر المصفر باللب، وأدى ذلك مع زيادة محتوى السكر إلى زيادة درجة القبول في اختبارات التذوق

اليقطين

اليقطين (أو الشجر) - وهو ضرب من القرع - يسمى في الإنجليزية white flowered gourd (الجورد ذو الأزهار البيضاء)، و bottle gourd (جورد أو قرع الزجاج)، ويطلق عليه علمياً - اسم *Lagenaria siccaria*.

ينتج النبات الواحد من ١٠-١٥ ثمرة صالحة للقطف في طور النضج الاستهلاكى، يتراوح وزن كل منها بين ٠,٥-١,٥ كجم ويبلغ متوسط محصول القدان حوالى ٢٥ طناً من الثمار باعتبار كثافة زراعة مقدارها ٦٠٠ نبات/فدان (Tindall ١٩٨٣).

وتتراوح فترة صلاحية معظم الأصناف للتخزين بين ٨، و ١٢ يوماً على حرارة ٢٥±٤°م، بينما تزداد فترة الصلاحية للتخزين كثيراً على حرارة ٢٥±٢°م. ويعتبر الصنف Summer Long Green من أكثر أصناف اليقطين صلاحية للتخزين، حيث تحتفظ ثماره بجودتها لمدة ١٢ يوماً على حرارة ٢٥±٤°م، و ٢٤ يوماً على حرارة ٢٥±٢°م (Bhatnagar & Sharma ١٩٩٧).

الشمام المر

يعرف الشمام المر في الإنجليزية باسم bitter melon، و bitter gourd، واسمه العلمى *Momordica charanita*.

الحصاد

تحصد ثمار الشام المر بعد ٨-١٠ أيام من العقد، حينما يبلغ طولها من ١٠-١٥ سم، وقطرها من ٤-٦ سم. ووزنها من ٨٠-١١٥ جم حسب الصنف. وإذا تأخر حصاد الثمار عن هذه المرحلة من النضج. فإنها تصبح إسفنجية القوام، وأكثر مرارة، وتفقد قيمتها التسويقية. كما أن ترك الثمار دون حصاد يمنع عقد ثمار جديدة على النبات.

التخزين

إن أفضل حرارة لتخزين الثمار هي ١٠°م، وهي تتعرض لأضرار البرودة إذا خزنت في درجة حرارة أقل من ذلك (Johnson ١٩٨٥).

وقد أظهرت ثمار الشام المر التي خزنت لأكثر من ثمانية أيام على ٧,٥°م أعراضاً شديدة للإصابة بأضرار البرودة (تحلل، وتغيرات لونية). وزيادة في معدل التنفس وإنتاج الإثيلين بعد نقلها إلى ١٥°م. وحافظت الثمار التي خزنت على ١٠ أو ١٢,٥°م على أفضل نوعية، أما تلك التي خزنت على ١٥°م فقد استمرت بها التغيرات الحيوية مثل فقد اللون الأخضر والتشقق. وقد حافظت الثمار غير الناضجة على صفات الجودة بعد الحصاد بصورة أفضل من تلك التي كانت في مرحلة اكتمال التلون بالأخضر. كما حافظت الثمار التي خزنت لمدة ٣ أسابيع في هواء يحتوي على ٢,٥٪ أكسجين مع ٢,٥٪ أو ٥٪ ثاني أكسيد كربون على لونها الأخضر بصورة أفضل، وكانت إصابات الأعفان وتشققات الثمار فيها أقل مقارنة بما كان عليه الحال في الثمار التي خزنت في الهواء العادي (Zong وآخرون ١٩٩٥).

وقد وجد في نفس الدراسة (Zong وآخرون ١٩٩٥) أن معدل تنفس الثمار يقدر بنحو ١٥، و ٤٠ ميكروليترًا من ثاني أكسيد الكربون/جم في الساعة على ١٠، و ٢٠°م، على التوالي، وأن معدل إنتاجها للإثيلين يتراوح - في ذلك المدى الحرارى - بين ١،٠ و ٣،٠ نانوليتر لكل جرام في الساعة.

الشحن

يجب تبريد الحاويات التي تستخدم في شحن الشام المر إلى ١٠°م، وألا تزيد حرارتها عن ١٢°م، مع توفير تهوية بمعدل ١٠م^٣/ساعة (٥ قدم^٣/دقيقة) في الحاويات الـ ٢٠ قدم، وبمعدل ١٥ م^٣/ساعة (١٠ قدم^٣/دقيقة) في الحاويات الـ ٤٠ قدم، ومع توفير رطوبة نسبية ٨٥%-٩٥٪، علماً بأن مدة الشحن والتخزين لا يجب أن تزيد عن ١٤-٢١ يوماً (Optimal Fresh ٢٠٠١ - الإنترنت).

اللوبياء

الحصاد

يتوقف موعد وطريقة الحصاد على الغرض من الزراعة كما يلي.

حصاد اللوبياء لغرض استعمال القرون الخضراء

يبدأ الحصاد بعد نحو ٢-٣ أشهر من الزراعة، ويستمر كل ثلاثة أيام لمدة ٢-٣ أشهر أخرى وقد يجرى الحصاد آلياً بآلات تشبه آلات حصاد البسلة الخضراء، ولكن يكون المحصول منخفضاً. ويصاحب نضج قرون اللوبياء نقص نسبة الرطوبة في البذور، وزيادة نسبة النشا والمواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول.

حصاد اللوبياء لغرض استعمال البذور الخضراء

إذا أجرى الحصاد يدوياً فإن ذلك يكون في حوالى اليوم التاسع عشر من تفتح الزهرة، عند اختفاء اللون الأخضر من القرون، وبعد اكتمال نمو البذور، ولكن قبل تصلبها وجفاف القرون.

وفى الولايات المتحدة تحصد حقول اللوبياء المزروعة لأجل استعمال البذور الخضراء آلياً ويعتبر أنسب موعد للحصاد هو عندما تفقد القرون جزءاً من لونها الأخضر وتصبح باهتة جزئياً، ولكن لا يجب تأخير حصادها أكثر مما ينبغي حتى لا تصبح زائدة النضج (كأن يصبح لونها قرمزي داكن في الأصناف القرمزية) لأن بذورها تكون

الفصل العاشر: الخضر للتمرية الأخرى

جافة ونشوية وغير مقبولة، كما أن القرون الصغيرة الخضراء تكون بذورها صغيرة وغير مقبولة كذلك لا فى التعليب ولا فى الاستهلاك الطازج ويجرى الحصاد - عادة - عندما تكون ٣٠٪-٤٠٪ من القرون ناضجة.

التداول والتخزين

تخزن قرون اللوبيا وبذورها الخضراء فى الظروف ذاتها التى تخزن فيها قرون الفاصوليا وبذورها الخضراء، وتعطى معاملات بعد الحصاد التى تعطاها الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الليما

النضج والحصاد

الحصاد (المحصول) للأجل (المحصول) الأخضر

يجرى حصاد الفاصوليا الليما التى تزرع لأجل استعمال البذور الخضراء بعد أن تصل إلى أقصى حجم لها، ولكن قبل أن يبدأ تحول القرون إلى اللون الأصفر. يبدأ الحصاد عادة ٧٠-٩٠ يوماً من الزراعة، ويستمر كل ٧-١٠ أيام لعدة أسابيع. وتقطف الأصناف القصيرة عادة ٤-٥ مرات، بينما يؤخذ عدد أكبر من الجمعات من الأصناف الطويلة

ويجب أن تحتوى البذور عند حصادها للاستهلاك الطازج على ٢٠٪-٣٠٪ مادة جافة.

الحصاد (المحصول) للأجل (المحصول) الأخضر

لا يجرى الحصاد الآلى للفاصوليا الليما إلا لفرض التصنيع، ويكون ذلك مرة واحدة، وهو ما يعنى أن القرون تكون فى درجات متفاوتة من النضج. ويتحدد موعد إجراء الحصاد الآلى على أساس الموازنة بين كمية المحصول ونوعيته؛ لأن أى تأخير فى الحصاد يعنى زيادة فى كمية المحصول مع تدهور فى نوعيته وأفضل موعد لذلك

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

هو عندما تصبح ٣٪-٥٪ من البذور بيضاء اللون، علمًا بأنه مع زيادة نضج البذور تزيد نسبة النشا، وتقل نسبة السكر، ويتغير لون البذور من الأخضر القاتم إلى الأخضر الفاتح فالأبيض، ولا تصلح البذور البيضاء للحفظ بالتجميد، أو بالتعليب

وكقاعدة عامة .. يؤدي الحصاد عند جفاف ١٠٪ من القرون إلى إنتاج أعلى محصول من البذور العالية الجودة

ويذكر آخرون أن أفضل موعد لإجراء الحصاد الآلي - لأجل التصنيع - هو عندما تصبح بذور ٣٠٪-٤٠٪ من القرون صفراء ومبرقشة بالبنفسجي الفاتح، حيث يمكن - حينئذٍ - الحصول على أعلى نسبة تصافى

ويجب أن تكون البذور ذاتها براقية ورطبة وذات قصرة يسهل خرقها بالأظافر أما القرون التي تصبح بلون بني فاتح فإن بذورها تكون جافة وزائدة النضج وغير صالحة للاستهلاك الطازج

وتجدر الإشارة إلى أن القرون التي تظهر بها بقع بنية صدئة أو أى تغيرات أخرى فى اللون أو فى الملمس تكون قد تعرضت للإصابات المرضية أو للأضرار، وربما تكون قد بدأت فى التدهور، ويتعين استبعادها

وقد انتشر استعمال آلات حصاد الفاصوليا اللبنا التى تقوم بتمشيط القرون من النباتات، على الرغم من أنها تسبب فقدًا كبيرًا فى المحصول يصل إلى حوالى ٢٤٪ من المحصول الكلى فضلاً عن تضمن المحصول الناتج من عملية الحصاد الآلى على بقايا نباتية غير مرغوب فيها بنسبة تصل إلى ١٣٪ بالوزن. هذا . وتتباين أصناف فاصوليا اللبنا فى مدى صلاحيتها للحصاد الآلى (Glancey وآخرون ١٩٩٧)

ويتم عند الحصاد قطع النموات الخضرية آليًا وتكويها جانبياً، ثم جمعها آلياً لفصل قرونها وتقشيرها آلياً كذلك. كما تتوفر حالياً آلات تقوم بجمع القرون من النموات الخضرية مباشرة.

هذا ويتراوح محصول الفدان بين ٣، و ٤ أطنان من القرون الخضراء

التداول

تقشير القرون

رغم أن بذور الفاصوليا اللبنا تحتفظ بجودتها لفترة أطول وهي في القرون .. إلا أن بعض الأسواق تتطلب بذورًا مستخلصة من القرون. وتجرى عملية التقشير - آليًا - إلا أن الآلة قد تضر بالبذور، وتؤدي إلى انفصال الفلقات. تعبأ البذور المقشرة في عبوات المستهلك مباشرة.

التبريد الأول

يتعين تبريد قرون فاصوليا اللبنا أوليًا في خلال ساعتين من حصادها ويفضل أن يجرى ذلك بطريقة الدفع الجبرى للهواء، مع إمكان التبريد بالماء البارد إذا استمرت سلسلة التبريد دونما انقطاع بعد ذلك

التخزين

تعتبر الفاصوليا اللبنا من الخضر الحساسة لأضرار البرودة، كما تعد القرون أكثر حساسية عن البذور، ولذا .. يجب أن تتراوح حرارة تخزين القرون الكاملة بين ٥°، و ٦°م، ورطوبة نسبية ٩٠٪-٩٥٪، حيث تحتفظ بجودتها لمدة ٦ أيام. وتجب سرعة استعماك القرون بعد إخراجها من المخزن، نظرًا لأن لونها يتغير بسرعة حينئذ (عن Lütz & Hardenburg ١٩٦٨ بتصرف).

أما بذور فاصوليا اللبنا المعدة للاستهلاك الطازج فإنها تخزن على ٣-٥°م، و ٩٥٪ رطوبة نسبية، حيث تحتفظ بجودتها لمدة ١٠ أيام.

وتعتبر حرارة ٣-٥°م لتخزين البذور وسطًا بين الحرارة الأقل من ذلك التي تحدث عندها أضرار البرودة، والحرارة الأعلى من ذلك التي يزداد معها معدل تدهور البذور. ويصاحب تدهور البذور ظهور نقط بنية صلبة عليها، يزداد ظهورها بشدة في حرارة ٢١°م، حيث تصبح البذور مبقعة ولزجة.

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر النثرية - التداول والتخزين والتصدير

ويتم أحياناً تخزين البذور فى أكياس من البوليثلين المثقب، حيث يزداد بداخله تركيز ثانى أكسيد الكربون - نتيجة لتنفس البذور - إلى ٢٥٪-٣٠٪، الأمر الذى يقلل من تبقع البذور ويثبط النموات البكتيرية والفطرية التى تؤدى - عند تواجدها - إلى لزوجة البذور

النزرة السكرية

تتراوح الفترة من الزراعة إلى الحصاد بين ٧٠ و ١١٠ يوماً فى معظم الأصناف المبكرة ويصعب على الشخص غير المجرب - عادة - تحديد مرحلة النضج المناسبة للحصاد دون إزالة الأوراق المغلفة للكوز، وفحص الحبوب. والمتبع - عادة - هو فحص عدة كيزان بين آونة وأخرى، مع اقتراب الحقل من مرحلة النضج المناسبة للحصاد.

علامات مرحلة التكوين المناسبة للحصاد

إن من أهم علامات وصول الكوز إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد . بلوغه أقصى حجم له (وهو ما يتوقف على الصنف)، والتفاف الأوراق المغلفة حوله جيداً، وبدء جفاف الحريرة، واكتمال امتلاء الحبوب، وإذا ثقت الحبوب فإنه يخرج منها سائل لبنى المظهر (milk stage)، بينما يكون السائل مائياً رقيقاً قبل هذه المرحلة (pennilk stage)، وتخرج من الحبوب مادة عجينية doughy رقيقة فى الأطوار التالية. ويلزم - بطبيعة الحال - الاكتفاء بعلامات النضج الخارجية - فقط - بعد أن يكتسب العمال القائمون بعملية الحصاد خبرة فى هذا الأمر. ويلاحظ أن التأخير فى الحصاد عن طور النضج اللبنى milk stage يتبعه تحول النشا إلى سكر، وصلابة قشرة الحبة، ثم تحول الحبة - سريعاً - إلى الطور العجيني المبكر، ثم الطور العجيني dough stage

وتصل الكيزان إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد - عادة - بعد ٢-٣ أسابيع من بروز النورات المذكرة tasseling فى الجو الدافئ، وبعد ٤-٥ أسابيع فى الجو المائل إلى البرودة، علماً بأن بروز النورات المذكرة يكون عادة قبل خروج الحريرة silking

الفصل العاشر: الخضر للتمرية الخضراء

بنحو ٣-٤ أيام. ويمكن القول - عامة - إن كيزان الذرة السكرية تكون جاهزة للحصاد بعد نحو ١٨-٢٤ يوماً من ظهور الحريرة حسب الحرارة السائدة. وتكون الحبوب حلوة، ولكنها صغيرة، وغير ممتلئة في الطور قبل اللبني، بينما تكون نشوية وقليلة الحلاوة وصلبة - نسبياً - في الطور العجيني.

يكون الحصاد في الطور اللبني بالنسبة لكل من محصول الاستهلاك الطازج، ومحصول التصنيع المعد للحفظ بالتجميد، وفي مرحلة نضج متقدمة قليلاً (نهاية الطور اللبني)، بالنسبة لمحصول التصنيع المعد للحفظ بالتعليب على صورة حبوب كاملة، وفي مرحلة نضج أكثر تقدماً (بداية الطور العجيني) بالنسبة لمحصول التصنيع المعد للحفظ على صورة كريم *creamy style*. ويجب أن يتم التصنيع في جميع الحالات بعد الحصاد مباشرة.

يكون حصاد الذرة السكرية خلال فترة قصيرة من مراحل تكوينه، ويؤدي حصاده قبلها إلى أن يكون فاقداً للطعم (يكون مائي المذاق)، كما يؤدي حصاده بعدها إلى أن يكون نشويًا. ويتميز طراز ال sh2 بإمكان حصاده في مدى أوسع من التكوين دون أن يكون لذلك تأثير على مذاقه (Purdue University ٢٠٠٧ - الإنترنت).

ويلزم مرور حوالي ٣٠ يوماً أخرى من التوقيت المناسب لحصاد الذرة السكرية للاستهلاك إلى حين اكتمال تكوين البذور (عند إنتاج محصول البذور).

وتتوفر وسائل أخرى كمية تستعمل في تحديد مرحلة النضج المناسب للحصاد - بدلاً من الاعتماد على الفحص المظهرى المعتمد على الخبرة ووجهات النظر - ولكنها لا تتبع إلا في المساحات الكبيرة التي تحصد آلياً لأجل التصنيع.

ومن بين هذه الوسائل الخمية المحتملة في تحديد مرحلة النضج المناسبة للحصاد، ما يلي:

١ - تقدير نسبة الرطوبة في الحبوب:

يرتبط محتوى الحبوب من الرطوبة بمدى عصيريتها (طراوتها)؛ ولذا .. تعد نسبة

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

الرطوبة في البذور أهم الخصائص المحددة لدى نضج الذرة السكرية وجودته عند تحديد الموعد المناسب للحصاد لكل من الاستهلاك الطازج والتصنيع تحتوى الحبوب فى طور التكوين المناسب للحصاد على ٧٢٪-٧٦٪ رطوبة، ويكون حصاد الأصناف التى تحتوى على الطفرة sh2 عند الحد الأعلى للرطوبة ويانخفاض رطوبة الحبوب عن ٧٢٪ .. يحدث تدهور فى كل من مذاق الحبوب، وقوامها، ولونها، وكذلك فى نوعية الإندوسبرم ويلزم عند اتخاذ رطوبة الحبوب كمقياس لدرجة نضجها أن يتبع فى تقديرها أكثر الطرق سرعة، مثل طريقة التجفيف بالميكروويف التى تستغرق ثلاث دقائق فقط لاستعمالها

وقد وجد أن عدد الوحدات الحرارية المتجمعة يرتبط - خطياً - مع محتوى الحبوب من كل من الرطوبة والمواد غير القابلة للذوبان فى الكحول (عن Ruon وآخرين ١٩٩٩).

هذا ويجرى حصاد الأصناف القياسية (su)، والممتدة الحلاوة sugary extender (se) حينما تبلغ نسبة الرطوبة فى الحبوب ٧٢٪-٧٥٪ عند حصادها لأجل التصنيع، وبين ٧٥٪، و ٧٧٪ عند حصادها لأجل التسويق الطازج. أما الأصناف الفائقة الحلاوة supersweet (sh2) فإن محتواها من السكر يكون أعلى كثيراً عما فى الطرازين السابقين، وتحتفظ به لفترة طويلة بعد الحصاد، لذا فإنها تحصد عندما تبلغ رطوبة الحبوب فيها ٧٧٪-٧٨٪ عند حصادها لأجل التسويق الطازج

تنخفض رطوبة الحبوب - عادة - بنسبة ٠,٥٪ يومياً فى طرازي su، و se، بينما يكون معدل انخفاض الرطوبة فى حبوب طراز ال-sh2 أبطأ من ذلك هذا . ويزداد محصول الذرة السكرية القياسية (su) والممتدة الحلاوة (se) - فى المتوسط - بمقدار حوالى ٣٥٦ طن للفدان مع كل انخفاض قدره ١٪ فى رطوبة الحبوب، ولكن يتراوح المدى بين ١٧٣، و ٧٩٢ طن للفدان باختلاف الأصناف ومواسم النمو أما الأصناف الفائقة الحلاوة (sh2) فإن محصولها يزداد بمقدار حوالى ٧٠٠ طن للفدان

الفصل العاشر: الخضر التمثية الأخرى

مع كل انخفاض قدره ١٪ في رطوبة الحبوب، إلا أن المدى يتراوح من ٠,٢٢٥ إلى ١,٠١١ طن للفدان باختلاف الأصناف ومواسم النمو.

٢ - نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية، وهي تقدر في السائل اللبني باستعمال رافراكتومتر يدوي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المواد الصلبة الذائبة ترتبط - خطياً - بمحتوى الحبوب من الرطوبة المقدرة بطريقة الأفران.

٣ - نسبة المواد الصلبة غير الذائبة في الكحول:

تعرف مكونات الحبوب التي لا تذوب في ٨٠٪ كحول باسم alcohol insoluble solids (اختصاراً: AIS)، وهي تتضمن النشا، ونصف السيليلوز hemicellulase، والبكتين، والسيليلوز. هذا .. ولا يناسب اختبار الـ AIS الأصناف الفائقة الحلوة، بسبب انخفاض محتواها من تلك المركبات. ويقدر التغير في الـ AIS بنحو ٢,٢٥٪ مقابل كل ٥٪ تغير في المحتوى الرطوبي.

٤ - نسبة المركبات عديدة التسكر الذائبة في الماء:

تتراوح نسبة المركبات عديدة التسكر الذائبة في الماء water-soluble polysaccharides (اختصاراً: WSP) بين ١٢٪، و ١٨٪، ويقابل ذلك محتوى رطوبي يتراوح بين ٧٤٪، و ٧٠٪. ويعد محتوى الـ WSP - كمحتوى الـ AIS - قليل الكفاءة كمقياس لدرجة النضج في الأصناف العالية الحلوة لأنها تكون فقيرة في محتواها من المركبات عديدة التسكر (Salunkhe & Kadam ١٩٩٨).

٥ - مدى صلابة الغلاف الثمري الخارجى وسمكه.

٦ - درجة طراوة الحبوب succulence .. وهي تقدر بجهاز shear-press.

٧ - الكثافة النوعية.

هذا .. ويقاس محتوى السكر في الذرة السكرية باستعمال رافراكتومتر، ويعتمد المحتوى على طراز الذرة، والصنف، ودرجة التكوين وقت الحصاد، وعمليات التداول بعد الحصاد.

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية – التداول والتخزين والتصدير

ولمزيد من التفاصيل عن هذه الطرق وغيرها .. يراجع Nelson & Steinberg (١٩٧٠)، و Salunkhe & Kadam (١٩٩٨)

وتعرض ثلاثة طرز من الطفرة الصُّرِيَّة، هي،

١ – السكرى العادى (susu) normal sugary الذى يحتوى على الطفرة sugary1
٢ – مُحسَّن السكر (sese) sugar enhanced الذى يحتوى على الطفرة enhancer1
بالإضافة إلى sugary1

٣ – فائق الحلاوة (sh2sh2) supersweet الذى يحتوى على الطفرة shrunken2
وقد تحتوى بعض الأصناف الحديثة على توافق من الجينات الثلاثة وتتراوح قراءة الرفراكتومتر من ١٠٪ إلى ١٥٪ فى susu، ومن ١٣٪ إلى ٢٨٪ فى (susu/sese)، ومن ٢٥٪ إلى ٣٥٪ فى sh2sh2.

ومع اكتمال تكوين حبوب الذرة السكرية يتحول السكر تدريجياً إلى نشأ، كما يستمر ذلك التحول بعد الحصاد، ولكن يقل معدل هذا التحول كثيراً فى الـ sh2sh2، مما يجعله يحافظ على مستوى السكر بدرجة أكبر بعد الحصاد (Purdue Univ. ٢٠٠٧ – الإنترنت)

صفات الجودة

يفضل المستهلك الكيزان التى تكون أغلفتها خضراء قاتمة اللون وذات أوراق علم (flag leaves) متوسطة الحجم

يكون حجم الكوز صغيراً فى الأصناف المبكرة ويزداد مع تأخير النضج ويتراوح الطول – عادة – بين ١٥، و ٢٥ سم، والقطر بين ٣٧٥، و ٥ سم (Purdue University – ٢٠٠٧ – الإنترنت).

ويتباين لون حبوب الذرة السكرية بين الأصفر والأبيض وذو اللونين، وقد تكون الحبوب حمراء اللون فى أصناف قليلة خاصة. كذلك تتوفر مستويات مختلفة من اللون الواحد، فالأبيض – مثلاً – قد يكون لامعاً إلى كريمى أو عاجى، وقد تكون الحبوب شاحبة أو لامعة

الفصل للعاشر: الخضر الثمرية المخزنة

ويؤدي تلقيح الأصناف البيضاء بلقاح من أصناف صفراء إلى ظهور حبوب صفراء بها، ولكن لقاح الأصناف البيضاء ليس له تأثير على الأصناف الصفراء.

ويعتمد قوام الذرة السكرية على الطرز، والصنف، ودرجة النضج عند الحصاد تحتوي حبوب الذرة السكرية على جليكوجين نباتي phytoglycogen يوفر لها القوام الكريمي المميز. ويسهم غلاف الحبة (الـ pericarp) في الإحساس بالقوام. ويتشابه الـ pericarp في كل من الـ su والـ se، إلا أن الـ pericarp الـ sh قد يكون صلباً ويعطى صوتاً عند مضغه (crunchy) في بعض الأصناف. ويميل الذرة الـ su لأن يكون الـ pericarp فيه رقيقاً وسهل المضغ بدرجة أكبر مما في الذرة الـ su.

ونقدم - فيما يلي - مقارنة بين الطرز الثلاثة للذرة السكرية في بعض صفاتها الجوهرية (من Brecht ٢٠٠٤)،

وجه المقارنة	su1	su1/se	sh2
محتوى السكر	ضعف محتوى الذرة الحقلية	ضعف محتوى الـ su1	على الأقل ضعف
عديدات	١٠-٨ أضعاف	١٠-٨ أضعاف	شبه معدومة
الذاتية	الذرة الحقلية	الذرة	محتوى الـ su1
الإنديوسبرم	كريمي	كريمي	مائي
تمثيل النشا	عادي	عادي	مئيظ
فترة الصلاحية	١٠-٧ أيام	١٠-٧ أيام	٣ أسابيع
للتخزين			
الطعم بعد انتهاء	نشوي	نشوي	مائي
الصلاحية للتخزين			

طرق الحصاد

يكون الحصاد إما يدوياً، أو آلياً، ويجرى الحصاد اليدوي ٢-٣ مرات على مدى ١٠-٤ أيام للحقل الواحد، أما الحصاد الآلي .. فيجرى مرة واحدة لكل الحقل. يتبع الحصاد الآلي بالنسبة للحقول المعدة للتصنيع، بينما يتبع الحصاد اليدوي مع حقول

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية – التداول والتخزين والتصدير

الاستهلاك الطازج كما قد تمر آلة في حقول الاستهلاك الطازج لتقطيع أعواد الذرة فوق مستوى الكيزان مباشرة في اليوم السابق للحصاد، لتسهيل العثور عليها عند الحصاد.

يجرى الحصاد اليدوى قصفاً بثنى الكوز إلى أسف، ولكن دون الإضرار بالساق الرئيسية للنبات التي يجب أن تستمر في النمو لحين حصاد الكوز أو الكيزان الأخرى التي يحملها النبات إن وجدت

هذا . ويمكن لآلة الحصاد الواحدة حصاد نحو ١٠ أفدنة يومياً خلال فترة العمل العادية (٨ ساعات)، ولكن اقتناءها لا يعد اقتصادياً إلى فى حالات المزارع التى تزيد مساحتها عن ١٥٠ فداناً وتجدر الإشارة إلى أن الأضرار التى تُحدثها عملية الحصاد الآلى فى المحصول المخصص للتصنيع لا تلاحظ فيه مثلما تلاحظ فى محصول الاستهلاك الطازج، ذلك لأن محصول التصنيع يتم تصنيعه فى خلال ساعات قليلة من الحصاد

تفقد الذرة السكرية جزءاً كبيراً من محتواها من السكر سريعاً بعد الحصاد، وتزداد سرعة الفقد بارتفاع درجة الحرارة . فيكون الفقد فى حرارة ١٠°م ثلاثة أمثال الفقد فى حرارة الصفر الثوى، ويرتفع الفقد إلى ستة أمثال فى حرارة ٢٠°م، وإلى ١٢ مثلاً فى حرارة ٣٠°م، و ٢٤ مثلاً فى حرارة ٤٠°م ولذا . فإن الحصاد يجب أن يجرى فى الفترات التى تنخفض فيها درجة الحرارة فى الصباح الباكر. ويبدأ بعض كبار مزارعى الذرة السكرية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية حصاد حقولهم فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويستمر العمل إلى ما قبل الظهر. وبذا تكون حرارة الكيزان عند الحصاد منخفضة بمقدار ٦-١٤°م عما لو أجري الحصاد أثناء النهار (Sims وآخرون ١٩٧٨)

التنفس وإنتاج الإثيلين

يتباين معدل تنفس الذرة السكرية حسب درجة الحرارة، كما يلى (Suslow &

Cantwell ٢٠٠٧)

الفصل العاشر: الخضر القمية المخددة

معدل التنفس (ملليتر ثاني أكسيد كربون/كجم فى الساعة)	الحرارة (م°)
٥١-٣٠	صفر
٨٣-٤٣	٥
١٢٠-١٠٤	١٠
١٧٥-١٥١	١٥
٣١١-٢٦٨	٢٠
٤٣٥-٢٨٢	٢٥

وتنتج الذرة السكرية الإثيلين بمعدل منخفض يقل عن ٠,١ ميكروليتر/كجم فى الساعة على ٢٠ م°، كما يتأثر بالإثيلين الذى قد يتعرض له من مصادر خارجية.

التداول

يجب أن تجرى جميع عمليات التداول بسرعة كبيرة بعد الحصاد؛ مباشرة حتى لا تتدهور نوعية المنتج؛ فينقل المحصول بسرعة إلى محطة التعبئة، ويلى ذلك تبريده - أولياً - بشكل جيد إلى ١٠ م° أو أقل من ذلك فى خلال ساعة واحدة، ثم فرزهِ وتدرجه، ثم تعبئته وتخزينه أو تسويقه. يجرى التبريد الأولى بطريقة الرش بالماء البارد. كما يجب التخلص من ساق الكوز الطويلة، وكذلك تقليم أوراق الكوز الخارجية الطويلة فى نهاية الكوز؛ لأنها تستنفذ الماء من الحبوب، وتحدث فيها بعض الانكماش (يعرف باسم denting). ويكون الانكماش فى الحبوب غير مقبول إذا وصلت نسبة الفقد الرطوبى إلى ٢٪.

وإذا تأخر نقل الذرة السكرية من الحقل بعد حصاده لأكثر من ساعة وجب التخلص من حرارة الحقل والحرارة المنطلقة عن طريق التنفس بتعريض المحصول - سواء أكان محملاً على سيارات النقل، أم غير محمل - لـ "دش" قوى من مياه الآبار التى تكون حرارتها - عادة - منخفضة عن حرارة الهواء، ويكون ذلك بمعدل ٢ م° من الماء لكل طن من الكيزان (Boyette وآخرون ١٩٩٠).

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية - التداول والتخزين والتصدير

يتعين تبريد الذرة السكرية أولياً إلى قريباً من الصفر المئوى خلال ساعة من حصاده، ثم حفظه على الصفر المئوى خلال كل مراحل الشحن والتسويق التالية وبغير ذلك ينخفض محتوى الحبوب من السكر سريعاً إلى أن يصبح بدرجة غير مقبولة للتسويق. ويكون تأثير الذرة الـ sh2 بالحرارة العالية أقل من كل من الـ su والـ se

إن أسرع وسيلة للتبريد الأولى للذرة السكرية هي تحت التفريغ، ويلزم في هذه الحالة رش المنتج بقليل من الماء قبل تعريضه للتفريغ، كما يبرد أولياً - كذلك - بكل من الماء المثلج (بالرش أو بالغمر)، وبالمثلج المجروش المخلوط مع الماء (Talbot وآخرون ٢٠٠٦)

يكون التبريد بالماء المثلج سريعاً حيث تكفى ١٣ دقيقة فقط على ٥,٥°م لخفض الحرارة في مركز القولحة من ١٨ إلى ١١°م، بينما يستغرق ذلك القدر من التبريد نحو ٥ ساعات في الغرف الباردة على ٤°م، إلا أن إضافة الثلج المجروش إلى عبوات الحقل قبل نقلها إلى الغرف المبردة يفيد في إسرار التبريد والمحافظة على جودة الحبوب (عن Salunkhe & Kadam ١٩٩٨)

يلى التبريد الأولى الفرز لاستبعاد الكيزان غير المثلثة، والصغيرة الحجم، والزائدة النضج. والمصابة بالديدان وقد تجرى عملية الفرز قبل عملية التبريد الأولى إذا كان الجو معتدل الحرارة عند الحصاد.

يعبأ المحصول بعد ذلك في صناديق خشبية أو بلاستيكية، تبلغ سعة كل منها من ٧-١١ كجم، وتوضع الصناديق في المخازن، أو في الشاحنات لنقلها إلى الأسواق. ويستمر التبريد في الشاحنات بقذف كميات كبيرة من الثلج المجروش - إلى قطع صغيرة - على الطبقة العليا من العبوات، ويحدث التبريد عندما يتساقط الثلج ويذوب، حيث يتخلل الماء المثلج طبقات المحصول المنعباً في الصناديق

التخزين

التخزين (المبرو) والتهنرات (المصاحبة له)

يعد تحول السكر إلى نشا أهم التغيرات التي تطرأ على محصول الذرة السكرية بعد الحصاد. ولقد وجد كل من Appelman & Arthur منذ عام ١٩١٩ (عن Thompson & Kelly ١٩٥٧) أن الفقد في السكر (بتحويله إلى نشا) يستمر في كل درجات الحرارة، إلى أن تفقد ٦٢٪ من السكريات الكلية، و ٧٠٪ من السكر. وتلك هي حالة التوازن التي تصل إليها المواد الكربوهيدراتية المخزنة في الحبوب. ويؤدي رفع درجة الحرارة إلى إسراع الوصول إلى حالة التوازن هذه. وإلى أن يصل الفقد في السكر إلى ٥٠٪ .. فإن معدل الفقد يتضاعف مع كل زيادة قدرها ١٠ درجات مئوية بين درجتى حرارة الصفر، و ٣٠°م، وهو ما يتمشى مع قانون فانت هوف Van't Hoff بالنسبة للتفاعلات الكيميائية. ويوضح جدول (١٠-١) التغيرات في نسبة السكر بعد يوم واحد من الحصاد، مع التخزين في درجات حرارة منخفضة.

إن أفضل الظروف لتخزين الذرة السكرية هي حرارة الصفر المئوي، ورطوبة نسبية من ٩٥٪-٩٨٪. وتفضل إضافة الثلج المجروش على قمة صناديق التعبئة. يحتفظ محصول الذرة السكرية القياسي بحالته بصورة جيدة تحت هذه الظروف لمدة ٤-٨ أيام، إلا أنه يفقد جزءاً من حلاوته. أما في حرارة ١٠°م، فإن الذرة السكرية لا تحتفظ بجودتها لأكثر من يومين (Nelson & Steinberg ١٩٧٠). وأما محصول الذرة الش2 فيحتفظ بجودته على الصفر المئوي، ومع ٩٥٪-٩٨٪ رطوبة نسبية لمدة ٢١ يوماً.

وجدير بالذكر أنه بعد عدة أيام من التخزين تنخفض نسبة السكر في الأصناف القياسية من نحو ٣٪-٥٪ إلى حوالى ٢٪-٣٪، بينما يكون الانخفاض في الأصناف الفائقة الحلاوة (sh2) - تحت نفس الظروف - من ٧٪-١٠٪ إلى ٥٪-٦٪.

تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثموية - التداول والتخزين والتصدير

جدول (١٠-١). النقص في السكر بعد ٢٤ ساعة من تخزين كيزان الذرة السكرية ستولر إفرجرين Stowell's Evergreen في درجات حرارة مختلفة.

النقص في النسبة المتبقية للسكر	النسبة المتبقية للسكر		حرارة التخزين (م)
	بعد ٢٤ ساعة من التخزين	عدد الحصاد	
٠,٤٨	٥,٤٣	٥,٩١	صفر
١,٠٠	٤,٨٣	٥,٨٣	١٠
١,٥٨	٤,٥٩	٦,١٧	٢٠
٢,٦٩	٢,٦٥	٥,٣٤	٣٠
٣,٠٨	٦,٦٤	٦,٧٢	٤٠

التخزين في الجو المتحكم في مكوناته

يكون تخزين الذرة السكرية في الجو المتحكم في مكوناته - على الصفر المئوي - في ٢-٤٪ أكسجين، و ٥-١٠٪ ثاني أكسيد كربون، إلا أن ذلك يتبع كثيراً على النطاق التجاري يفيد التركيز العالي لثاني أكسيد الكربون في تثبيط فقد السكر والكلوروفيل من أوراق الكوز، بينما تؤدي زيادته عن ذلك أو انخفاض نسبة الأكسجين عن ٢٪ إلى ظهور رائحة وطعم غير مقبولين (عن Saltveit ١٩٩٧).

التخزين في الجو المعدل

يتحقق التخزين في الجو المعدل بتعليق كيزان الذرة بأنواع مختلفة من الأغشية، حيث يؤدي تنفس الحبوب إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون ونقص نسبة الأكسجين حول الحبوب

وقد كانت أغشية البوليوليفين polyolefin (الغشاء AM، و K-400T) أفضل من غشاء البولي فينيل كلورايد PVC كأغشية مطاطة stretch films (أغشية تلف فيها الكيزان وتنصق بها overwrap)، حيث أدت أغشية البوليوليفين إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون ونقص تركيز الأكسجين بدرجة أكبر عما كان عليه الحال عندما استعمل غشاء البولي فينيل كلورايد وقد أفاد ذلك في نقص الإصابة بالأعفان

الفصل العاشر: الخضر للتجميد الأخرى

والمحافظة على الجودة لمدة ١٢ يوماً على حرارة ١°م، و لمدة يومين على حرارة ٢٠°م (Aharoni وآخرون ١٩٩٦)

ووجد Russe & McDonald (١٩٩٠) أن لف كيزان الذرة فى الأغشية التى تنكمش shrink films كان أفضل من لفها فى الأغشية المطاطة stretch films، إذ ازداد مع النوع الأول من الأغشية محتوى الهواء الداخلى من ثانى أكسيد الكربون وانخفض محتواه من الأكسجين بدرجة أكبر مما حدث مع النوع الثانى من الأغشية، وترتب على ذلك زيادة المحافظة على محتوى الحبوب من المواد الصلبة الذائبة الكلية عند التغليف بالـ shrink films.

كما كانت أفضل الظروف لتخزين الذرة السكرية هى بلف كل زوج من الكيزان معاً بالبلاستيك فى صينية، ثم وضع الصوانى فى كراتين مبطنه بالبلاستيك وتركها على ٢°م، أدى ذلك إلى رفع نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى المدى الموصى به وهو ٥-١٠ كيلو باسكال، وتثبيط نمو الأعفان. وأدى فتح البلاستيك المبطن للكراتين عند رفع الحرارة إلى ٢٠°م (فى محاكاة لظروف عدم التبريد بعد انتهاء فترة الشحن أو التخزين) فى استمرار المحافظة على مستوى ثانى أكسيد الكربون المرغوب فيه على الرغم من ارتفاع معدل التنفس، وبذا .. أمكن المحافظة على المنتج لمدة أسبوعين على ٢°م ثم لمدة ٤ أيام إضافية على ٢٠°م (Rodov وآخرون ٢٠٠٠).

مصادر الكتاب

- Abdoul Hakim, A. C. Purvis, and B. G. Mullinix. 1999. Difference in chilling sensitivity of cucumber varieties depends on storage temperature and physiological dysfunction evaluated. *Postharvest Biol. Technol.* 17(2): 97-104.
- Agar, I. T., K. Abak, and G. Yarsi. 1994. Effect of different maturity genes on the keeping quality of Nor (non ripening), Rin (ripening-inhibitor) and normal type tomatoes. *Acta Horticulturae* No. 258: 742-753.
- Agar, T., F. Bangerth, and J. Streif. 1995. Effect of high CO₂ and controlled atmosphere concentrations on the ascorbic acid, dehydroascorbic acid and total vitamin C content of berry fruits. *Acta Horticulturae* No. 398: 93-100.
- Aggelis, A., I. John, and D. Grierson. 1997. Analysis of physiological and molecular changes in melon (*Cucumis melo* L.) varieties with different rates of ripening. *Journal of Experimental Botany* 48(308): 769-778.
- Aguayo, E., V. H. Escalona, and F. Artés. 2008. Effect of hot water treatment and various calcium salts on quality of fresh-cut 'Amarillo' melon. *Postharvest Biology and Technology* 47(3): 397-406.
- Aharoni, Y. and R. Barkai-Golan. 1987. Pre-harvest fungicide sprays and polyvinyl wraps to control *Botrytis* rot and prolong the post-harvest storage life of strawberries. *J. Hort. Sci.* 62(2): 177-181.
- Aharoni, Y. and A. Copel. 1995. The control of postharvest decay in Galia melons using preparations other than Imazalil. *Tropical Science* 35: 17-21.
- Aharoni, Y., A. Copel, H. Davidson, and R. Barkai-Golan. 1992. Fungicide application in water and in wax for decay control in 'Galia' melons. *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science* 20: 177-179.
- Aharoni, Y., A. Copel, and E. Fallik. 1993. Storing 'Galia' melons in a controlled atmosphere with ethylene absorbent. *HortScience* 28: 725-726.
- Aharoni, Y., A. Copel, M. Gil, and E. Fallik. 1996. Polyolefin stretch films maintain the quality of sweet corn during storage and shelf-life. *Postharvest Biology and Technology* 7(1/2): 171-176.
- Aharoni, Y., E. Fallik, A. Copel, M. Gil, S. Grinberg, and J. D. Klein. 1997. Sodium bicarbonate reduces postharvest decay development on melons. *Postharvest Biology and Technology* 10(3): 201-206.

- Amigo Martin, P. and J. Mingot Marcilla. 1996 Vacuum cooling of strawberries. (In Spanish with English summary). Alimentacion Equipos y Tecnologia 15(2): 71-76 c a Hort. Abstr 67(10): 8368; 1997.
- Andrews, J. 1995. The climacteric respiration rise in attached and detached tomato fruit. Postharvest Biology and Technology 6(3/4): 287-292
- Archbold, D. D., T R. Hamilton-Kemp, B E. Langlois, and M M. Barth 1997 Natural volatile compounds control *Botrytis* on strawberry fruit Acta Horticulturae No. 439(II): 923-930
- Arima, S., N. Kondo, and H. Nakamura 1996. Development of robotic system for cucumber harvesting JARQ, Japan Agricultural Research Quarterly 30(4): 233-238.
- Artés, F and A. J. Escriche 1994 Intermittent warming reduces chilling injury and decay of tomato fruit Journal of Food Science 59(5): 1053-1056
- Artés, F., M. A. Conesa, S. Hernandez, and M I Gil 1999 Keeping quality of fresh-cut tomato. Postharvest Biol. Technol. 17(3): 153-162
- Artés-Hernández, F., P. A. Robles, P. A. Gómez, A. Tomás-Callejas, and F Artés. 2010. Low UV-C illumination for keeping overall quality of fresh-cut watermelon. Postharvest Biol. Technol. 55(2): 114-120.
- Arthey, V D 1975. Quality of horticultural products. Butterworths London 228 p
- Arvayo-Ortiz, R. M , S. Garza-Ortega, and E. M. Yahia 1994 Postharvest response of winter squash to hot-water treatment, temperature, and length of storage, HortTechnology 4(3): 253-255
- Atta-Aly, M A and A S. El-Beltagy. 1992 Effect of the cationic chelator EDTA on the ripening of normal tomato fruit and the non-ripening mutants nor, rin. and Nr Postharvest Biol. Technol. 1. 283-293.
- Atta-Aly, M A., G. S. Riad, Z. E. S. Lacheene, and A. S. El-Beltagy 1999. Dynamic exposure to ethanol vapor delays tomato fruit ripening via reversible inhibition of ethylene biosynthesis and action. Egypt J Appl. Sci. 14(8): 228-254.
- Avery, G S , Jr., E. B. Johnson, R. N. M. Addoms, and B. F. Thompson. 1947 Hormones and horticulture McGraw-Hill Book Co., N Y. 326 p
- Avigdon-Avidov, H. 1986 Strawberry, pp 419-448 In S. P. Monchese (ed.).

- CRC handbook of fruit set and development. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
- Ayranci, E. and S. Tunc. 1997. Cellulose-based edible films and their effects on fresh beans and strawberries. *Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung* 205(6): 470-473. c. a. Hort Abstr. 68(8): 6720; 1998.
- Ayub, R., M. Guis, M. Ben Amor, L. Gillot, J. P. Roustan, A. Latche, M. Bouzayen, and J. C. Pech. 1996. Expression of ACC oxidase antisense gene inhibits ripening of cantaloupe melon fruits. *Nature Biotechnology* 14: 862-866.
- Baka, M., J. Mercier, R. Corcuff, F. Castaigne, and J. Arul. 1999. Photochemical treatment to improve storability of fresh strawberries. *J. Food Sci.* 64(6): 1068-1072.
- Bakr, A. A. and R. A. Gawish. 1993. Technology aspects of keeping and pickling qualities of cucumbers as influenced by fertilizers. *Plant Foods for Human Nutrition* 44(1): 17-28
- Bai, J. H., R. A. Saftner, A. E. Watada, and Y. S. Lee. 2001. Modified atmosphere maintains quality of fresh-cut cantaloupe (*Cucumis melo* L.). *J. Food Sci.* 66(8): 1027-1211.
- Bai, J., R. A. Saftner, and A. E. Watada. 2003. Characteristics of fresh-cut honeydew (*Cucumis melo* L.) available to processors in winter and summer and its quality maintenance by modified atmosphere packaging. *Postharvest Biol. Technol.* 28: 349-359.
- Baldwin, E. A. 2004. Flavor. In: ARS, USDA Agric. Handbook 66 revised. The Internet.
- Barker, A. V. and K. M. Ready. 1994. Ethylene evolution by tomatoes stressed by ammonium nutrition. *J. Amer. Soc Hort Sci.* 119(4): 706-710.
- Barros, J. C. da S. M. de, A. de Goes, and K. Minami. 1994. Postharvest storage conditions for sweet pepper fruit (*Capsicum annum* L.) (In Portuguese with English summary). *Scientia Agricola* 51(2): 363-368. c. a. Hort. Abstr. 67(1): 427, 1997.
- Barth, M. M., H. Zhuang, and M. E. Saltveit. 2004. Fresh-cut vegetables. In: ARS, USDA Handbook 66 revised. The Internet.
- Bartz, J. A., C. G. Bayre, M. J. Concelmo, J. K. Brecht, and S. A. Sargent. 2001. Chlorine concentration and the inoculation of tomato fruit in packinghouse dump tanks. *Plant Dis.* 85: 885-889.

- Batu, A and A K. Thompson. 1998. Effects of modified atmosphere packaging on post harvest qualities of pink tomatoes. Turkish J. Agr Forestry 22(4): 365-372
- Baxter, L and L. Waters, Jr 1990a. Controlled atmosphere effect on physical changes and ethylene evolution in harvested okra HortScience 25(1): 92-95
- Beaulieu, J C. 2006. Volatile changes in cantaloupe during growth, maturation, and in stored fresh-cut cubes prepared from fruit harvested at various maturities J Amer Soc Hort Sci. 131(1) 127-139.
- Behboudian, M. H. and C. Tod. 1995 Postharvest attributes of 'Virosa' tomato produced in an enriched carbon dioxide environment HortScience 30(3) 490-491
- Ben Amor, M., J. M Lelièvre, M. Bouzayen, A. Latche, J. C. Pech, B. Florez, and F. Romojaro. 1998 Ethylene-inhibited cantaloupe charantais melons exhibit resistance to chilling injury, p. 31 In: COST 915, Consumer oriented quality improvement of fruit and vegetable products. Polytechnic University of Madrid, Spain.
- Ben-Moualem, D., L. Gusev, O. Dvir, E. Pesis, S. Meir, and A. Lichter 2004. The effects of ethylene, methyl jasmonate and 1-MCP on abscission of cherry tomatoes from the bunch and expression of endo-1,4- β -glucanases. Plant Science 167(3): 499-507.
- Ben-Yehoshua, S., V. Rodov, S. Fishman, J. Peretz, R. de la Asuncion, P. Burns, J. Sornsriwichai, and T. Yantarasi 1996. Perforation effects in modified-atmosphere packaging: model and applications to bell pepper and mango fruits, p. 143-162. In: Proceedings of the Australasian postharvest horticulture conference 'Science and technology for the fresh food revolution'. Department of Natural Resources and Environment, Victoria, Australia. c. a. Hort. Abstr. 67(7): 5986, 1997.
- Ben-Yehoshua, S., V. Rodov, S. Fishman, and J. Peretz 1998 Recent developments in modified-atmosphere packaging of fruit and vegetables: reducing condensation of water in bell peppers and mangoes, pp. 495-404-. In: Ben-Yehoshua. (ed.). 14 th International congress on plastic in agriculture. Laser Pages Publishing, Jerusalem, Israel c. a. Hort Abstr 69(4): 3160, 1999.

- Bergevin, M., G. P. L'Heureux, and C. Willemot. 1993. Tomato chilling tolerance in relation to internal atmosphere after return to ambient temperature. *HortScience* 28(2): 138-140.
- Bhagwan, A., Y. N. Reddy, and P. V. Rao. 2000. Postharvest application of polyamines to improve the shelf-life of tomato fruit. *Indian J. Hort.* 133-138.
- Bhatnagar, D. K. and N. K. Sharma. 1997. Storage studies in different bottle gourd cultivars. *Haryana Agricultural University Journal of Research* 27(1): 15-18. c. a. Hort. Abstr. 68(4): 3138; 1997.
- Bi, Y., S. P. Tian, Y. R. Guo, Y. H. Ge, and G. Z. Qin. 2006. Sodium silicate reduces postharvest decay on hami melons: induced resistance and fungistatic effects. *Plant Dis.* 90(3): 279-283.
- Biles, C. L., M. M. Wall, and K. Blackstone. 1993. Morphological and physiological changes during maturation of New Mexican type peppers. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 118(4): 476-480.
- Blanke, M. M. and P. A. Holthe. 1997. Bioenergetics, maintenance respiration and transpiration of pepper fruits. *J. Plant Phys.* 150(3): 247-250.
- Bokshi, A. I., S. C. Morris, R. M. McConchie, and B. J. Deverall. 2006. Preharvest application of 2,6-dichloroisonicotinic acid, β -aminobutyric acid or benzothiadiazole to control post-harvest storage diseases of melons by inducing systemic acquired resistance (SAR). *J. Hort. Sci. Biotechnol.* 81(4): 700-706.
- Bosland, P. W. and E. J. Votava. 2000. *Peppers: vegetable and spice capsicums*. CABI Publishing, Wallingford UK.
- Bourgeois, G., S. Jenni, H. Laurence, and N. Tremblay. 2000. Improving the prediction of processing pea maturity based on the growing-degree day approach. *HortScience* 35(4): 611-614.
- Bower, J., P. Holford, A. Latché, and J.-C. Pech. 2002. Culture conditions and detachment of the fruit influence the effect of ethylene on the climacteric respiration of melon. *Postharvest Biol. Technol.* 26: 135-146.
- Bower, J. H., W. V. Biasi, and E. J. Mitcham. 2003. Effects of ethylene and 1-MCP on the quality and storage life of strawberries. *Postharvest Biol. Technol.* 28: 417-423.

- Boyette, M. D., L. G. Wilson, and E. A. Estes. 1990. Postharvest cooling and handling of sweet corn. The North Carolina Agricultural Extension Service. AG-413-4. The Internet
- Boyette, M. D., J. R. Schultheis, E. A. Estes, W. C. Hurst, and P. E. Summer. 1994. Postharvest cooling and handling of green beans and field peas. North Carolina Cooperative Extension Service. AG-413-8. The Internet
- Brecht, J. K. 1987. Locular gel formation in developing tomato fruit and the initiation of ethylene production. *HortScience* 22: 476-479.
- Brecht, J. K. 1995. Physiology of lightly processed fruit and vegetables. *HortScience* 30(1): 18-22
- Brecht, J. K. 2003. Harvesting and handling techniques, pp. 383-412. In J. A. Bartz and J. K. Brecht (eds). *Postharvest physiology and pathology of vegetables*. Marcel Dekker, NY.
- Brecht, J. K. 2004. Sweetcorn. In ARS, USDA, *Agric. Handbook* 66 revised. The Internet.
- Brecht, J. K., W. X. Chen, S. A. Sargent, K. Cordasco, and J. A. Bartz. 1999. Exposure of green tomatoes to hot water affects ripening and reduces decay and chilling injury. *Proc. Florida State Hort. Soc.* 112: 138-143
- Buescher, R. W. and K. Adams. 1979. Influence of packaging and storage on quality of pre-snipped and cut snap beans. *Arkansas Farm Res.* 28(4): 14.
- Buescher, R. W. and J. Henderson. 1977. Reducing discoloration and quality deterioration in snap beans (*Phaseolus vulgaris*) by atmospheres enriched with CO₂. *Acta Horticulturae* 62: 55-59
- Buescher, R. W., C. Reitmeier, and W. A. Sistrunk. 1974. Association of phenylalanine ammonia lyase, catecholase, peroxidase, and total phenolic content with brown-end discoloration in snap bean pods. *HortScience* 9: 585
- Burger, Y. and A. A. Schaffer. 2007. The contribution of sucrose metabolism enzymes to sucrose accumulation in *Cucumis melo*. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* Vol. 132: 704-712.
- Bycroft, B. L., V. K. Corrigan, and D. E. Irving. 1999. Heat treatments increase sweetness and flesh colour of buttercup squash. *New Zealand J. Crop Hort. Sci.* 27(4): 265-271

- Cabrera, R. M. and M. E. Saltveit, Jr. 1990. Physiological response to chilling temperatures of intermittently warmed cucumber fruit. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115: 256-261.
- Cabrera, R. M. and M. E. Saltveit. 1993. Characterization of fruit exudates on the chilling injury of cucumber fruits. Acta Hort. No. 343: 290-292.
- Cano, M. P., M. Monreal, B. de Ancos, and R. Alique. 1997. Controlled atmosphere effects on chlorophylls and carotenoids changes in green beans (*Phaseolus vulgaris* L. cv. Perona), pp. 46-52. In: Saltveit (ed.). International Controlled Atmosphere Research Conference. University of California, Davis, California.
- Cao, S. F., Z. C. Hu, and H. O. Wang. 2009. Effect of salicylic acid on the activities of anti-oxidant enzymes and phenylalanine ammonia lyase in cucumber fruit in relation to chilling injury. J. Hort. Sci. Biotechnol. 84(2): 125-130.
- Cantwell, M. 1996. Case study: quality assurance for melons. Preshable Handling Newsletter Issue No. 85: 10-12.
- Cantwell, M. 2004. Tomatillo. In: ARS, USDA Agric. Handbook 66 revised. The Internet.
- Cantwell, M. 2007. Bell pepper: recommendation for maintaining postharvest quality. Produce Facts, Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis.
- Cantwell, M. 2007. Tomatillo (husk tomato) – Recommendations for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis. The Internet.
- Cantwell, M. and S. Portela. 1998. The importance of raw material quality for fresh-cut products: the impact of melon defect as an example. Perishables Handling Quarterly Issue No. 96: 2-3.
- Cantwell, M. and T. V. Suslow. 2007. Eggplant: recommendations for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis. The Internet.
- Cantwell, M. T. Suslow. 2007. Okra. recommendations for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center. University of California, Davis. The Internet.

- Cantwell, M and T. Suslow 2007. Snap beans. recommendations for maintaining postharvest quality Postharvest Technology Research & Information Center, UC, Davis. The Internet.
- Cantwell, M. and A. Thangaiah 2001. Delays to cool affect visual quality, firmness and gloss of bell peppers and eggplants. Perishables Handling Quarter. Issue No. 107. 17-20.
- Cantwell, M., T. Flores-Minutti, and A. Trejo-González 1992. Developmental changes and postharvest physiology of tomatillo fruits (*Physalis ixocarpa* Brot.). Scientia Horticulturae 50: 59-70.,
- Catalano, A. E., A. Schiliro, A. Todaro, R. Palmeri, and G. Spagna. 2007 Enzymatic degradations on fresh-cut eggplants differently packaged. Acta Hort No. 746.
- Chaprasart, P., C. Hansawasdi, and N. Pipattanawong. 2006. The effect of chitosan coating and calcium chloride treatment on postharvest qualities of strawberry fruit (*Fragaria xananassa*) Acta Hort. 708 337-342.
- Charles, M. T., J. Mercier, J. Makhlouf, and J. Arul 2008a. Physiological basis of UV-C-induced resistance to *Botrytis cinerea* in tomato fruit. I Role of pre- and post-challenge accumulation of the phytoalexin-rishutin Postharvest Biol. Technol. 47(1): 10-20.
- Charles, M. T., N. Benhamou, and J. Arul. 2008b. Physiological basis of UV-C-induced resistance to *Botrytis cinerea* in tomato fruit. III Ultrastructural modifications and their impact on fungal colonization. Postharvest Biol Technol. 47(1): 27-40.
- Charles, M. T., A. Goulet, and J. Arul. 2008c. Physiological basis of UV-C-induced resistance to *Botrytis cinerea* in tomato fruit IV. Biochemical modifications of structural barriers. Postharvest Biol. Technol. 47(1) 41-53
- Charles, M. T., K. Tano, A. Asselin, and J. Arul 2009 Physiological basis of UV-C - induced resistance to *Botrytis cinerea* in tomato fruit. Constitutive defence enzymes and inducible pathogenesis-related proteins. Postharvest Biol Technol. 51(3): 414-424
- Chen, F. H., W. Y. Zhang, and G. B. Wu. 1994. Physiological response of alternating-temperature treated sweet peppers to chilling stress. (In Chinese with English summary). Acta Hort. Sinica 21(4): 361-356 c a. Hort Abstr. 65(9): 8019, 1995

- Cheng, J., H. Shen, X. Yang, S. Yu, L. Yuan, Z. Sun, and X. Sun. 2009. Changes in biochemical characteristics related to firmness during fruit development of pepper (*Capsicum annuum* L.). *European J. Hort. Sci.* Vol. 74.
- Cho, M. A., B. M. Hurr, J. Jeong, C. Lim, and D. J. Huber. 2008. Postharvest senescence and deterioration of 'Thoroughbred' and 'Carlo' green beans (*Phaseolus vulgaris* L.) in response to 1-methylcyclopropene. *HortScience* Vol. 43: 427-430.
- Choi, S. T. and D. J. Huber. 2008. Influence of aqueous 1-methylcyclopropene concentration, immersion duration, and solution longevity on the postharvest ripening of breaker-turning tomato (*Solanum lycopersicum* L.) fruit. *Postharvest Biol. Technol.* 49(1): 147-154.
- Choi, S. T., O. Tsouvaltzis, C. I. Lim, and D. J. Huber. 2008. Suppression of ripening and induction of asynchronous ripening in tomato and avocado fruits subjected to complete or partial exposure to aqueous solutions of 1-methylcyclopropene. *Postharvest Biol. Technol.* 48(2): 206-214.
- Choi, S. T., D. J. Huber, J. G. Kim, and Y. P. Hong. 2009. Influence of chlorine and mode of application on efficacy of aqueous solutions of 1-methylcyclopropene in delaying tomato (*Solanum lycopersicum* L.) fruit ripening. *Postharvest Biol. Technol.* 53(1-2): 16-21.
- Chomchalow, S., N. M. El Assi, S. A. Sargent, and J. K. Brecht. 2002. Fruit maturity and timing of ethylene treatment affect storage performance of green tomatoes at chilling and nonchilling temperatures. *HortTechnology* 12(1): 104.
- Civello, P. M., G. A. Martinez, A. R. Chaves, and M. C. Anon. 1997. Heat treatments delay ripening and postharvest decay of strawberry fruit. *J. Agric. Food Chem.* 45(12): 4589-4594.
- Cliff, M., S. Lok, C. Lu, and P. M. A. Toivonen. 2009. Effect of 1-methylcyclopropene on the sensory, visual, and analytical quality of greenhouse tomatoes. *Postharvest Biol. Technol.* 53(1-2): 11-15.
- Cohen, J. D. 1996. In vitro tomato fruit cultures demonstrate a role for indole-3-acetic acid in regulating fruit ripening. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 121(3): 520-524.
- Costa, M. A. C., J. K. Brecht, S. A. Sargent, and D. J. Huber 1994. Tolerance of snap beans to elevated CO₂ levels. *Proc. Florida State Hort. Soc.* 107: 271-273.

- Coté, F., J. E. Thompson, and C. Willemot. 1993. Limitation to the use of electrolyte leakage for the measurement of chilling injury in tomato fruit. *Postharvest Biology and Technology* 3(2): 103-110.
- Craft, C. C. and P. H. Heinze. 1954. Physiological studies of mature-green tomatoes in storage. *Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.* 64: 343-350.
- Czapski, J. and M. Saniewski. 1992. Stimulation of ethylene production and ethylene-forming enzyme activity in fruits of the non-ripening nor and rin tomato mutants by methyl jasmonate. *Journal of Plant Physiology* 139(3): 265-268.
- Dal Bell, G., C. Mónaco, M. C. Rollan, G. Lampugnani, N. Arteta, C. Abramoff, L. Ronco, and M. Stocco. 2008. Biocontrol of Postharvest grey mould on tomato by yeasts. *J. Phytopathol.* 156(5): 257-263.
- Daood, H. G., M. Vinkler, F. Markus, E. A. Eebshi, and P. A. Biacs. 1996. Antioxidant vitamin content of spice red pepper (paprika) as affected by technological and varietal factors. *Food Chemistry* 55(4): 365-372.
- Davis, J. M., and R. G. Gardner. 1994. Harvest maturity affects fruit yield, size, and grade of fresh-market tomato cultivars. *HortScience* 29(6): 613-615.
- DeEll, J. R. 2004. Leek. In: *ARS, USDA Agric. Handbook* 66 revised. The Internet.
- DeEll, J. R., C. Vigneault, and S. Lemerre. 2000. Water temperature for hydrocooling field cucumbers in relation to chilling injury during storage. *Postharvest Biol. Technol.* 18: 27-32.
- De León-Sánchez, F. D. et al. 2009. Effect of refrigerated storage on aroma and alcohol dehydrogenase activity in tomato fruit. *Postharvest Biol. Technol.* 54(2): 93-100.
- Deswarte, C. J., M. A. Martinez-Tellez, A. A. Gardea, J. N. Mercado, and I. Vargas. 1995. Thermal conditioning to reduce chilling injury in zucchini and its effect on phenol metabolism enzymes. (In Spanish with English summary). *Proceedings of the Interamerican Society for Tropical Horticulture* 39: 33-38.
- de Wild, H. P. J., P. A. Balk, E. C. A. Fernandes, and H. W. Peppelenbos. 2005. The action site of carbon dioxide in relation to inhibition of ethylene production in tomato fruit. *Postharvest Biol. Technol.* 36: 273-280.

- Diaz-Pérez, J. C. 1998. Packaging of 'Classic' and 'Japanese' aubergines (*Solanum melongena* L.) with polyethylene films (In Spanish with English summary). *Agrociencia* 32(1): 71-74. c. a. Hort. Abstr. 69(4): 3165, 1999.
- Dodds, G. T., L. Trenholm, and C. A. Madramootoo. 1996. Effects of watertable and fertilizer management on susceptibility of tomato to chilling injury. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 121(3): 525-530.
- Dostal, H. C. and G. E. Wilcox. 1971. Chemical regulation of fruit ripening of field-grown tomatoes with (2-chloroethyl) phosphonic acid. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 96: 656-660.
- Dris, R., R. Niskanen, and S. M. Jain. 2001. Crop management and postharvest handling of horticultural products. Vol. 1. Quality management. Science Publishers, Inc., Enfield, NH, USA. 364 p.
- Du, J. H., M. R. Fu, M. M. Li, and W. Xia. 2007. Effects of chlorine dioxide gas on postharvest physiology and storage quality of green bell pepper (*Capsicum frutescens* L. var. *longrum*). *Agr. Sci. China* 6(2): 214-219.
- Dvir, O. et al. 2009. Low humidity after harvest changes abscission site in bunch cherry tomatoes. *Sci. Food Agric.* 89(9): 1519-1525.
- Edelstein, M., H. Nerson, and H. S. Paris. 1989. Quality of spaghetti squash as affected by fruit maturity, storage period, and cooking duration. *Acta Horticulturae* No. 258: 543-545.
- Edmond, J. B., T. L. Senn, F. S. Andrews, and R. G. Halfacre. 1975. *Fundamentals of horticulture*. (4th ed.). McGraw-Hill Book Co., N. Y. 560 p.
- Edwards, M. and R. Blennerhassett. 1994. Evaluation of wax to extend the postharvest storage life of honeydew melons (*Cucumis melo* L. var. *inodorus* Naud.). *Australian Journal of Experimental Agriculture* 34(3): 427-429.
- El Assi, N., D. J. Huber, and J. K. Brecht. 1997. Irradiation-induced changes in tomato fruit pericarp firmness, electrolyte efflux, and cell wall enzyme activity as influenced by ripening stage. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 122(1): 100-106.
- El Ghouth, A., J. Arul, and R. P. M. Boulet. 2007. Use of chitosan coating to reduce water loss and maintain quality of cucumber and bell pepper fruits. *J. Food Proc. Preservation* 15(5): 359-368.

- Elkashif, M. E., D. J. Huber, and J. K. Brecht 1989. Respiration and ethylene production in harvested watermelon fruit. evidence for nonchmacteric respiratory behavior. J. Amer. Soc. Hort. Sci 114: 81-85
- Erkan, M., S. Y. Wang, and C. Y. Wang 2008. Effect of UV treatment on antioxidant capacity in strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology 48(2): 163-171.
- Ezura, H. and W. O. Owino. 2008. Melon, an alternative model plant for elucidating fruit ripening. Plant Sci. 175(1-2): 121-129.
- Fallik, E., J. Klein, S. Grinberg, E. Lomanec, S. Lurie, and A. Lalazar 1993. Effect of postharvest heat treatment of tomatoes on fruit ripening and decay caused by *Botrytis cinerea*. Plant Disease 77(10): 985-988.
- Fallik, E., N. Temkin-Gorodeiski, S. Grinberg, I. Rosenberger, B. Shapiro, and A. Apelbaum 1994. Bulk packaging for the maintenance of eggplant quality in storage. J. Hort. Sci. 69(1): 131-135.
- Fallik, E., Y. Aharoni, S. Grinberg, A. Copel, and J. D. Klein 1994. Postharvest hydrogen peroxide treatment inhibits decay in eggplant and sweet red pepper. Crop Protection 13(6): 451-454.
- Fallik, E., N. Temkin-Gorodeiskin, S. Grinberg, and H. Davidson. 1995. Prolonged low-temperature storage of eggplants in polyethylene bags. Postharvest Biology and Technology 5(1/2): 83-89.
- Fallik, E., S. Grinberg, S. Alkalai, and S. Lurie. 1996. The Effectiveness of postharvest hot water dipping on the control of grey and black moulds in sweet red pepper (*Capsicum annuum*). Plant Pathology 45(4): 644-649.
- Fallik, E., S. Grinberg, and O. Ziv. 1997. Potassium bicarbonate reduces postharvest decay development on bell pepper fruit. J. Hort. Sci. 72(1): 35-41.
- Fallik, E., S. Grinberg, S. Alkalai, O. Yekutieli, A. Wiseblum, R. Regev, H. Beres, and E. Bar-Lev. 1999. A unique rapid hot water treatment to improve storage quality of sweet pepper. Postharvest Biology and Technology 15(1): 25-32.
- Fallik, E. A. et al. 2000. Reduction of postharvest losses of galia melon by short hot-water rinse. Plant Pathology 49(3): 333-338
- Fallik, E., Z. Ilic, S. Alkalai-Tuvia, A. Copel, and Y. Polevaya 2002. A short hot water rinsing and brushing reduces chilling injury and enhances

- resistance against *Botrytis cinerea* in fresh harvested tomato. Adv. Hort Sci. 16(1): 3-6.
- Fallik, E., Y. Polevoya, S. Tuvia-Alkalai, Y. Shalom, and H. Zuckermann. 2003. A 24-h anoxia treatment reduces decay development while maintaining tomato fruit quality. Postharvest Biology and Technology 29: 233-236.
- Fallik, E., Y. Shalom, S. Alkalai-Tuvia, O. Larkov, E. Brandies, and U. Ravid. 2005. External, internal and sensory traits in Galia-type melon treated with different waxes. Postharvest Biol. Technol. 36: 69-75.
- Fallik, E., V. Rodov, B. Horev, S. Sela, S. Alkalai-Tuvia, and Y. Vinokur. 2007. Hot water rinsing and brushing technology for the fresh-cut industry. Acta Hort. 746: 229-239.
- Fan, H., S. Q. Feng, and Y. M. Zhao. 1996. The correlation of polyamines with chilling injury of cucumber and tomato and the treatments for alleviating chilling injury. (In Chinese with English summary). Journal of China Agricultural University 1(1): 108-112. c. a. Hort. Abst. 67(11): 9486, 1997.
- Fan, Y., Y. Xu, D. Wang, L. Zhang, J. Sun, L. Sun, and B. Zhang. 2009. Effect of alginate coating combined with yeast antagonist on strawberry (*Fragaria xananassa*) preservation quality Postharvest Biol. Technol. 53(1-2): 84-90.
- Farag, K. M. and J. P. Palta. 1993. Use of natural lipids to accelerate ripening and enhance storage life of tomato fruit with and without ethephon. HortTechnology 3(1): 62-65.
- Felkey, K., D. L. Archer, J. A. Bartz, R. M. Goodrich, and K. R. Schneider. 2006. Chlorine disinfection of tomato surface wounds contaminated with *Salmonella* spp. HortTechnology 16(2): 253-256.
- Fernández-Trujillo, J. P., J. F. Nock, and C. B. Watkins. 1999. Fermentative metabolism and organic acid concentrations in fruit of selected strawberry cultivars with different tolerances to carbon dioxide. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 124(6): 696-701.
- Ferrante, A., A. Spinardi, T. Maggiore, A. Testoni, and P. M. Gallina. 2008. Effect of nitrogen fertilization levels on melon fruit quality at the harvest time and during storage. J. Sci. Food Agr. 88(4): 707-713

- Ferreira, M. D., J. K. Brecht, S. A. Sargent, and J. J. Aracena. 1994. Physiological responses of strawberry to film wrapping and precooling methods. *Proceedings of the Florida State Horticultural Society* 107: 265-269.
- Ferreira, M. D., J. B. Brecht, S. A. Sargent, and C. K. Chandler. 2006. Hydrocooling as an alternative to forced-air cooling for maintaining fresh-market strawberry quality. *HortTechnology* Vol. 16: 659-666.
- Flores, F., C. Martinez, F. Romojaro, M. Guis, M. Ben Amor, J. C. Pech, and A. Latché. 1998. Biochemical features of antisense ACC oxidase cantaloupe charantais melons, p. 110. In: COST 915, consumer oriented quality improvement of fruit and vegetable products. Polytechnic University of Madrid, Spain.
- Flores, F. et. al. 2002. Role of ethylene in the biosynthetic pathway of aliphatic ester aroma volatiles in charantais cantaloupe melons. *J. Exp. Bot.* 53(367): 201-206.
- Fonseca, J. M., J. W. Rushing, and R. F. Testin. 2004. The anaerobic compensation point for fresh-cut watermelon and implications for postprocess handling. *HortScience* 39(3): 562-566.
- Freire, J. R. M. and C. F. Robbs. 2000. Isolation and identification of pathogenic bacteria in minimal processed hydroponic lettuce. *Alimentaria* 37(309): 55-60. *c a Hort Abstr.* 70(8): 6732; 2000.
- Frezza, D., S. Moccia, G. Trinchero, A. Fraschina, and A. Chiesa. 1998. MAP: polyolefin and PVC films on the quality and shelf life of tomatoes (1), pp. 513-520. In: S. Ben-Yehoshua (ed.). Fourteenth International Congress on Plastics in Agriculture. Laser Pages Publishing, Jerusalem, Israel.
- Fuchs, Y., A. Weksler, I. Rot, E. Pesis, and E. Fallik. 1995. Keeping quality of cherry tomatoes designated for export. *Acta Hort.* No. 398: 257-264.
- Gaffe, J., D. M. Tieman, and A. K. Handa. 1994. Pectin methylesterase isoforms on tomato (*Lycopersicon esculentum*) tissues. Effects of expression of a pectin methylesterase antisense gene. *Plant Physiology* 105 (1): 199-203.
- Gal, S., S. Alkalai-Tuvia, Y. Elkind, and E. Fallik. 2006. Influence of different concentrations of 1-methylcyclopropene and times of exposure

- on the quality of 'Galia' type melon harvested at different stages of maturity. J Hort. Sci. Biotechnol. 81 (6): 975-982.
- Garcia, J. M., J. M. Ballesteros, and M. A. Albi. 1995. Effect of foliar applications of CaCl_2 on tomato stored at different temperatures. J Agric. Food Chem. 43 (1): 9-12.
- Garcia, J. M. and M. Olias. 1998. Strawberry packing for the fresh market. (In Spanish). Horticultura Internacional 6 (20): 33-36, 38. c.a. Hort. Abstr. 69(4): 2948; 1999.
- Garcia, J. M., C. Aguilera, and A. M. Jiménez. 1996. Gray mold infection and quality of strawberry fruit following postharvest heat treatment. HortScience 31(2): 255-257.
- Garcia, M. A., M. N. Martino, and N. E. Zaritzky. 1998. Plasticized starch-based coatings to improve strawberry (*Fragaria xananassa*) quality and stability. Journal of Agricultural and Food Chemistry 46(9): 3758-3767.
- Garcia, J. M., R. J. Medina, and J. M. Olias. 1998. Quality of strawberries automatically packed in different plastic films. Journal of Food Science 63(6): 1037-1041.
- Gersch, K. P., C. E. Motsembocker, and G. A. Long. 1998. Anatomical description of the fruit-receptacle detachment area in cayenne pepper. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 123(4): 550-555.
- Gherbin, P., K. Gulfo, and E. Tarantino. 2000. Growth pattern of okra pods: biometric and qualitative aspects. (In Italian with English summary). Italus Hortus 7(5): 8-16. c. a. Hort. Abstr. 71(3): 2400; 2001.
- Ghaouth, A. E., J. Arul, C. Wilson, and N. Benhamou. 1997. Biochemical and cytochemical aspects of the interactions of chitosan and *Botrytis cinerea* in bell pepper fruit. Postharvest Biology and Technology 12(2): 183-194.
- Gichohi, E. G. and M. K. Pritchard. 1995. Storage temperature and maleic hydrazide effects on sprouting, sugars, and fry color of Sebepody potatoes. Amer. Potato J 72(12): 737-747.
- Gladon, R. J., C. A. Reitmeyer, M. L. Gleason, G. R. Nonnecke, N. H. Agnew, and D. G. Olson. 1997. Irradiation of horticultural crops at Iowa State University. HortScience 32(4): 582-585.
- Gómez, P. et al. 2009. Structural changes, chemical composition and

- antioxidant activity of cherry tomato fruits (cv Micro-Tom) stored under optimal and chilling conditions. J Sci Food Agric. 89(9): 1543-1551
- Gomez-Ladron de Guevara, R., V. Parra-Lopez, J E Pardo-Gonzalez, M L A. Saus, and R. Varon-Castellanos. 1998. Influence of storage conditions on pigment degradation in paprikas from different greenhouse pepper cultivars. J. Sci. Food Agric. 78(3): 321-328.
- Gonnella, M. et al. 2009 Yield and quality of early potato cultivars in relation to the use of glufosinate-ammonium as desiccant J. Sci. Food Agr. 89(5). 855-860.
- González-Aguilar, G. A. 2004. Pepper. In: ARS, USDA Agric. Handbook 66 revised. The Internet.
- Gonzalez, G and M. Tiznado. 1993 Postharvest physiology of bell peppers stored in low density polyethylene bags. Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie 26(5). 450-455.
- González-Aguilar, G. A., R. Cruz, R. Baez, and C. Y. Wang. 1999 Storage quality of bell peppers pretreated with hot water and polyethylene packaging. J. Food Quality 22(3): 287-299.
- González-Aguilar, G. A., L. Gayosso, R. Cruz, J. Fortiz, R. Báez, and C. Y. Wang. 2000. Polyamines induced by hot water treatments reduce chilling injury and decay in pepper fruit. Postharvest Biology and Technology 18: 19-26.
- Gould, W. A. 1974. Tomato production, processing and quality evaluation The AVI Pub. Co., Inc., Westport, Conn. 445. p.
- Grevsen, K. and J.N. Sorensen. 2004. Sprouting and yield in bulb onions (*Allium cepa* L.) as influenced by cultivar, plant establishment methods, maturity at harvest and storage conditions. J. Hort. Sci. Biotechnol. 79(6): 877-884.
- Grierson, D. and A. A. Kader. 1986. Fruit ripening and quality p. 241-280. In: J. G. Atherton and J. Rudich (eds) The tomato crop. Chapman and Hall, London.
- Gross, K. C. and S. J. Wallner. 1979. Degradation of cell wall polysaccharides during tomato fruit ripening. Plant Physiology 63: 117-120
- Grzegorzewska, M., F. Adamicki, and K. Elkner. 1998. Comparison of

- storage ability of some Chinese cabbage cultivars (*Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Olsson) from spring, summer and autumn production. Vegetable Crops Research Bulletin 49: 95-106. c. a. Hort. Abstr. 69(7): 5939; 1999.
- Guis, M., R. Botondi, A. Ben-Amor, R. Ayub, M. Bouzayen, J. C. Pech, and A. Latché 1997. Ripening-associated biochemical traits of cantaloupe charantais melons expressing an antisense ACC oxidase transgene J. Amer. Soc. Hort. Sci. 122(6): 748-751.
- Guo, X., J. Chen, R. E. Bracket, and L.R. Beuchat. 2002. Survival of *Salmonella* on tomatoes at high relative humidity, in soil, and in tomatoes in contact with soil. J. Food Prot. 65(2). 274-279.
- Guzmán, I.L. 1997. Food safety and fresh-cut cantaloupe. Preshables Handling Quarterly (UC, Davis) 91: 13-14.
- Hakim, A., I. Voipio, and E. Kaukovirta. 1995. Heat stress and chilling sensitivity of different ripening classes of tomatoes. Acta Hort. No. 412: 209-214.
- Hakim, A., E. Kaukovirta, E. Pehu, and I. Voipio. 1996. Qualities of heat treated tomatoes after storage. Acta Hort. No. 429: 473-479.
- Hakim, A., E. Kaukovirta, E. Pehu, and L. Voipio. 1997. Effect of hot water, immersion time, and length of storage on chilling injury of tomato fruit. J. Veg. Crop Prod. 3(2): 17-27.
- Hakim, A., E. Kaukovirta, E. Pehu, I. Voipio, and A. C. Purvis. 1997. Reducing chilling injury of cold-stored tomato fruit by intermittent warming. Adv. Hort. Sci. 11(3): 142-146.
- Hall, R. H. 1968. Fruit & vegetable facts & pointers: sweet corn. United fresh Fruit and Vegetable Association. Alexandrin, Virginia. 22p.
- Hamaizu. Y., Y. Miyamoto, and K. Chachin. 1994. Effect of high temperatures on the change of carotenoid contents in tomato fruit after harvest. (In Japanese with English summary). J. Jap. Soc. Hort. Sci. 63(3): 675-684. (c. a. Hort. Abstr. 65(8): 7129;1995).
- Han, C., Y. Zhao, S. W. Leonard, and M. G. Traber. 2004. Edible coatings to improve storability and enhance nutritional value of fresh and frozen strawberries (*Fragaria × ananassa*) and raspberries (*Rubus ideaus*). Postharvest Biology and Technology 33: 67-78.

- Hancock, J. F. 1999. Strawberries. CABI Publishing, CAB International, Wallingford. UK 237 p.
- Harker, F. R., J. J. Elgar, C. B. Watkins, P. J. Jackson, and I. C. Hallett. 2000. Physical and mechanical changes in strawberry fruit after high carbon dioxide treatments. *Postharvest Biol. Technol.* 19: 139-146.
- Harvey, E. M. 1931. A Preliminary report on the vegetable growth of okra in relation to the production of varying amounts of reproduction tissue. *Oreg. Exp. Sta. Bull.* 284.
- Harvey, W. J., D. G. Grant, and J. P. Lammerink. 1997. Physical and sensory changes during the development and storage of buttercup squash. *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science* 25(4): 341-351.
- Hawthorn, L. R. and L. H. Pollard. 1954. Vegetable and flower seed production. The Blakiston Co., Inc., N. Y. 626 p.
- Heinze, P. H. and C. C. Crall. 1953. Effectiveness of ethylene for ripening tomatoes. *Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.* 62: 397-404.
- Henderson, J. R. and R. W. Buescher. 1977. Effects of sulfur dioxide and controlled atmospheres on broken-end discoloration and processed quality attributes in snap beans. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 102(6): 768-770.
- Henderson, J. R., R. W. Buescher, and T. E. Morelock. 1997. Influence of genotype and CO₂ on discoloration, phenolic content, peroxidase, and phenolase activities in snap beans. *HortScience* 12(5): 453-454.
- Henz, G. P. and C. Silva. 1995. Conservation of aubergine fruits, cv. Cica, by refrigeration and film-wrapping. (In Portuguese with English summary). *Pesquisa Agropecuaria Brasileira* 30(2): 157-162. c. a. *Hort. Abstr.* 67(6): 5004; 1997.
- Hetzroni, A., J. E. Simon, M. Benady, and B. Bordelon. 1994. Electronic sensing of aromatic volatiles for quality sorting in strawberries. Paper - American Society of Agricultural Engineers No. 946029. 7 p.
- Hobson, G. E. 1987. Low-temperature injury and the storage of ripening tomatoes. *J. Hort. Sci.* 62: 55-62.
- Hodges, D. M. and G. E. Lester. 2006. Comparisons between orange- and green-fleshed non-netted and orange-fleshed netted muskmelons. antioxidant changes following different harvest and storage periods. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 131(1).

- Hoeberichts, F. A., L. H. W. van der Plas, and E. J. Woltering. 2002. Ethylene perception is required for the expression of tomato ripening-related genes and associated physiological changes even at advanced stages of ripening. *Postharvest Biol. Technol.* 26: 125-133.
- Hoffman, J. C. 1971. Injury of snap bean pods associated with machine harvesting and handling. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 96: 21-24.
- Holcroft, D. M. and A. A. Kader. 1999a. Carbon dioxide-induced changes in color and anthocyanin synthesis of stored strawberry fruit. *HortScience* 34(7): 1244-1248.
- Holcroft, D. M. and A. A. Kader. 1999b. Controlled atmosphere induced changes in pH and organic acid metabolism may affect color of stored strawberry fruit. *Postharvest Biology and Technology* 17(1): 19-32.
- Hong, J. H. and K. C. Gross. 1998. Surface sterilization of whole tomato fruit with sodium hypochlorite influence subsequent postharvest behavior of fresh-cut slices. *Postharvest Biol. Technol.* 13(1): 51-58.
- Hong, J. H. and K. C. Gross. 2000. Involvement of ethylene in development of chilling injury in fresh-cut tomato slices during cold storage. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 125(6): 736-741.
- Hong, J. H. and S. K. Lee. 1995. Changes in cell wall materials of tomato fruits during ripening (In Korean with English summary). *J. Korean Soc. Hort. Sci.* 36(1): 57-61 (c. a. Hort. Abstr. 65: 6072, 1995).
- Hong, J. H. and S. K. Lee. 1996. Effect of ethanol treatment on the ripening of tomato fruit. *J. Korean Soc. Hort. Sci.* 37(2): 193-196.
- Hong, H. H. S. J. Hong, S. K. Lee, and J. K. Kim. 1995. Effect of nutrient calcium on the ripening of tomato fruit. (in Korean with English summary). *J. Korean. Soc. Hort. Sci.* 36(5): 595-600/ (c. a. Hort. Abstr. 66: 1473, 1996).
- Hong, J. H., S. K. Lee, and J. K. Kim. 1995. Ethanol inhibits ripening of tomato fruit. *Acta Hort.* No. 398: 147-157.
- Hong, S. J., S. K. Lee, and J. K. Kim. 1996. Changes in cell wall carbohydrates and glycanase activity and their relationship to the ripening of tomato fruits. *J. Korean Soc. Hort. Sci.* 37(3): 380-385.
- Hong, J. H., D. J. Mills, C. B. Coffman, J. D. Anderson, M. J. Camp, and K.

- C. Gross. 2000. Tomato cultivation systems affect subsequent quality of fresh-cut fruit slices. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 125(6): 729-735.
- Howard, L. R. and C. Hernandez-Brenes. 1998. Antioxidant content and market quality of jalapeno pepper rings as affected by minimal processing and modified atmosphere packaging *J. Food Quality* 21(4): 317-327
- Huang, Y., B. J. Deverall, W. H. Tang, W. Wang, and F. W. Wu. 2000. Foliar application of acibenzolar-S-methyl and protection of postharvest rock melons and Hami melons from disease *Europ. J. Plant Pathol.* 106: 651-656.
- Hwang, Y. S., Y. A. Kim, and W. S. Lee. 1999. Effect of postharvest CO₂ application time on the flesh firmness and quality in 'Nyoho' strawberries (In Korean with English summary). *J. Korean Soc. Hort. Sci.* 40(2): 179-182. c. a. Hort. Abstr. 69(10): 8524; 1999.
- Idle, L. E. 1950. Factors affecting the objective and organoleptic evaluation of quality in raw and canned peas. *Food Technology* 4(4): 1-9.
- Imani, Y., A. Ait-Oubahou, and M. El-Otmani. 1995. Characterization and control of chilling injury in cucumbers, pp. 241-249. In: A. Ait Oubahou and M. El-Otmani (eds.). *Postharvest physiology, pathology and technologies of horticultural commodities: recent advances*. Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Agadir, Morocco. c. a. Hort. Abstr. 66(8): 6837; 1996.
- Inaba, M. and K. Chachin. 1998. Influence of and recovery from high-temperature stress on harvested mature green tomatoes. *HortScience* 23: 190-192.
- Inaba, M. and P. G. Crandall. 1988. Electrolyte leakage as an indicator of high-temperature injury to harvested mature green tomatoes. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 133: 96-99.
- Irving, D. E., P. I. Hurst, and J. S. Ragg. 1997. Changes in carbohydrates and carbohydrate metabolizing enzymes during the development, maturation, and ripening of buttercup squash (*Cucurbita maxima* D. 'Delica'). *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 122(3): 310-314.
- Irving, D. E., G. J. Shingleton, and P. L. Hurst. 1999. Starch degradation in buttercup squash (*Cucurbita maxima*) *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 124(6): 589-590

- Islam, M. S., T. Matsui, and Y. Hoshida. 1995. Effect of preharvest carbon dioxide enrichment on the postharvest quality of tomatoes. J. Japanese Soc. Hort. Sci. 64(3): 649-655 (c. a. Hort. Abstr. 66: 3269, 1996).
- Iwahori, S. and J. M. Lynos. 1970. Maturation and quality of tomatoes with preharvest treatments of 2-chloroethylphosphonic acid. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 95: 88-91.
- Iwahori, Y., Y. Kanetsune, Y. Ueda, and K. Chachin. 2000. Changes in hydrogen peroxide content and antioxidative enzyme activities during the maturation of sweet pepper (*Capsicum annuum* L.) fruit. J. Jap. Soc. Hort. Sci. 69(6): 690-695.
- Jackman, R. L., A. G. Marangoni, and D. W. Stanley. 1990. Measurement of tomato fruit firmness. HortScience 25: 781-783.
- Janssens, M. F. M. 1994. Development of intelligent CA storage systems for fruit and vegetables. CA containers, pp. 89-93. In: P. Eccher Zerbini et al. (eds.). The post-harvest treatment of fruit and vegetables: controlled atmosphere storage of fruit and vegetables. Commission of the European Communities, Brussels, Belgium. c. a. Hort. Abstr. 66(9): 7782, 1996.
- Jennings, P. and M. E. Saltveit. 1994. Temperature and chemical shocks induce chilling tolerance in germinating *Cucumis sativus* (cv. Poinsett 76) seeds. Physiologia Plantarum 91(4): 703-707.
- Jeong, J., J. Lee, and D. J. Huber. 2007. Softening and ripening of 'Athena' cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. *reticulatus*) fruit at three harvest maturities in response to the ethylene antagonist 1-methylcyclopropene. HortScience 42: 1231-1236.
- Jeong, J., J. K. Brecht, D. J. Huber, and S. A. Sargent. 2008. Storage life and deterioration of intact cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. *reticulatus*) fruit treated with 1-methylcyclopropene and fresh-cut cantaloupe prepared from fruit treated with 1-methylcyclopropene before processing. HortScience vol. 43: 435-438.
- Jiang, Y., D. C. Joyce, and L. A. Terry. 2001. 1-Methylcyclopropene treatment affects strawberry fruit decay. Postharvest Biology and Technology 23: 227-232.
- Jolliffe, P. A. and W. C. Lin. 1997. Predictors of shelf life in long English cucumber. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 122(5): 686-690.

- Jones, H. A. and J. T. Roza. 1928. Truck crop plants. McGraw-Hill Book Co., Inc., N. Y. 538 p.
- Kader, A. A. 1991. Quality and its maintenance in relation to the postharvest physiology of strawberry, pp. 145-152. In: A. Dale and J. J. Luby (eds) The strawberry into the 21st century. Timber Press, Portland, Oregon.
- Kader, A. A., M. A. Srevens, M. Albright-Holton, L. L. Morris, and M. Algazi. 1977. Effect of fruit ripeness when picked on flavor and composition in fresh market tomatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 102(6): 724-731.
- Kader, A. A., R. F. Kasmire, F. G. Mitchell, M. S. Reid, N. F. Sommer, and J. F. Thompson. 1985. Postharvest technology of horticultural crops. Univ. Calif., Div. Agric. Natural Resources. 192 p.
- Kagan-Zur, V. and Y. Mizrahi. 1993. Long shelf-life small sized (cocktail) tomatoes may be picked in bunches. Scientia Horticulturae 56(1): 31-41.
- Kahn, B. A., J. E. Motes, and N. O. Maness. 1997. Use of ethephon as a controlled abscission agent on paprika pepper. HortScience 32(2): 251-255.
- Kan, E. E. L., S. A. Sargent, A. Simonne, N. L. Shaw, and D. J. Cantliffe. 2007. Changes in the postharvest quality of Datil hot peppers as affected by storage temperature. Proc. Fla. State Hort. Sci. 120: 246-250.
- Karakurt, Y. and D. J. Huber. 2008. Cloning and characterization of differentially expressed genes in ethylene-treated watermelon fruit. Postharvest Biol. Technol. 48(3): 372-377.
- Kaynas, K., N. Sürmeli, and N. Türkes. 1992. Effects of preharvest treatments of ethephos and postharvest treatments of ethephos, calcium carbide, and potassium permanganate on ripening of some tomato varieties. (In Turkish with English summary). Bahçe 21(1-2): 13-20. (c. a. Hort. Abstr. 64: 9627; 1994).
- Kaynas, K., S. Özelkoc, N. Sürmeli, and K. Abak. 1995. Controlled and modified atmosphere storage of eggplant (*Solanum melongena* L.) fruits. Acta Horticulturae No. 412: 143-151.
- Kesta, S. and B. Chutichudet. 1994. Pod growth, development, biochemical changes and maturity indices of okra cv. OK#2. Acta Hort. No. 369: 368-377.

- Kim, G. H. and R. B. H. Wills. 1998. Interaction of enhanced carbon dioxide and reduced ethylene on the storage life of strawberries. *J. Hort. Sci. Biotechnol.* 73(2): 181-184.
- Khosroshahi, M. R. Z., M. Esna-Ashari, and A. Ershadi. 2007. Effect of exogenous putrescine on post-harvest life of strawberry (*Fragaria ananassa* Duch. fruit, cultivar Selva. *Sci. Hort.* 114(1): 27-32.
- Klee, H. J., M. B. Hayford, K. A. Kretzmer, G. F. Barry, and G. M. Kishore. 1991. Control of ethylene synthesis by expression of a bacterial enzyme in transgenic tomato plants. *Plant Cell* 3(11): 1187-1193.
- Klieber, A., W. C. Lin, P. A. Jolliffe, and J. W. Hall. 1993. Training systems affect canopy light exposure and shelf life of long English cucumber. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 118(6): 786-790.
- Kim, H. J., J. M. Fonseca, C. Kubota, M. Kroggel, and J. H. Choi. 1969. Quality of fresh-cut tomatoes as affected by salt content in irrigation water and post-processing ultraviolet-C treatment. *J. Sci. Food Agr.* 88(11): 1969-1974.
- Kluge, R. A., V. A. Modolo, A. P. Jacomino, J. A. Scarpate Folho, J. Tessarioli Neto, and K. Minami. 1998. Behavior of three vegetable fruits subjected to intermittent warming during cold storage. (In Portuguese with English summary). *Scientia Agricola* 55(3): 473-479. *c. a. Hort. Abstr.* 69(6): 4881; 1999.
- Knowles, L., M. R. Trimble, and N. R. Knowles. 2001. Phosphorus status affects postharvest respiration, membrane permeability and lipid chemistry of European seedless cucumber fruit (*Cucumis sativus* L.). *Postharvest Biol. Technol.* 21: 179-188.
- Kondo, N., T. Fujiura, M. Monta, Y. Shibano, K. Mohri, and H. Yamada. 1995. End-effectors for cherry-tomato harvesting robot. *Acta Horticulturae* No. 399: 239-245.
- Koseki, S. and K. Itoh. 2002. Effect of nitrogen gas packaging on the quality and microbial growth of fresh-cut vegetables under low temperatures. *J. Food Prot.* 65(2): 326-332.
- Koutsos, T. V., C. A. M. Portas, E. Paroussis, and G. Paraskevopoulou-Paroussi. 1994. Changes in pH, titratable acidity and total soluble solids of processing tomato varieties in relation to fruit storage until processing. *Acta Horticulturae* No. 376: 155-162.

- Kramer, G. F. and C. Y. Wang. 1989. Reduction of chilling injury in zucchini squash by temperature management. *HortScience* 24: 955-996.
- Kramer M., R. Sanders, H. Bolkan, C. Waters, R. E. Sheehy, and W. R. Hiatt. 1992. Postharvest evaluation of transgenic tomatoes with reduced levels of polygalacturonase: processing, firmness and disease resistance. *Postharvest Biology and Technonogy* 1(3): 241-255.
- Krumbein, A., P. Peters, and B. Bruckner. 2004. Flavour compounds and a quantitative descriptive analysis of tomatoes (*Lycopersicon esculentum* Mill.) of different cultivars in short-term storage. *Postharvest Biol Technol* 32: 15-28.
- Ku, V. V. V., R. B. H. Wills, and S. Ben-Yehoshua. 1999. 1-Methylcyclopropene can differentially affect the postharvest life of strawberries exposed to ethylene. *HortScience* 34(1): 119-120.
- Lacheene, Z. E. S. 1999. Reducing tomato fruit postharvest chilling sensitivity by dipping in hot calcium chloride solution. *Egypt. J. Appl. Sci.* 14(3): 254-275.
- Lalaguna, F. 1998. Response of 'Galia' muskmelon to irradiation as a quarantine treatment. *HortScience* 33(1): 118-120.
- Lamikanra, O., J. C. Chen, D. Banks, and P. A. Hunter. 2000. Biochemical and microbial changes during the storage of minimally processed cantaloupe. *J. Agr. Food Chem.* 48(12): 5955-5961.
- Lamont, W. J., Jr. 1999. Okra - a versatile vegetable crop. *HortTechnology* 9(2): 179-184.
- Lee, S. K. and A. A. Kader. 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. *Postharvest Biol Technol* 20: 207-220.
- Lee, S. G. and K. D. Ko. 2008. Ethephon application induces symptoms of fruit tissue degeneration in watermelon. *J. Plant Biol.* 51(5): 337-340.
- Lee, K. A. and Y. J. Yang. 1998. Effects of low temperature and CA on quality changes and physiological characteristics of chilling injury during storage of squash (*Cucurbita moschata*) (In Korean with English summary). *J. Korean Soc. Hort. Sci.* 39(4): 402-407. c. a. Hort. Abstr. 69(1): 425, 1999.
- Lee, K. A. and Y. L. Yang. 1999. Effect of prestorage temperature

- manipulations on reduction of chilling and quality retention during storage of squash (*Cucurbita moschata*) J Korean Soc Hort Sci. 40(4): 416-418.
- Lee, Y. and Y J Yang 1999. Effect of chemical treatments on reduction of chilling injury and physiological changes during cold storage of squash (*Cucurbita moschata*) (In Korean with English summary). J. Korean Soc Hort. Sci. 40(6): 669-672 c a Hort Abstr. 70(6): 5030; 2000.
- Lee, Y and Y J Yang. 1999. Physiological characteristic of chilling injury and CA effect on quality retention during cold storage of squash. Acta Hort No. 483: 339-347.
- Lee, G. H., J. M. Bunn, Y. J. Han, and G. D. Christenbury. 1997. Ripening characteristics of light irradiated tomatoes J Food Sci 62(1): 138-140.
- L'Heureux, G. P., M. Bergevin, J. E. Thompson, and C. Willenmot. 1993. Molecular species profile of membrane lipids of tomato pericarp during chilling. Acta Horticulturae No. 343: 286-287.
- Lee, E., S. A. Sargent, and D. J. Huber. 2007. Physiological changes in Roma-type tomato induced by mechanical stress at several ripening stages. HortScience 42: 1237-1242.
- Lerdthanakul, S. and J. M. Krochta. 1996. Edible coating effects on postharvest quality of green bell peppers. J. Food Sci. 61(1): 176-179.
- Lester, G. 1998. Diurnal Growth measurements of honeydew and muskmelon fruits, HortScience 33(1): 156.
- Lester, G. E. and M. A. Grusak. 1999. Postharvest application of calcium and magnesium of honeydew and netted muskmelons: effects on tissue ion concentrations, quality, and senescence J Amer. Soc. Hort. Sci. 124(5): 545-552.
- Lester, G. E. and M. A. Grusak. 2004. Field application of chelated calcium. Postharvest effects on cantaloupe and honeydew fruit quality. HortTechnology 14(1): 29-38.
- Lester, G. E. and D. M. Hodges. 2008. Antioxidants associated with fruit senescence and human health: Novel orange-fleshed non-netted honeydew melon genotype comparisons following different seasonal production and cold storage durations. Postharvest Biol Technol 48(3): 347-354.
- Lester, G. E. and R. A. Safner. 2008. Marketable quality and phytonutrient

- concentrations of a novel hybrid muskmelon intended for the fresh-cut industry and its parental lines: whole-fruit comparisons at harvest and following long-term storage at 1 or 5°C. *Postharvest Biol. Technol.* 48(2): 248-253.
- Lester, G. and K. Shellie 2004 Honey dew melon. In. ARS, USDA Agric Handbook No. 66 revised. The Internet.
- Lster, G E , R. A. Saffner, and D. M. Hodges. 2007 Market quality attributes of orange-fleshed, non-netted honey dew melon genotypes following different growing seasons and storage temperature durations *HortTechnology*. 17. 346-352.
- Le Strange, M., W. L. Schrader, and T. K. Hartz. 2000. Fresh-market tomato production in California. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources. Publication 8017 8 p
- Lichter, A , O. Dvir, E. Fallik, S. Cohen, R. Golan, Z. Shemer, and M. Sagi 2002. Cracking of cherry tomatoes in solution. *Postharvest Biol. Technol.* 26: 305-312.
- Lim, C S., S. M. Kang, J. L. Cho, K. C. Gross, and A. B. Woolf. 2007 Bell pepper (*Capsicum annuum* L.) fruit are susceptible to chilling injury at the breaker stage of ripeness. *HortSciences* 42: 1659-1664
- Lim, C S., S. M. Kang, and J. L. Cho. 2009. Antioxidizing enzyme activities in chilling-sensitive and chilling-tolerant pepper fruit as affected by stage of ripeness and storage temperature. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 134. 156-163.
- Lin, W. C. and D. L. Ehret. 1991 Nutrient concentration and fruit thinning affect shelf life of long English cucumber *HortScience* 26. 1299-1300.
- Lin, W. C. and P. A. Jolliffe. 1995. Canopy light affects shelf life of long English cucumber. *Acta Hort.* 398. 249-255.
- Lin, W. C. and P. A. Jolliffe. 1996. Light intensity and spectral quality affect fruit growth and shelf life of greenhouse-grown long English cucumber *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 121(6): 1168-1173.
- Lin, W. C. and M. E. Saltveit 1997 Quality of winter squash affected by storage air composition and temperature *Postharvest Horticulture Series* – Department of Pomology, University of California No. 18 78
- Lim, W. C., J. W. Hall, and M. E. Saltveit 1993a Fruit ripening affects

- chilling injury of greenhouse peppers Acta Horticulturae No. 343. 225-229.
- Lin, W. C., J. W. Hall, and M. E. Saltveit. 1993b. Ripening stage affects the chilling sensitivity of greenhouse-grown peppers. J Amer Soc Hort Sci. 118(6): 791-795.
- Lipton, W. J. and C. Y. Wang. 1987. Chilling exposures and ethylene treatment change the level of ACC in 'Honey Dew' melons. J Amer. Soc. Hort. Sci 112: 109-112.
- Lipton, W. J., S. J. Peterson, and C. Y. Wang. 1987. Solar radiation influences solar yellowing, chilling injury, and ACC accumulation in 'Honey Dew' melons. J Amer. Soc Hort. Sci 112: 503-505.
- Lorenz, O. A. and D. N. Maynard. 1980 (2nd ed.). Knott's handbook for vegetable growers, Wiley-Interscience, N. Y. 390 p.
- Lougheed, E. C. 1987. Interactions of oxygen, carbon dioxide, temperature, and ethylene that may induce injuries in vegetables. HortScience 22(5): 791-794.
- Lownds, N. K., M. Banaras, and P. W. Bosland. 1993. Relationship between postharvest water loss and physical properties of pepper fruit (*Capsicum annuum* L.). HortScience 28(12): 1182-1184.
- Lownds, N. K., M. Banaras, and P. W. Bosland. 1994. Postharvest water loss and storage quality of nine pepper (*Capsicum*) cultivars. HortScience 29(3): 191-193.
- Lu, C. G., H. L. Xu, and L. X. Zhou. 1995. Effect of PG activity, ACC and ethylene production in fruit ripening of tomato. (In Chinese with English summary). Acta Horticulturae Sinica 22(1): 57-60. (c. a Hort. Abstr 66. 539; 1966).
- Lu, C. G., H. L. Xu, R. C. Yang, and W. G. Yu. 1994. Storage-linked physiological characters of tomato carrying fruit ripening mutant genes and their implications in breeding (In Chinese with English summary). Jiangsu Journal of Agricultural Sciences 10(3): 5-10. (c. a. Plant Breed Abstr. 65. 7626; 1995).
- Luna-Guzmán, I. and D. M. Barrett. 2000. Comparison of calcium chloride and calcium lactate effectiveness in maintaining shelf stability and quality of fresh-cut cantaloupes. Postharvest Biol Technol 19: 61-72.

- Luna-Guzmán, I., M. Cantwell, and D. M. Barrett. 1999. Fresh-cut cantaloupe: effects of CaCl_2 dips and heat treatments on firmness and metabolic activity. *Postharvest Biology and Technology* 17: 201-213.
- Luo, Y. and L. J. Mitzel. 1996. Extension of postharvest life of bell peppers with low oxygen. *J. Sci. Food Agric* 70(1): 115-119.
- Lurie, S. and D. Klein. 1991. Acquisition of low-temperature tolerance in tomatoes by exposure to high temperature stress. *J. Amer. Soc. Hort. Sci* 116: 1007-1012.
- Lurie, S., and R. Ronen. 1993. The effects of synthetic growth regulators on chilling injury in pepper fruit during low temperature storage. *Acta Horticulturae* No. 329: 275-277.
- Lurie, S., J. D. Klein, C. Watkins, G. Ross, P. Boss, and I. F. Ferguson. 1993. Prestorage heat treatment of tomatoes prevents chilling injury and reversibly inhibits ripening. *Acta Horticulturae* No. 343: 283-285.
- Lurie, S. and A. Sabehat. 1997. Prestorage temperature manipulations to reduce chilling injury in tomatoes. *Postharvest Biology and Technology* 11(1): 57-62.
- Lurie, S., R. Ronen, and B. Aloni. 1995. Growth-regulator-induced alleviation of chilling injury in green and red bell pepper fruit during storage. *HortScience* 30(3): 558-559.
- Lurie, S., M. Laamim, Z. Lapsker, and E. Fallik. 1997. Heat treatments to decrease chilling injury in tomato fruit. Effects on lipids, pericarp lesions and fungal growth. *Physiologia Plantarum* 100(2): 297-302.
- Lurie, S., J. D. Klein, E. Fallik, and L. Varjas. 1998. Heat treatment to reduce fungal rots, insect pests and to extend storage. *Acta Hort.* No. 464: 309-313.
- Lutz, J. M. and R. E. Hardenburg. 1968. The commercial storage of fruits, vegetable and florist and nursery stocks. U. S. Dept. Agric., Agric. Handbook No. 66. 94 p.
- Madrid, R., F. Navarro, I. Collados, C. Egea, and A. L. Alarcon. 1999. Development of colour in red pepper fruits in soilless culture. *J. Hort. Sci. Biotechnol.* 74(2): 175-180.
- MAFF, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK. 1998. EC quality standards for horticultural produce: Fresh vegetables. London.

- Maharaj, R., J. Arul, and P. Nadeau. 1999. Effect of photochemical treatment in the preservation of fresh tomato (*Lycopersicon esculentum* cv. Capello) by delaying senescence. *Postharvest Biology and Technology* 15(1): 13-23.
- Mahovic, M., S. A. Sargent, and J. A. Bartz. 2007. Identifying and controlling postharvest tomato diseases in Florida. University of Florida, IFAS Extension. The Internet.
- Mahovic, M. J., R. Shukla, R. M. Goodrich-Schneider, M. V. Wood, J. K. Brecht, and K. R. Schneider. 2008. *Bacillus atrophaceus* spore survival on nitted muskmelon surfaces after moist heat treatment. *HortTechnology* 18.
- Makus, D. J. and J. R. Morris. 1998. Preharvest calcium applications have little effect on mineral distribution in ripe strawberry fruit. *HortScience* 33(1): 64-66.
- Manzano, J. E. and J. Zambrano. 1995. Effect of wax coatings on the behavior of pepper at different storage temperatures. (In Spanish with English summary). *Proceedings of the Interamerican Society for Tropical Horticulture* 39: 39-45. c. a. Hort. Abstr. 67(6): 4998; 1997.
- Marshall, D. E. 1995. Mechanical pepper harvesting. 1995. *Acta Horticulturae* No. 412: 285-292.
- Marshall, D. E. and R. C. Brook. 1999. Reducing bell pepper bruising during postharvest handling. *HortTechnology* 9(2): 254-258.
- Martinez, C., G. Ros, M. J. Periago, G. Lopez, J. Ortuno, and F. Rincon. 1995. Physico-chemical and sensory quality criteria of green beans (*Phaseolus vulgaris* L.). *Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie* 28(5): 515-520. c. a. Hort. Abstr. 67(10): 8563; 1997.
- Massey, L. M., Jr. and B. R. Chase. 1971. The effect of (2-chloroethyl) phosphonic acid on the yield and quality of processing tomatoes for juice. *HortScience* 6: 570-571.
- Mattsson, K. 1993. ACC-Levels during growth of parthenocarpic glasshouse cucumbers (*Cucumis sativus* L.). *Acta Hort.* No. 343: 1-5.
- Mayberry, K. S. and T. K. Hartz. 1992. Extension of muskmelon storage life through the use of hot water treatment and polyethylene wraps. *HortScience* 27: 324-326.
- McCollum, T. G. 1990. Gene B influence susceptibility to chilling injury in

- Cucurbita pepo*. J Amer Soc Hort Sci 115: 618-622
- McCollum, T G and R E McDonald. 1993 Tolerance of cucumber fruit to immersion in heated water and subsequent effects on chilling tolerance. Acta Hort. No. 343. 233-237.
- McCollum, T. G., H Doostdar, R T. Mayer, and R E. McDonald 1995 Immersion of cucumber fruit in heated water alters chilling-induced physiological changes Postharvest Biology and Technology 6(1/2) 55-64
- McCollum, T. G., P J Stoffella, C. A. Powell, D. J Cantliffe, and S. Hamif-Khan. 2004. Effects of silverleaf whitefly feeding on tomato fruit ripening Postharvest Biology and Technology 31: 183-190.
- McDonald, R E , T G McCollum, and E. A. Baldwin 1996 Prestorage heat treatments influence free sterols and flavor volatiles of tomatoes stored at chilling temperature. J. Amer Soc Hort Sci 121(3): 531-536
- McDonald, R E , T G McCollum, and E A. Baldwin 1998. Heat treatment of mature-green tomatoes: differential effects of ethylene and partial ripening J Amer. Soc Hort Sci. 123(3): 457-462.
- McGarvey, B. D., A. A. Reyes, and M. Chiba. 1994. Decline of oxamyl residues in tomatoes in cool, modified-atmosphere storage. HortScience 29(4) 297-298.
- Meir, S., I Rosenberger, Z. Aharon, S Grinberg, and E Fallik. 1995 Improvement of the postharvest keeping quality and color development of bell pepper (cv. 'Maor') by packaging with polyethylene bags at a reduced temperature. Postharvest Biology and Technology 5(4) 303-309
- Meir, S., S. Philosph-Hadas, S. Lurie, S Droby, M Akerman, G Zauberman, B. Shapiro, E Cohen, and Y. Fuchs 1996 Reduction of chilling injury in stored avocado, grapefruit, and bell pepper by methyl jasmonate Canad J Bot. 74(6): 870-874.
- Mekwatanakarn, W and D. G. Richardson 1997 Snap bean varietal storage life in modified atmosphere packages, pp. 59-65 In M E. Saltveit (ed) International Controlled Atmosphere Research Conference University of California, Davis, California.
- Mencarelli, F. 1987 Effect of high CO₂ atmosphere on stored zucchini squash J Amer Soc Hort Sci. 112(6) 985-988
- Mencarelli, F , F Fontana, and R. Massantini. 1991 Postharvest practices to reduce chilling injury (CI) on eggplants, pp. 49-55 In. Proceedings of the

- fifth international controlled atmosphere research conference, Wenatche, Wash., U.S.A., 14-16. June, 1989. Vol. 2. Washington State University, Pullman, Washington.
- Mencarelli, F., B. Ceccantoni, A. Bolmi, and G. Anelli. 1993. Influence of heat treatment on the physiological response of sweet pepper kept at chilling temperature. *Acta Horticulturae* No. 343: 238-243.
- Mercado, J. A., M. A. Quesada, V. Vulpuesta, M. Reid, and M. Cantwell. 1995. storage of bell peppers in controlled atmospheres at chilling and nonchilling temperatures. *Acta Horticulturae* No. 412: 134-142.
- Miccolis, V. and M. E. Saltveit. 1995. Influence of storage period and temperature on the postharvest characteristics of six melon (*Cucumis melo* L., Inodorus Group) cultivars. *Postharvest Biology and Technology* 5(3): 211-219.
- Miller, C. H. and G. R. Hughes. 1969. Harvest indices for pickling cucumbers in once-over harvested systems. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 94: 485-487.
- Minges, P. A., A. A. Muka, A. F. Sherf, and R. F. Sandsted. 1971. Vegetable production recommendations: Cornell Univ., Ithaca, N. Y. 36 p.
- Mir, N., M. Canoles, R. Beaudry, E. Baldwin, and C. P. Mehla. 2004. Inhibiting tomato ripening with 1-methylcyclopropene. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 129(1): 112-120.
- Miszcak, A., C. F. Forney, and R. K. Prange. 1995. Development of aroma volatiles and color during postharvest ripening of 'Kent' strawberries. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 120(4): 650-655.
- Mitcham, B. 1996. quality assurance of strawberries: a case study. *Preishables Handling Newsletter* Issue No. 85: 6-9. The Internet.
- Mitcham, E. J., C. H. Crisosto, and A. A. Kader. 2007. Strawberry: recommendations for maintaining postharvest quality. *Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis.*
- Mitchell, F. G., E. Mitcham, J. F. Thompson, and N. Welch. 1996. Handling strawberries for fresh market. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources. Pub. 2442. 14 p.
- Moa, L., Y. Karakurt, and D. J. Huber. 2004. Incidence of water-soaking and

- phospholipids catabolism in ripe watermelon (*Citrullus lanatus*) fruit induction by ethylene and prophylactic effects of 1-methylcyclopropene Postharvest Biol Technol 33: 1-9.
- Moelich, D. H., M. C. Dodd, and M. Huysamer 1996. Fruit maturity studies in 'Galia 5' and 'Doral' melons. I. temperature relations between chemical, physical and physiological maturity indices. J. South African Soc Hort Sci. 6(2): 59-63.
- Moelich, D. H., M. C. Dodd, and M. Huysamer 1996. Fruit studies in 'Galia 5' and 'Doral' melons. II. The effect of harvest maturity on the postharvest quality after simulated shipping J South African Soc. Hort Sci. 6(2): 64-68.
- Monreal, M., B. De Ancos, and M. P. Cano. 1998. Effects of critical low-oxygen atmospheres on oxydoreductases enzyme activities of cold stored green bean (*Phaseolus vulgaris* L., cv Perona), p. 81. In COST 915, Consumer Oriented Quality Improvement of Fruit and Vegetable Products. Polytechnic University of Madrid, Spain
- Moretti, C. L., E. A. Baldwin, S. A. Sargent, and D. J. Huber. 2002. Internal bruising alters aroma volatile profiles in tomato fruit tissues. HortScience 37(2): 378-382.
- Morris, J. R. 1999. Developing mechanized system for producing, harvesting, and handling brambles, strawberries, and grapes. HortTechnology 9(1): 22-31
- Morris, S. and J. Jobling. 2004. Pea. In: ARS. USDA Agric. Handbook 66 revised. The Internet.
- Motsenhocker, C. E. 1996. Detachment force and fruit characteristics of tabasco pepper at several stages of development HortScience 31(7): 1231-1233.
- Moyls, A. L., P. L. Sholberg, and A. P. Gaunce. 1996. Modified-atmosphere packaging of grapes and strawberries fumigated with acetic acid. HortScience 31(3): 414-416.
- Mukkun, L., and Z. Singh. 2009. Methyl jasmonate plays a role in fruit ripening of 'Pajaro' strawberry through stimulation of ethylene biosynthesis. Sci Hort 123(1): 5-10.
- Murray, A. J., G. E. Hobson, W. Schuch, and C. R. Bird. 1993. Reduced

- ethylene tomatoes has differential effects on fruit processes. *Postharvest Biology and Technology* 2(4): 301-313.
- Nagao, A., T. Indou, and H. Dohi. 1991. Effects of curing conditions and storage temperature on postharvest quality of squash fruit. (In Japanese with English summary). *J. Jap. Soc. Hort. Sci.* 60(1): 175-181. c a. Hort Abstr. 64(6): 4513; 1994.
- Narciso, J. A., E. A. Baldwin, A. Plotto, and C. M. Ference. 2007. Preharvest peroxyacetic acid sprays slow decay and extend shelf life of strawberries. *HortScience* 42: 617-621.
- Navazio, J. P. and J. E. Staub. 1994. Effects of soil moisture, cultivar, and postharvest handling on pillowy fruit disorder in cucumber. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 119(6): 1234-1242.
- Nelson, A. I. and M. P. Steinberg. 1970. Sweet cron, pp. 314-349. In: G. E. Inglett (ed.). *Corn: culture, processing, products*. The Avi Pub. Co., Inc., Westport, Connecticut.
- Nilsson, T. 2005. Effects of ethylene and 1-MCP on ripening and senescence of European seedless cucumbers. *Postharvest Biol. Technol.* 36: 113-125.
- Ng, T. J. and E. C. Tigchelaar. 1997. Action of the non-ripening (nor) mutant on fruit ripening of tomato. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 102(4): 504-509.
- Nichols, M. A. 2006. Towards 10 t/ha brix. *Acta Hort.* 724: 217-223.
- Nigro, F., A. Ippolito, V. Lattanzio, D. D. Venere, and M. Salerno. 2000. Effect of ultraviolet-C light on postharvest decay of strawberry. *J. Plant Path.* 82(1): 29-37.
- Nothmann, J. 1986. Eggplant, pp. 145-152. In: S. P. Monselise (ed.). *CRC handbook of fruit set and development*. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
- Ntahimpera, N., L. L. Wilson, M. A. Ellis, and L. V. Madden. 1999. Comparison of rain effects on splash dispersal of three *Colletotrichum* species infecting strawberry. *Phytophology* 89: 555-563.
- Nunes, M. C. N. and J. P. Emond. 1999. Chlorinated water treatment affects postharvest quality of green bell peppers. *J. Food Quality* 22(3): 353-361.
- Nunes, M. C. N., J. K. Brecht, A. M. M. B. Morais, and S. A. Sargent. 1996. Controlling temperature and water loss maintain vitamin C levels in strawberry during postharvest handling, pp. 322-326. In: M. P. Pnits, C.

- K. Chandler, and T. E. Crocker (eds.). Proceedings of the IV North American strawberry conference. University of Florida, Gainesville
- Nunes, M. C. N., J. K. Brecht, A. M. M. B. Morais, and S. A. Sargent 1998. Controlling temperature and water loss to maintain ascorbic acid levels in strawberries during postharvest handling. *Journal of Food Science* 63(6): 1033-1036.
- Nunes, M. C. N., A. M. M. B. Morais, J. K. Brecht, S. A. Sargent, and J. A. Bartz 2005. Prompt cooling reduces incidence and severity of decay caused by *Botrytis cinerea* and *Rhizopus stolonifer* in strawberry. *HortTechnology* 15(1): 153-156.
- Nunes, M. C. N., A. M. M. B. Morais, J. K. Brecht, and S. A. Sargent 2002. Fruit maturity and storage temperature influence response of strawberries to controlled atmospheres. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 127(5): 836-842.
- Obando-Ulloa, J. M. et al. 2008. Aroma volatiles associated with the senescence of climacteric or non-climacteric melon fruit. *Postharvest Biol. Technol.* 52(2): 146-155.
- Obando-Ulloa, J. M. et al. 2008. Climacteric or non-climacteric behavior in melon fruit. 1. Aroma volatiles. *Postharvest Biol. Technol.* 49(1): 27-37.
- Oeller, P. W., M. W. Lu, L. P. Taylor, D. A. Pike, and A. Thoenig. 1991. Reversible inhibition of tomato fruit senescence by antisense R.N.A. *Science* (Washington) 254: 437-439.
- Ohta, K., N. Ito, T. Hosoki, and K. Endo. 1992. Studies on whole truss-harvesting method of cherry tomato by ethrel and abscisic acid treatments. (In Japanese with English summary). *J. Japanese Soc. Hort. Sci.* 61(1): 49-53. (c. a. Hort. Abstr. 64(10): 7989, 1994).
- Omar, S. A. and A. L. E. Mahmoud. 1994. Post-harvest of tomato in relation to lyases and mycotoxin production *in vitro* and *in vivo*. *Cryptogamic, Mycologie* 15(4): 273-281. (c. a. Rev. Plant Path. 74: 5024, 1995).
- Ontai, S. L., R. E. Paull, and M. E. Saltveit, Jr. 1992. Controlled-atmosphere storage of sugar peas. *HortScience* 27(1): 39-41.
- Palau, E. and A. Torregrosa. 1997. Mechanical harvesting of paprika peppers in Spain. *J. Agric. Eng. Res.* 66(3): 195-201.
- Palevitch, D. 1970. Defoliation of snap beans with pre-harvest treatment of 2-chloroethylphosphonic acid. *HortScience* 5: 224-226.

- Panasca, J. A. T., T. Miyazaki, H. Hisaka, H. Nakagawa, and T. Sato. 2000. Effect of modified atmosphere (MAP) and controlled atmosphere (CA) storage on the quality of snow pea pods (*Pisum sativum* L. var *saccharatum*). *Postharvest Biol. Technol.* 21: 213-223.
- Park, W. P. and S. H. Cho. 1997. Effect of modified atmosphere packaging conditions on storage quality of zucchini. *Postharvest Horticulture Series - Department of Pomology, University of California* No. 18: 84-88.
- Park, K. W. and H. M. Kang. 1998. Effects of the sources and thickness of plastic films on the shelf life and quality of cucumber during modified atmosphere storage. (In Korean with English summary). *J. Korean Soc. Hort. Sci.* 39(4): 397-401. *c. a. Hort. Abstr.* 69(1): 419-1999.
- Park, H. J., M. S. Chinnan, and R. L. Shewfelt. 1994. Edible coating effects on storage life and quality of tomatoes. *Journal of Food Science* 59(3): 568-570.
- Paz, O., H. W. Janes. B. A. Prevost, and C. Frenkel. 2006. Enhancement of fruit sensory quality by post-harvest applications of acetaldehyde and ethanol. *J. Food Sci.* 47(1): 270-273.
- Pelayo-Zaldivar, C., J. Ben Abda, S. E. Ebeler, and A. A. Kader. 2007. Quality and chemical changes associated with flavor of 'Camarosa' strawberries in response to a CO₂-enriched atmosphere. *HortScience* 42(2): 299-303.
- Pérez, A. G., C. Sanz, R. Olías, J. J. Ríos, and J. M. Olías. 1997. Effect of modified atmosphere packaging on strawberry quality during shelf-life. *Postharvest Horticulture Series - Department of Pomology, University of California, Davis* No. 17: 153-159.
- Perkins, D. L., J. C. Miller, and S. L. Dallyn. 1952. Influence of pod maturity on the vegetable and reproductive growth of okra. *Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.* 60: 311-314.
- Perkins-Veazie, P. 1995. Growth and ripening of strawberry fruit. *Hort. Rev.* 17: 267-297.
- Perkins-Veazie, P. 1996. Strawberry physiology and maintenance of quality pp. 19-26. In: M. P. Pritts, C. K. Chandler, and T. E. Crocker (eds.). *Proceedings of the IV North American strawberry conference*. University of Florida, Gainesville.

- Perkins-Weazie, P. 2004 Okra In ARS, USDA Agric Handbook 66 revised The Internet
- Perkins-Weazie, P. and J. K. Collins. 1995 Strawberry fruit quality and its maintenance in postharvest environments Adv Strawberry Res 14: 1-8
- Perkins-Weazie, P. and J. K. Collins 2004. Fresh quality and lycopene stability of fresh-cut watermelon Postharvest Biol Technol 31 159-166.
- Perry, K. B., D. C. Sanders, D. M. Granberry, J. T. Garrett, D. R. Decoteau, R. T. Nagata, R. J. Dufault, K. D. Bctal, and W. J. McLaurin. 1993 Heat units, solar radiation and daylength as pepper harvest predictors Agricultural and Forest Meteorology 65(3-4) 197-205
- Picha, D. H. 1986. Postharvest fruit conditioning reduces chilling injury in watermelons HortScience 21 1407-1409.
- Picha, D. H. 1987 Physiological factors associated with yellow shoulder expression in tomato fruit J Amer. Soc. Hort Sci. 112 798-801
- Picha, D. 1997. Strategic option for the development of the Egyptian strawberry export industry Agricultural Technology Utilization and Transfer Project, Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Egypt
- Polderdijk, J. J., H. A. M. Boerrigter, E. C. Wilkinson, J. G. Meijer, and M. F. M. Janssens. 1993. The effects of controlled atmosphere storage at varying levels of relative humidity on weight loss, softening and decay of red bell peppers. Scientia Horticulturae 55(3-4): 315-321.
- Poovaiah, B. W. and A. Nukaya. 1979. Polygalacturonase and cellulase enzymes in the normal Rutgers and mutant rin tomato fruits and their relationships to the respiratory climacteric Plant Physiol 64: 534-537
- Portela, S. I. and M. I. Cantwell. 2001. Cutting blade sharpness affects appearance and other quality attributes of fresh-cut cantaloupe melon. J Food Sci. 66(9): 1265-1270.
- Prabha, T. N., Bbagyalakshmi, Neelwarne, and R. N. Tharanathan. 1998 Carbohydrate changes in ripening *Capsicum annum* in relation to textural degradation. Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung 206(2): 121-125. c a Hort Abstr 68(6): 5046; 1998.
- Produce Marketing Association and United Fresh Fruit and Vegetable Association. 2005 Commodity specific food safety guidelines for the melon supply chain. Pima, Newark, DE and United, Wash, DC The Internet

- Protrade. 1995 Melons export manual GTZ, Eschborn, Germany 36 p
- Purvis, A. C. 1994. Interaction of waxes and temperature in retarding moisture loss from and chilling injury of cucumber fruit during storage Proceedings of the Florida State Horticultural Society 107: 257-260.
- Purvis, A. C. 2002 Diphenylamine reduces chilling injury of green bell pepper fruit Postharvest Biology and Technology 25: 41-48.
- Radulovic, M., D Ban, S. Sladonja, and V. Lusetic-Bursic. 2007. Changes of quality parameters in watermelon during storage. Acta Hort. 731: 451-456.
- Raffo, A., I. Baiamonte, N. Nardo, and F. Paoletti. 2007. Internal quality and antioxidants content of cold-stored red sweet peppers as affected by polyethylene bag packaging and hot water treatment Europ. Food Res Technol. 225(3-4). 395-405.
- Rahman, A. A., D. J. Huber, and J. K. Brecht. 1993 Respiratory activity and mitochondrial oxidative capacity of bell pepper fruit following storage under low-oxygen atmosphere. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 118(4): 470-475.
- Ramos-Clamont, M. G et al. 1997. Reduction of chilling injury susceptibility by polyamines application in zucchini squash (*Cucurbita pepo* L.). Proc. Interamerican Soc. Trop. Hort. 41: 18-23.
- Read, P. E. 1982. Plant growth regulator use in field-scale vegetable crops, pp. 285-296. In: J. S. McLaren (ed.). Chemical manipulation of crop growth and development. Butterworth Scientific, London.
- Reddy, M. V. B., P. Angers, F. Castaigne, and J. Arul. 2000. Chitosan effects on blackmold rot and pathogenic factors produced by *Alternaria alternata* in postharvest tomatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 125(6): 742-747.
- Reddy, M. V. B., K. Belkacemi, R. Corcuff, F. Castaigne, and J. Arul. 2000. Effect of pre-harvest chitosan sprays on post-harvest infection by *Botrytis cinerea* and quality of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology 20: 39-51.
- Redit, W. H and A. A. Hamer. 1961. Protection of rail shipments of fruits and vegetables. U. S. Dept. Agr., Agr. Handbook No. 195. 108 p.
- Risse, L. A. and R. E McDonald. 1990 Quality of supersweet corn film-wrapped in trays. HortScience 25(3): 322-324.

- Risse, L. A., D. Chun, R. E. McDonald, and W. R. Miller 1987 Volatile production and decay during storage of cucumbers waxed, imazalil-treated and film-wrapped. HortScience 22: 274-276.
- Risse, L. A., J. K. Brecht, S. A. Sargent, S. J. Locascio, J. M. Crall, G. W. Elmstrom, and D. N. Maynard. 1990. Storage Characteristics of small watermelon cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115: 440-443.
- Ritenour, M. and J. A. Narciso. 2006 Postharvest calcium chloride dips of whole tomato fruit reduce postharvest decay under commercial conditions HortScience 41(4): 1016-1017.
- Robinson, R. W. and D. S. Decker-Walters. 1997 Cucurbits. CAB International, Wallingford, U. K.
- Rodov, V., S. Ben-Yehoshua, T. Fierman, and D. Fang 1995 Modified-humidity packaging reduces decay of harvested red bell pepper fruit. HortScience 30(20): 299-302.
- Rodov, V., A. Copel, Y. Aharoni, N. Aharoni, M. Nir, A. Shapira, and G. Gur. 1998 Modified atmosphere packaging of cucurbit vegetables p. 19 In. COST 915, Consumer oriented quality improvement of fruit and vegetable products. Polytechnic University of Madrid, Spain.
- Rodov, V., B. Horev, Y. Vinokur, A. Copel, Y. Aharoni, and N. Aharoni. 2002 Modified-atmosphere packaging improves keeping quality of charantais-type melons HortScience 37(6): 950-953.
- Rodov, V., A. Copel, N. Aharoni, Y. Aharoni, A. Wiseblum, B. Horev, and Y. Vinokur. 2000 Nested modified atmosphere packages maintain quality of trimmed sweet corn during cold storage and the shelf life period Postharvest Biology and Technology 18: 259-266.
- Rodriguez, S. del C., B. Lopez, and A. R. Chaves. 1999 Changes in polyamines and ethylene during the development and ripening of eggplant fruits (*Solanum melongena*). J. Agric. Food Chem. 47(4): 1431-1434.
- Román-Hernandez, O. and J. S. Beaver. 1996. Optimum stage of development for harvesting green-shelled beans. Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 80(3): 89-94.
- Rosen, J. C. and A. A. Kader. 1989 Postharvest physiology and quality maintenance of sliced pear and strawberry fruits. J. Food Sci. 54(3): 656-659.

- Ruan, R. R., P. L. Chen, and S. Almaer. 1999. Nondestructive analysis of sweet corn maturity using NMR. *HortScience* 34(2): 319-321.
- Rubatzky, V. E. and M. Yamaguchi. 1999. *World vegetables: principles, production, and nutritive values* (2nd ed.). Aspen Pub., Inc., Gaithersburg, Maryland, USA. 843 p.
- Rushing, J. W. 2004. Watermelon. In: ARS, USDA Handbook 66 revised. The Internet.
- Russo, V. M. 1996. Delaying harvest improves bell pepper yield. *HortScience* 31(3): 345-346.
- Rylski, I. 1986. Pepper (*Capsicum*), pp. 341-354. In: S. P. Monselise (ed.) *CRC handbook of fruit set and development*. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
- Sabebat, A., D. Weiss, and S. Lurie. 1995. Persistence of heat shock proteins in heated tomato fruit and the resistance to chilling injury of the fruit. *Acta Hort* No. 398: 11-21.
- Sabebat, A., D. Weiss, and S. Lurie. 1996. The correlation between heat-shock protein accumulation and persistence and chilling tolerance in tomato fruit. *Plant Physiology* 110(2): 531-537.
- Sacks, Y., A. Capel, and R. Barkai-Golan. 1996. Improvement of harvested strawberry quality by illumination: colour and *Botrytis infection*. *Postharvest Biol. Tech.* 8(1): 19-27.
- Saftner, R. A. and G. E. Lester. 2009. Sensory and analytical characteristics of a novel hybrid muskmelon fruit intended for the fresh-cut industry. *Postharvest Biol. Technol.* 51(3): 327-333.
- Saladie, M., A. J. Matas, T. Isaacson et al. 2007. A reevaluation of the key factors that influence tomato fruit softening and integrity. *Plant Physiology* 144: 1012-1028.
- Saltveit, M. E. 1997. A summary of CA and MA requirements and recommendations for harvested vegetables. *CA '97 Proceedings*, Vol 4, pp. 98-117. *Postharvest Horticulture Series No. 18*, University California, Davis.
- Saltveit, M. E. 2004. Cucumber. In: ARS, USDA Agric. Handbook 66 revised. The Internet.

- Saltveit M E Jr and A. R. Sharaf 1992 Ethanol inhibits ripening of tomato fruit harvested at various degrees of ripening without affecting subsequent quality J Amer Soc Hort Sci. 117(5) 793-798
- Salunkhe, D K and B B. Desai. 1984 Postharvest biotechnology of vegetables Vol. 1 CRC Press, Inc , Boca Raton, Florida. 208 p
- Salunkhe, D K and B B. Desai 1984. Postharvest biotechnology of vegetables Vol II CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida. 194 p
- Salunkhe, D K and S S. Kadam (eds.) 1998 Handbook of vegetable science and technology Marcel Dekker, Inc., N Y 721 p
- Sandsted, R. F. 1966. Commercial snap bean production in New York State Cornell Ext. Bul. 1163 30 p.
- Sargent, S 2006 Handling Florida vegetables. pepper IFAS Extension, University of Florida. The Internet.
- Sargent, S A. and C L. Moretti 2004 Tomato. In. ARS, USDA, Agric Handbook 66 revised. The Internet.
- Srgent, S. A., J K. Brecht, M D. Ferreira, and J A. Bartz 1996 New technologies for postharvest handling, pp. 27-28 In. M P. Prits, C. K. Chandler and T. E. Crocker (eds.) Proceedings of the IV North American strawberry conference. University of Florida, Gainesville
- Savvas, D, I Karapanos, A. Tagaris, and H. C. Passam 2009 Effects of NaCl and silicon on the quality and storage ability of zucchini squash fruit J. Hort Sci. Biotechnol. 84(4) 381-386.
- Scalon, S. de P. Q. 1999 Effects of CaCl_2 application in strawberry. (In Portuguese with English summary) Revista Brasileira Fruticultura 21(2) 156-159. c a Hort Abstr 70: 1937; 2000.
- Saniewski, M. and K. Czapski. 1990. The Effect of aminooxyacetic acid on ethylene production induced by methyl jasmonate in tomatoes Biologia Plantarum 32(3): 218-222
- Schuch, W, J Kanczler, D. Robertson, G. Hobson, G. Tucker, D. Grierson, S. Bright, and C. Bird. 1991 Fruit quality characteristics of transgenic tomato fruit with altered polygalacturonase activity HortScience 26 1517-1520
- Senesi, F, C. Prinzivalli, M. Sala, and M. Gennari 2000. Physicochemical

- and microbiological changes in fresh-cut green bell peppers as affected by packaging and storage Italian J Food Sci. 12(1): 55-64.
- Serrano, M., M. C. Martinez-Madrid, F. Romojaro, and F. Riquelme. 1995. Polyamine accumulation in cold stored peppers. Acta Horticulturae No. 412: 127-133.
- Serrano, M., M. C. Martinez-Madrid, M. T. Pretel, F. Riquelme, and F. Romojaro. 1997 Modified atmosphere packaging minimizes increases in putrescine and abscisic acid levels caused by chilling injury in pepper fruit J Agric. Food Chem. 45(5) 1668-1672.
- Sethu, K. M. P., T. N. Prabha, and R. N. Tharanathan. 1996. Post-harvest biochemical changes associated with softening phenomenon in *Capsicum annum* fruits. Phytochemistry 42(4): 961-966.
- Sharom, M., C. Willemot, and J. E. Thompson. 1994. Chilling injury induces lipid phase changes in membranes of tomato fruit Plant Physiology 105(1): 305-308.
- Shellie, K. C. 1999. Muskmelon (*Cucumis melo* L.) fruit ripening and postharvest quality after a preharvest spray of aminoethoxyvinylglycine. Postharvest Biol. Technol. 17(1). 55-62.
- Shellie, K. C. and G. Lester. 2004. Netted melons. In: ARS, USDA Agric. Handbook No. 66 revised. The Internet.
- Shewfelt, R. L. and S. E. Prussia (eds.). 1993. Postharvest handling: a systems approach. Academic Press, San Diego, California. 358 p.
- Shewfelt, R. L., S. E. Prussia, J. L. Jordan, W. C. Hurst, and A. V. A. Resurreccion. 1986. A systems analysis of postharvest handling of fresh snap beans. HortScience 21(3): 470-472.
- Shin, Y., J. A. Ryu, R. H. Liu, J. F. Nock, and C. B. Watkins. 2008. Harvest maturity, storage temperature and relative humidity affect fruit quality, antioxidant contents and activity, and inhibition of cell proliferation of strawberry fruit. Postharvest Biol. Technol. 49(2):201-209.
- Sholberg, P. L. and A. P. Gaunce. 1995. Fumigation of fruit with acetic acid to prevent postharvest decay. HortScience 30(6): 1271-1275.
- Sholberg, P., P. Haag, R. Hocking, and K. Bedford. 2000. The use of vinegar vapor to reduce postharvest decay of harvested fruit HortScience 35(5). 898-903

- Shoemaker, J. S. 1953. Vegetable growing. (2nd Ed.). Wiley, N. Y. 515 p.
- Showalter, R. K. 1993. Postharvest water intake and decay of tomatoes. HortTechnology 3(1): 97-98.
- Siller-Cepeda, J. H. 2004. Eggplant. In: ARS, USDA Agric. Handbook 66 revised. The Internet.
- Sims, W. L. and R. F. Kasmire. 1972. Ethephon response favorable on fresh market tomatoes. Calif. Agric. 26(5): 3-4.
- Sims, W. L. and B. Zahara. 1978. Growing pickling cucumbers for mechanical harvesting. Univ. Calif., Div. Agr. Sci. Leaflet No. 2677. 16 p.
- Sims, W. L., H. Johnson, R. F. Kasmire, V. E. Rubatzky, K. B. Tyler, and R. E. Voss. 1978. Home vegetable gardening. Div. Agric. Sci., Univ. Calif., Leaflet No. 2989. 42 p.
- Sims, W. L., R. K. Kasmire, and O. A. Lorenz. 1978. Quality sweet corn production in California. Univ. Calif., Div. Agric. Sci., Leaflet No. 2818. 20 p.
- Sims, W. L. and R. W. Scheuerman. 1979. Mechanized growing and harvesting of fresh market tomatoes. Div. Agric. Sci., Univ. Calif., Leaflet No. 2815. 21 p.
- Singh, M., K. Dhawan, and S. P. Malhorta. 2000. Carbohydrate metabolism in tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) fruits during ripening. J. Food Sci. Technol. (Mysore). 37(3): 222-226.
- Siriphanich, J. 1998. High CO₂ atmosphere enhances fruit firmness during storage. J. Jap. Soc. Hort. Sci. 67(6): 1167-1170.
- Sisler, E. C. and N. Lallu. 1994. Effect of diazocyclopentadiene (DACP) on tomato fruit harvested at different ripening stages. Post Harvest Biology and Technology 4(3): 245-254.
- Smith, R. B. 1986. Bulkstorage of mechanically harvested strawberries for processing. HortScience 21: 478-480.
- Smith, R. B. and E. J. Skog. 1992. Postharvest carbon dioxide treatment enhances firmness of several cultivars of strawberry. HortScience 27(5): 420-421.
- Smith, S. M., J. W. Scott, J. A. Bartz, and S. A. Sargent. 2007. Effect of time after harvest on stem scar water absorption in tomato. HortScience 42: 1227-1230.

- Smith, D. L., K. C. Gross, and B. D. Whitaker. 2008. Analysis of softening in air- and ethylene-treated rin, nor and wild-type tomato fruit. *Postharvest Biol. Technol.* 49(2): 314-317.
- Smith, S. M., J. W. Scott, J. A. Bartz, and S. A. Sargent. 2008. Diallel analysis of fruit water absorption in tomato, a contributing factor in postharvest decays. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 133: 55-60.
- Soto-Zamora, G., E. M. Yahia, J. K. Brecht, and A. Gardea. 2005. Effect of postharvest hot air treatments on the quality of antioxidant levels in tomato fruit. *Food Sci. Technol.* 38(6): 657-663.
- Splittstoesser, W. E. and J. S. Vandemark. 1971. Maturaton, fruit size, and yield of tomatoes treated before harvest with (2-chloroethyl) phosphonic acid. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 96: 564-567.
- Stern, D. J., R. G. Buttery, R. Teranishi, L. Ling, K. Scott, and M. Cantwell. 1994. Effect of storage and ripening on fresh tomato quality. Part. 1. *Food Chemistry* 49(3): 225-231. (c. a. Hort. Abstr. 65: 2209, 1995).
- Stevens, C. et al. 1997. Integration of ultraviolet (UV-C) light with yeast treatment for control of postharvest storage rots of fruits and vegetables. *Biol. Cont.* 10(2): 98-103.
- Studer, H. E., P. Chen, and A. A. Kader. 1981. Damage evaluation of machine harvested fresh market tomatoes. *Transactions of the ASAE* 24(2): 284-287.
- Subrata, I. D. M., T. Fujiura, H. Yamad, M. Hida, T. Yukawa, and S. Nakoa. 1996. Cherry tomato harvesting robot using 3-D vision sensor (Part 1). Recognition of cherry tomato. (Japanese; English summary). *J. Jap. Soc. Agr. Mach.* 58(4): 45-52. c. a. Hort. Abstr. 67: 1377; 1997.
- Suslow, T. V. 2007. Prevention of postharvest water infiltration into fresh market tomatoes: food safety and spoilage control practices. *Veg. Res. Inf. Center, UC Davis, California. The Internet.*
- Suslow, T. 2000. Problem solver: bell peppers hit with late season losses to decay. *Perishables Handling Quarterly. Issue No. 101: 1.*
- Suslow, T. V. 2007. Watermelon: recommendations for maintaining postharvest quality. *Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis. The Internet*
- Suslow, T. V. and M. Cantwell. 2007. Cucumber: recommendations for

- maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center, UC, Davis. The Internet
- Suslow, T. V. and M. Cantwell. 2007. Pea, snow and snap pod. Postharvest Technology Research & Information Center, UC Davis. The Internet
- Suslow, T. V. and M. Cantwell. 2007. Squash (soft rind). recommendation for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center. UC, Davis. The Internet.
- Suslow, T. V. and M. Cantwell. 2007. Sweet corn. recommendation for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center. University of California, Davis. The Internet
- Suslow, T. V. and M. Cantwell. 2006. Tomato: recommendations for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center, UC Davis. The Internet.
- Suslow, T. V., M. Cantwell, and J. Mitchell. 2007. Cantaloupe: recommendations for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis. The Internet.
- Suslow, T. V., M. Cantwell, and J. Mitchell. 2007. Honeydew melon: recommendations for maintaining postharvest quality. Postharvest Technology Research & Information Center, University of California, Davis. The Internet.
- Tabuchi, T., S. Ito, and N. Arai. 2000. Structural changes in the abscission zones of pedicels at different ripening stages of tomato. J. Jap. Soc. Hort. Sci. 69(6): 705-707
- Talbot, M. T., S. A. Sargent, and I. K. Brecht. 2006. Cooling Florida Sweet corn. IFAS Extension, University of Florida. The Internet.
- Tatsumi, Y., I. Kimura, and K. Sumata. 1995. Relation between chilling sensitivity and polyamine content in several maturity stages of zucchini squash. Acta Hort. 398: 215-221.
- Teitel, D. C., Y. Aharoni, and R. Barkai-Golan. 1989. The use of heat treatments to extend the shelf life of 'Galia' melons. J. Hort. Sci. 64(3): 367-372.
- Temkan-Gorodeiski, N., B. Shapiro, S. Grinberg, I. Rosenberger, and E. Fallik. 1993. Postharvest treatments to control eggplant deterioration during storage. J. Hort. Sci. 68(5): 689-693

- Terai, H. 1990 Regulation of ethylene production in normal 'Rutgers' and mutant nor and rin tomato fruits. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 59(1): 121-128. (c. a. Plant Breed Abstr 61: 3814; 1991).
- Terry, L. A. and D. C. Joyce. 2000. Suppression of grey mould on strawberry fruit with the chemical plant activator acibenzolar. Pest Management Science 56(11): 989-992.
- Thompson, A. K. 1998 Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables CAB International, Wallingford, UK 278 p.
- Thompson, A. K. 2003. Fruit and vegetable harvesting, handling and storage Blackwell Publishing, Oxford, UK. 460 p.
- Thompson, H. C. and W. C. Kelly. 1957. Vegetable crops. McGraw-Hill Book Co., Inc., N. Y 611 p.
- Toivonen, P. M. A. and P. A. Bowen. 1999. The Effect of perharvest foliar sprays of calcium on quality and shelf life of two cultivars of sweet bell peppers (*Capsicum annuum* L.). grown in plasticulture. Canadian J Plant Sci. 79(3): 411-416.
- Toivonen, P. M. A. and S. Stan. 2003. The effect of washing on physicochemical changes in packaged, sliced green peppers. Int. J. Food Sci. Technol. 39(1): 43-51.
- Torija-Isasa, M. E., C. Diez-Marques, M. Camara-Hurtado, and M. C. Sanchez-Mata. 1998. Effect of controlled atmosphere storage on nutritive value of green beans (*Phaseolus vulgaris* L.). p. 78, In: COST 915, Consumer Oriented Quality Improvement of Fruit and Vegetable Products. Polytechnic University of Madrid, Spain.
- Trial, M. A., I. A. Wahem, and J. N. Bizri. 1992. Snap bean quality changed minimally when stored in low density polyolefin film package. Journal of Food Science 57(4): 977-979.
- Tucker, G. A., G. B. Seymour, Y. Bundick, D. Robertson, L. Hall, C. J. S. Smith, D. Grierson, C. R. Bird, and W. Schuch. 1992 Use of antisense RNA technology to study pectin degradation in tomato fruit. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 20: 119-124. (c. a. Hort Abstr 63. 422, 1993).
- Turk, R. and E. Celik. 1994 The effect of vacuum cooling on the quality criteria of some vegetables. Acta Horticulture No. 368 825-829

- Tzortzakakis, N., I Singleton, and J Barnes. 2008. Impact of low-level atmospheric ozone-enrichment on black spot and anthracnose rot of tomato fruit. *Postharvest Biology and Technology* 47(1): 1-9.
- Utto, W., A. J Mawson, and J E Bronlund. 2008. Hexanal reduces infection of tomatoes by *Botrytis cinerea* whilst maintaining quality. *Postharvest Biol Technol.* 47(3): 434-437.
- Vicente, A. R., G A Martinez, P. M. Civello, and A. R. Chaves. 2002. Quality of heat-treated strawberry fruit during refrigerated storage. *Postharvest Biol Technol* 25: 59-71.
- Vicente, A. R., M. Saladié, J. K. C Rose, and J M Labavitch. 2007. The linkage between cell wall metabolism and fruit softening: looking to the future. *J Sci. Food Agric* 87: 1435-1448.
- Vigncault, C., J. A. Bartz, and S. A Sargent. 2000. Postharvest decay risk associated with hydrocooling tomatoes. *Plant Dis.* 84(12): 1314-1318.
- Villavicencio, L., S. Blankenship, D C Sanders, and W H Swallow. 1999. Ethylene and carbon dioxide production in detached fruit of selected pepper cultivars. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 124(4): 402-406.
- Wade, N L. and S C. Morris. 1983. Efficacy of fungicides for postharvest treatment of muskmelon fruits. *HortScience* 18: 344-345.
- Wall, M M and R. D Berghage. 2007. Prolonging the shelf-life of fresh green chile peppers through modified atmosphere packaging and low temperature storage. *J. Food Quality* 19(6): 467-476.
- Wall, M. M., S. Walker, A. D Wall, E. Hughs, and R. Phillips. 2003. Yield and quality of machine harvested red chile peppers. *HortTechnology* 13(2): 296-302.
- Wang, C. Y. 1991. Effect of abscisic acid on chilling injury of zucchini squash. *Journal of Plant Growth Regulation* 10: 101-105.
- Wang, C Y. 1994. Combined treatment of heat shock and low temperature conditioning reduces chilling injury in zucchini squash. *Postharvest Biology and Technology* 4(1-2): 65-73.
- Wang, C Y. 1994. Reduction of chilling injury by methyl jasmonate. *Acta Hort.* 368: 901-907.
- Wang, C. Y. 1994. Chilling injury of tropical horticultural commodities. *HortScience* 29(9): 986-988.

- Wang, C. Y. 1995. Effect of temperature preconditioning on catalase, paroxidase, and superoxidase dismutase in chilled zucchini squash. *Postharvest Biology and Technology* 5(1/2): 67-76
- Wang, C. Y. 1996. Temperature preconditioning affects ascorbate antioxidant system in chilling zucchini squash. *Postharvest Biology and Technology* 8(1): 29-36.
- Wang, C. Y. and J. G. Buta. 1994. Methyl jasmonate reduces chilling injury in *Cucurbita pepo* through its regulation of abscisic acid and polyamine levels. *Environmental and Experimental Botany* 34(4): 427-432.
- Wang, C. Y. and L. Qi. 1997. Modified atmosphere packaging alleviates chilling injury in cucumbers. *Postharvest Biology and Technology* 10(3): 195-200.
- Wang, C. Y., G. F. Kramer, B. D. Whitaker, and W. R. Lusby. 1992. Temperature preconditioning increases tolerance to chilling injury and alters lipid composition in zucchini squash. *Journal of Plant Physiology* 140(2): 229-235.
- Wang, Y., Y. Bao, D. Shen, W. Feng, T. Yu, J. Zhang, and X. D. Zheng. 2008. Biocontrol of *Alternaria alternata* on cherry tomato fruit by use of marine yeast *Rhodospiridium paludigenum* Fell & Tallman. *International J. Food Microbiol.* 123(3): 234-239.
- Wang, Y., W. Baogang, and L. Li. 2008. Keeping quality of tomato fruit by high electrostatic field pretreatment during storage. *J. Sci. food Technol.* 88(3): 464-470.
- Wang, F., G. Feng, and K. Chen. 2009. Defense response of harvested tomato fruit to burdock fructooligosaccharide, a novel potential elicitor. *Postharvest Biol. Technol.* 52(1): 110-116.
- Ware, G. W. and J. P. McCollum. 1980 (3rd ed.). *Producing vegetable crops*. The Interstate Printers & Publishers, Inc., Danville, Illinois. 607 p.
- Wasna, N. P., K. Kawada, and T. Matsui. 1999. Preharvest foliar applied calcium and postharvest CO₂ increment improve storability of 'Nyoho' strawberries. (In Japanese with English summary). *Journal of Society of High Technology in Agriculture* 11(3): 165-172. c. a. Hort. Abstr. 70(2): 1054; 2000.
- Watada, A. E. and L. L. Morris. 1967. Growth and respiration patterns of snap bean fruits. *Plant Physiology* 42(6): 757-761

- Watada, A. E. and L. L. Morris. 1996a. Effect of chilling and non-chilling temperatures on snap bean fruits. *Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.* 89: 368-374.
- Watada, A. E. and L. L. Morris. 1966b. Post-harvest behavior of snap bean cultivars. *Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.* 89: 375-380.
- Watkins, C. B., J. E. Manzano-Mendez, J. F. Nock, J. Z. Zhang, and K. E. Maloney. 1999. Cultivar variation in response of strawberry fruit to high carbon dioxide treatments. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 79(6): 886-890.
- Weaver, R. J. 1972. *Plant growth substances in agriculture*. S. Chand & Co. Ltd, New Delhi. 594 p.
- Welch, N. C., R. Bringham, A. S. Greathead, V. Voth, W. S. Seyman, N. F. McCalley and H. W. Otto. 1982. Strawberry production in California. Univ. Calif., Div. Agr. Sci., Leaflet 2959. 14 p.
- Whitaker, B. D. 1994. A reassessment of heat treatment as a means of reducing chilling injury in tomato fruit. *Postharvest Biology and Technology* 4(1-2): 75-83.
- Whitaker, B. D. 1994. Lipid changes in mature-green tomatoes during ripening, during chilling and after rewarming subsequent to chilling. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 119(5): 994-999.
- Whitaker, B. D. 1995. Lipid changes in mature-green bell pepper fruit during chilling at 2°C and after transfer to 20°C subsequent to chilling. *Physiologia Plantarum* 93(4): 683-688.
- Whitaker, T. W. and G. N. Davis. 1962. *Cucurbits*. Interscience Pub., Inc., N. Y. 249 p.
- Wien, H. C. 1997. Pepper, pp. 259-293. In: Wien (ed.). *The physiology of vegetable crops*. CAB International, Wallingford, U. K.
- Wiendl, F. M., V. Arthur, and T. A. Wiendl. 1996. Storage of peppers (*Capsicum annuum* L.) using gamma irradiation from cobalt-60 (In Portuguese with English summary). *Revista de Agricultura (Piracicaba)* 71(1): 21-32. c. a. Hort. Abstr. 67(10): 8611; 1997.
- Wills, R. B. H. and G. H. Kim. 1996. Effect of ethylene on postharvest quality of green beans. *Aust. J. Exp. Agric.* 36(3): 335-337.
- Wills, R. B. H. and V. V. V. Ku. 2002. Use of 1-MCP to extend the time to ripen of green tomatoes and postharvest life of ripe tomatoes. *Postharvest Biol. Technol.* 26: 85-90.

- Wills, R., B. McGlasson, D. Graham, and D. Joyce. 1998. Postharvest: an introduction to the physiology & handling of fruit, vegetables & ornamentals. CAB International, Wallingford, UK 262 p.
- Wills, R. B. H., V. V. V. Ku, and Y. Y. Leshem. 2000. Fumigation with nitric oxide to extend the postharvest life of strawberries. Postharvest Biology and Technology 18(1): 75-79.
- Wright, P. J. and D. G. Grant. 1999. Effects of pre-shipping storage conditions on buttercup squash quality rots. New Zealand J. Crop Hort. Sci. 27(4): 337-343.
- Wszelaki, A. L. and E. J. Mitcham. 2000. Effects of superatmospheric oxygen on strawberry fruit quality and decay. Postharvest Biology and Technology 20: 125-133.
- Wszelaki, A. L. and E. J. Mitcham. 2003. Effect of combinations of hot water dips, biological control and controlled atmosphere for control of gray mold on harvested strawberries. Postharvest Biol. Technol. 27: 255-264.
- Xi, Y. F., T. Yu, and D. M. Qian. 1998. Studies on the physiology of chilling injury in eggplant (*Solanum melongena* L.) fruits. (In Chinese with English summary). Acta Horticulturae Sinica 25(3): 303-305. c. a. Hort. Abstr. 69(4): 3166; 1999.
- Yamaguchi, M. 1983. World vegetables: principles, production and nutritive values. AVI Pub. Co., Inc., Westport, Connecticut. 415 p.
- Yang, Y. J. and K. A. Lee. 1998. Thiabendazole and CA effects on reduction of chilling injury during cold storage in pepper fruit. J. Korean Soc. Hort. Sci. 39(6): 680-683. c. a. Hort. Abstr. 69(5): 4113; 1999.
- Yang, Y. J. and K. A. Lee. 1999. The changes of acetaldehyde, ethanol and firmness during CA storage of strawberries. (In Korean with English summary). J. Korean Soc. Hort. Sci. 40(3): 303-305.
- Yang, B. et al. 2003. Effect of temperature on chilling injury, decay and quality of Hami melon during storage. Postharvest Biol. Technol. 29: 229-232.
- Yang, B., G. Yonghong, G. Yurong, and Z. Jie. 2007. Postharvest harpin treatment suppresses decay and induces the accumulation of defense-related enzymes in hami melons. Acta Hort. No. 731: 439-450.

- Yu, Y. M. et al. 1997. Fruit characteristics and quality of vine-ripened and room-ripened fruit in several cherry tomato cultivars (In Korean with English summary). J. Korean Soc. Hort. Sci. 38(5): 453-458 (c. a. Hort. Abstr. 68(2): 1418; 1998).
- Yu, M., L. Shen, B. Fan, D. Zhao, Y. Zheng, and J. Sheng. 2009. The effect of MeJA on ethylene biosynthesis and induced disease resistance to *Botrytis cinerea* in tomato. Postharvest Biology and Technology 54(3): 153-158.
- Zagory, D. 1998. A practical workshop for the optimization of Egyptian produce packaging. Agricultural Technology Utilization & Transfer Project. Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Cairo. 32 p.
- Zahara, M. B. and R. W. Scheuerman. 1988. Hand-harvesting jointless vs. jointed-stem tomatoes. Calif. Agric. 42(3): 14.
- Zhang, D. and P. C. Quantick. 1998. Antifungal effects of chitosan coating on fresh strawberries and raspberries during storage. J. Hort. Sci. Biotech. 73(6): 763-767.
- Zhang, Z. D., J. L. Ma, and R. J. Zong. 1996. Studies on fresh-keeping factors of cucumber packaged with polyethylene. (In Chinese with English summary). Journal of Hebei Agricultural University 19(1): 40-44 (c. a. Hort. Abstr. 67(10): 8551, 1997).
- Ziv, O., C. Shifris, S. Grunberg, E. Fallik, and A. Szadeh. 1994. Control of *Leveillula taurica* mildew (*Oidiopsis taurica*) on pepper plants. (In Arabic with English summary). Hassadeh 74(5): 526-532 (c. a. Rev. Plant Pathol. 74(9): 5782; 1994).
- Zong, R. J., L. Morris, and M. Cantwell. 1995. Postharvest physiology and quality of bitter melon (*Momordica charantia* L.). Postharvest Biol. Technol. 6: 65-72.



شكل (١-١): تعبئة الطماطم في كراتين - بعد رصّها في أطباق - وتجهيزها على صورة بالتات.




شكل (٣-٢): تدريج ثمار الفلفل وتعبئتها



شكل (٣-١): مرحلة الانفصال الكامل full-slip في ثمار القاوون (الكتالوب) الشبكي .



شكل (٣-٢): تلون ثمار الكتالوب المارانيه وقت حصادها باللون الأبيض الذهبي وليس البرتقالي .



شكل (٣-٣) ثمرة شارانتيه زائدة النضج وظهرت بها حالة الـ vetrosity.



شكل (٤-٢) تعبئة ثمار الفلفل في أغشية معدلة للهواء وغير منفذة للرطوبة.



شكل (٣-٤): عملية فرز ثمار الكنتالوب تبعاً لأحجامها.